



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 240-2003 Åkerven och örtogräs i höstsäd, höst och vår

ADB-NR: 05A541

LÄN-FNR: D-116-2002

JBR.OMR: 13a

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Rågvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Bärsta, Stigtomta

GÖDSLING

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

DATUM

2003-04-25

2003-05-18

MÄNGD KG/HA

710

250

N P K

110

39

SORT: Fidelio

SÄTT DEN: 2002-09-08 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Rågvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar

DATUM

2003-06-22



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat	11.5	100	23.0	100	7.3	100	34.0	100	3.0	100	1.0	100
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)	4.0	35	1.3	5	1.0	14	0.5	1	6.0	200	2.8	275
C. 1.5 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
D. 1.25 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	8	0.0	0
E. 2.0 l Boxer + 0.25 l Bacara 1)	0.3	2	0.0	0	0.8	10	0.0	0	0.8	25	1.0	100
F. 2.0 l Picomax 1)	1.8	15	0.3	1	0.8	10	0.0	0	1.5	50	0.0	0
G. 0.5 l Cougar 1) + 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.5	4	1.8	8	1.8	24	0.8	2	0.8	25	0.3	25
H. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	8	0.0	0
I. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)	0.5	4	0.0	0	3.8	52	1.0	3	3.8	125	0.0	0
J. 20 g Lexus 50 WG + 40 g Plattform 2)	0.0	0	0.0	0	1.3	17	0.5	1	2.5	83	0.0	0
K. 15 g Lexus 50 WG + 0.5 l Bacara + 0.1 l Vätmedel 2)	0.0	0	0.0	0	0.3	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0
L. 0.5 l Starane 180 + 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)	1.0	9	0.0	0	2.0	28	0.3	1	3.0	100	1.3	125
M. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2) + 1.5 l Arelon 3)	3.3	28	0.0	0	1.8	24	0.3	1	1.0	33	0.0	0
N. 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	3.5	30	1.5	7	7.5	103	8.3	24	3.8	125	0.8	75
O. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.3	2	0.0	0	0.5	7	0.8	2	1.0	33	0.0	0
P. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)	1.3	11	0.0	0	1.5	21	0.5	1	0.8	25	0.0	0
Q. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)	1.5	13	0.5	2	6.5	90	8.0	24	0.3	8	0.0	0
R. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)	2.3	20	1.0	4	2.8	38	7.0	21	1.0	33	0.0	0
1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten												
2) Då åkerven är i stadium DC 11-29 och grödan har 2-3 blad på hösten												
3) Tidig vår vid tillväxtens början												
4) Våren vid tillväxtens början, ej risk för nattfrost												

ANM:

OBS! Åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 240-2003 Åkerven och örtogräs i höstsäd, höst och vår

ADB-NR: 05A541

LÄN-FNR: D-116-2002

JBR.OMR: 13a

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Rågvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Bärsta, Stigtomta

GÖDSLING

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

DATUM

2003-04-25

2003-05-18

MÄNGD KG/HA

710

250

N P K

110

39

SORT: Fidelio

SÄTT DEN: 2002-09-08 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Rågvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar

DATUM

2003-06-22



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

- A. Obehandlat
- B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)
- C. 1.5 l Cougar 1)
- D. 1.25 l Bacara 1)
- E. 2.0 l Boxer + 0.25 l Bacara 1)
- F. 2.0 l Picomax 1)
- G. 0.5 l Cougar 1) + 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
- H. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
- I. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
- J. 20 g Lexus 50 WG + 40 g Plattform 2)
- K. 15 g Lexus 50 WG + 0.5 l Bacara + 0.1 l Vätmedel 2)
- L. 0.5 l Starane 180 + 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
- M. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2) + 1.5 l Arelon 3)
- N. 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
- O. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
- P. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
- Q. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)
- R. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
- 2) Då åkerven är i stadium DC 11-29 och grödan har 2-3 blad på hösten
- 3) Tidig vår vid tillväxtens början
- 4) Våren vid tillväxtens början, ej risk för nattfrost

Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Åkerfräken		Åkerven*		Åkerven*						
st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	g/m2	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal					
07-07		07-07		07-07	07-07	07-07		07-07						
21.8	100	58.0	100	0.0	0.0	33.0	100	161.5	100					
11.0	51	4.5	8	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
0.3	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
1.8	8	1.0	2	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
4.0	18	0.3	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
3.0	14	2.8	5	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
0.3	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
8.0	37	1.0	2	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
3.8	17	0.5	1	0.3	0.8	0.0	0	0.0	0					
0.3	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
6.0	28	1.5	3	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
6.0	28	0.3	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
14.8	68	10.5	18	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
1.8	8	0.8	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
3.5	16	0.5	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
8.3	38	8.5	15	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					
6.0	28	8.0	14	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0					

ANM:

OBS! Åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2003

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 240-2003 Åkerven och örtogräs i höstsäd, höst och vår

ADB-NR: 05A541

LÅN-FNR: D-116-2002

JBR.OMR: 13a

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Rågvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Bärsta, Stigtomta

GÖDSLING

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

DATUM

2003-04-25

2003-05-18

MÄNGD KG/HA

710

250

N P K

110

39

SORT: Fidelio

SÄTT DEN: 2002-09-08 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Rågvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.5 l Amistar

DATUM

2003-06-22



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

- A. Obehandlat
B. 2.5 l Arelon + 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 1.5 l Cougar 1)
D. 1.25 l Bacara 1)
E. 2.0 l Boxer + 0.25 l Bacara 1)
F. 2.0 l Picomax 1)
G. 0.5 l Cougar 1) + 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
H. 0.5 l Cougar 1) + 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)
I. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
J. 20 g Lexus 50 WG + 40 g Plattform 2)
K. 15 g Lexus 50 WG + 0.5 l Bacara + 0.1 l Vätmedel 2)
L. 0.5 l Starane 180 + 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2)
M. 20 g Lexus 50 WG + 0.1 l Vätmedel 2) + 1.5 l Arelon 3)
N. 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
O. 200 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
P. 0.1 l Primus + 12.5 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 3)
Q. 18.75 g Monitor + 1 tabl (5.0 g) Express + 0.2 l Lissapol Bio 4)
R. 18.75 g Monitor + 0.2 l Lissapol Bio 4)

- 1) Då grödan har 1-1.5 blad på hösten
2) Då åkerven är i stadium DC 11-29 och grödan har 2-3 blad på hösten
3) Tidig vår vid tillväxtens början
4) Våren vid tillväxtens början, ej risk för nattfrost

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-20	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Strå st vid skörd 08-20	Ogräs före komst grad 08-20									
5200	100	2.7	19.3	718	100	35									
6450	124	2.0	19.3	727	100	3									
6420	124	2.0	19.2	728	95	1									
5590	108	2.5	19.5	721	98	0									
5910	114	2.8	19.6	719	98	0									
6460	124	2.3	19.6	718	95	0									
5620	108	1.9	18.9	735	95	0									
5900	114	2.6	19.5	723	98	0									
5710	110	2.4	18.9	734	100	0									
6010	116	3.0	18.5	729	98	0									
6290	121	2.2	19.1	724	100	0									
5340	103	2.4	18.9	735	100	3									
6140	118	2.1	18.9	740	100	0									
6310	121	2.7	19.0	730	98	0									
5780	111	2.3	18.9	732	95	1									
5980	115	3.1	19.2	726	95	0									
6060	117	2.3	19.2	726	100	0									
5980	115	2.1	19.1	729	98	0									
5950					98										
6.9					5.1										
72					72										
.0006					.7949										
580					7										

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2003

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: L5- 240-2003 Åkerven och örtogräs i höstsäd, höst och vår

ADB-NR: 05A541

LÄN-FNR: D-116-2002 JBR.OMR: 13a

GRÖDA: Rågvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Bärsta, Stigtomta

GÖDSLING

Kalksalpeter S

Kalksalpeter S

DATUM

2003-04-25

2003-05-18

MÄNGD KG/HA

710

250

N P K

110

39

SORT: Fidelio

SÄTT DEN: 2002-09-08 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Rågvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 ***

A<>B A<>C A<>F A<>K A<>N B<>L C<>L F<>L

Y.M15:F1 **

A<>J A<>M A<>P A<>Q A<>R B<>D B<>G C<>D C<>G D<>F F<>G K<>L L<>M L<>N

Y.M15:F1 *

A<>E A<>H A<>O B<>I B<>O C<>I C<>O D<>K D<>N F<>I F<>O G<>K G<>N I<>N

Y.M15:F1 *

J<>L L<>P L<>Q L<>R

Sprutjournal

ADB-nr:	05A541
Plan-nr:	L5- 240-2003
Försöksnr:	D-116-2002
Närmaste väderstr:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-H	I-M	G, M-P	H, Q, R		
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo	Sprumo	Sprumo		
Spridare, typ:	Spalt	Spalt	Spalt	Spalt		
Arbetsstryck, MPa:	0.2	0.2	0.2	0.25		
Datum:	2002-10-02	2002-10-27	2003-04-17	2003-05-12		
Tid på dagen:	13.00	11.00	11.00	11.00		
Grödans utveckling (decimalskalan):	11	21	22	24		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal	normal		
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad	Örtblad	2-3 örtblad	4-6 örtblad		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	glest	glest	glest	normalt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal	normal	normal		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	12.3	8.5	15.3	15.6		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	45	67	46.5	43.0		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr	normal	våt-fuktig	normal		
Molnighet, %:	20	20	10	20		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.0	2.5	2.5	2.5		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs	diagonalt	diagonalt	tvärs		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	måttlig	ingen	ingen		
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej	nej		
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim		
Övrigt:						