

**R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2004**

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2004 Örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A633 LÄN-FNR: D-114-2003 JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Lundby, Fogdö, Strängnäs

GÖDSLING

NP 12-23 (?)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter

DATUM

2003-09-07

2004-04-16

2004-06-06

MÄNGD KG/HA

100

450

200

N

12

122

31

P

23

K

SORT: Tarso

SÄTT DEN: 2003-09-07 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :**F Ö R S Ö K S L E D :**

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 1)
D. 0.75 l Bacara 1)
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)
F. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
G. 0.3 l Bacara 1) + 120 g Checker + 0.1 l Lissapol Bio 3)
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)
I. 50 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
J. 100 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
K. 100 ml Primus + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
L. 60 ml Primus + 0.66 l Starane 180 3)
M. 35 g Ally Class + 0.8 l Mekoprop 3)
N. 50 g Ally Class 3)
O. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)
P. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
Q. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
R. 0.6 l Bacara + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
S. 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)

Dån	Rel	Dån	Rel	Snärj- måra	Rel	Snärj- måra	Rel	Trampört	Rel	Trampört	Rel	Våtarv	Rel
st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	g/m2	tal
07-28		07-28		07-28		07-28		07-28		07-28		07-28	
1.7	100	20.3	100	12.7	100	121.0	100	15.3	100	13.3	100	105.3	100
0.7	40	0.3	2	2.0	16	15.3	13	33.7	220	36.0	270	6.7	6
0.0	0	0.0	0	6.7	53	40.7	34	27.7	180	19.3	145	10.0	9
1.0	60	20.3	100	3.0	24	16.0	13	15.3	100	11.3	85	1.0	1
0.7	40	1.3	7	2.3	18	4.7	4	33.7	220	22.0	165	14.7	14
0.4	24	0.4	2	10.3	81	65.5	54	28.0	183	10.8	81	0.8	1
0.3	20	1.0	5	6.0	47	6.0	5	11.0	72	2.3	18	0.0	0
0.0	0	0.0	0	2.7	21	5.3	4	26.8	175	8.6	65	28.7	27
0.3	20	0.3	2	11.3	89	29.0	24	11.3	74	3.0	23	7.3	7
1.3	80	11.0	54	4.7	37	25.3	21	22.0	143	4.0	30	17.3	16
1.3	80	1.0	5	14.7	116	55.0	45	9.0	59	1.7	13	11.3	11
0.7	40	2.0	10	3.3	26	5.7	5	5.3	35	2.0	15	1.7	2
0.0	0	0.0	0	2.7	21	4.0	3	13.7	89	5.3	40	2.3	2
0.0	0	0.0	0	7.7	61	71.7	59	14.7	96	9.0	68	15.3	15
0.0	0	0.0	0	9.7	76	34.7	29	19.0	124	8.7	65	12.3	12
0.0	0	0.0	0	3.9	31	36.8	30	9.4	61	3.3	25	10.8	10
0.3	20	0.0	0	19.7	155	58.7	48	12.7	83	3.3	25	24.3	23
0.0	0	0.0	0	9.7	76	21.7	18	2.3	15	1.0	8	47.3	45
0.0	0	0.0	0	6.7	53	38.7	32	18.3	120	8.7	65	18.0	17

1) Då grödan har 2-3 blad på hösten

2) Mycket tidig vårbehandling

3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Behovsanpassad beh i led F enl plan: 06-14.

Led H och Q i block IV omkastade.

Led P block I samt led H och F block III kasserade.

OBS! Dån får EJ förekomma i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2004 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A633 LÄN-FNR: D-114-2003 JBR.OMR: 13c

SIDA 2

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Lundby, Fogdö, Strängnäs

GÖDSLING

NP 12-23 (?)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter

DATUM

2003-09-07

2004-04-16

2004-06-06

MÄNGD KG/HA

100

450

200

N

12

122

31

P

23

K

SORT: Tarso

SÄTT DEN: 2003-09-07 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 1)
D. 0.75 l Bacara 1)
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)
F. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
G. 0.3 l Bacara 1) + 120 g Checker + 0.1 l Lissapol Bio 3)
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)
I. 50 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
J. 100 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
K. 100 ml Primus + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
L. 60 ml Primus + 0.66 l Starane 180 3)
M. 35 g Ally Class + 0.8 l Mekoprop 3)
N. 50 g Ally Class 3)
O. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)
P. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
Q. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
R. 0.6 l Bacara + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
S. 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)

Övriga ettåriga örtog st/m2 07-28	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 07-28	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 07-28	Rel tal										
9.3	100	6.0	100	266.0	100										
27.3	293	27.7	461	86.0	32										
16.7	179	19.3	322	89.3	34										
20.3	218	18.0	300	66.7	25										
24.3	261	21.3	356	64.0	24										
4.3	46	2.9	48	80.2	30										
10.0	107	5.0	83	14.3	5										
8.5	91	4.5	75	47.2	18										
18.0	193	7.3	122	47.0	18										
28.7	307	13.7	228	71.3	27										
9.3	100	3.7	61	72.7	27										
13.7	146	8.7	144	20.0	8										
4.7	50	1.3	22	13.0	5										
9.0	96	6.3	106	102.3	38										
7.7	82	3.0	50	58.7	22										
15.4	165	4.0	67	54.3	20										
5.7	61	3.7	61	90.0	34										
6.0	64	2.0	33	72.0	27										
28.0	300	24.7	411	90.0	34										

1) Då grödan har 2-3 blad på hösten

2) Mycket tidig vårbehandling

3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:

Behovsanpassad beh i led F enl plan: 06-14.

Led H och Q i block IV omkastade.

Led P block I samt led H och F block III kasserade.

OBS! Dån får EJ förekomma i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2004 Örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A633 LÄN-FNR: D-114-2003 JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Lundby, Fogdö, Strängnäs

GÖDSLING

NP 12-23 (?)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter

DATUM

2003-09-07

2004-04-16

2004-06-06

MÄNGD KG/HA

100

450

200

N

12 23

122

31

P

K

SORT: Tarso

SÄTT DEN: 2003-09-07 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 1)
D. 0.75 l Bacara 1)
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)
F. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
G. 0.3 l Bacara 1) + 120 g Checker + 0.1 l Lissapol Bio 3)
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)
I. 50 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
J. 100 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
K. 100 ml Primus + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
L. 60 ml Primus + 0.66 l Starane 180 3)
M. 35 g Ally Class + 0.8 l Mekoprop 3)
N. 50 g Ally Class 3)
O. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)
P. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
Q. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
R. 0.6 l Bacara + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
S. 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)

- 1) Då grödan har 2-3 blad på hösten
2) Mycket tidig vårbehandling
3) Vid tillväxtens början på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-11	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Strå st vid skörd 08-11	Ogräs före komst grad 08-11										
7940	100	3.7	17.4	798	100	45										
8190	103	3.2	14.5	822	100	28										
8080	102	4.1	16.6	808	100	25										
8530	107	2.0	14.3	819	100	14										
8310	105	1.8	14.1	823	100	21										
8530	107	1.8	15.4	819	100	5										
8520	107	1.6	13.3	820	100	10										
8550	108	1.5	14.1	829	100	12										
8430	106	1.7	14.6	819	100	10										
8490	107	1.9	14.0	819	100	10										
8390	106	1.7	14.9	816	100	6										
8050	101	1.6	13.9	819	100	11										
8140	103	2.1	13.5	821	100	6										
8180	103	2.0	15.5	818	100	18										
8480	107	1.9	14.5	822	100	11										
8260	104	1.8	13.9	815	100	20										
8460	107	1.5	14.3	821	100	9										
8220	103	1.6	13.6	819	100	6										
8520	107	1.8	14.5	815	100	15										
8330																
3.5																
72																
.0762																
430																

ANM:

Behovsanpassad beh i led F enl plan: 06-14.

Led H och Q i block IV omkastade.

Led P block I samt led H och F block III kasserade.

Skörden i led S block II kasserad av FFE, markant lägre skördenivå (gradient).



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2004

SIDA 2

Östra SverigeFörsöken

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

PLAN: L5- 306-2004 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05A633 LÄN-FNR: D-114-2003 JBR.OMR: 13c

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Lundby, Fogdö, Strängnäs

SORT: Tarso

SÄTT DEN: 2003-09-07 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART:

GÖDSLING

NP 12-23 (?)

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter

DATUM

2003-09-07

2004-04-16

2004-06-06

MÄNGD KG/HA

100

450

200

N P K

12 23

122

31

VÄXTSKYDD

DATUM

Y.M15:F1 **

A<>D A<>F A<>G A<>H A<>J

Y.M15:F1 *

A<>I A<>K A<>O A<>Q A<>S C<>D C<>F C<>G C<>H D<>L F<>L G<>L H<>L J<>L

Y.M15:F1 *

L<>O L<>S

Sprutjournal

ADB-nr:	05A633
Plan-nr:	L5- 306-2004
Försöksnr:	D-114-2003
Närmaste väderstr:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-G	H	G, I-S	F		
Typ av spruta:	Sprumo	Sprumo	Sprumo	Sprumo		
Spridare, typ:	Spalt	Spalt (02)	Spalt	Spalt		
Arbetsstryck, MPa:			0.2	0.2		
Datum:	2003-10-13	2004-04-19	2004-05-11	2004-06-14		
Tid på dagen:	10.00	14.00	14.00	13.00		
Grödans utveckling (decimalskalan):	13	21	30	49		
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal	normal		
Ogräsens utveckling:	2-4 blad	5-6 bladrosetter	8-10 bladrosetter	20 bladrosetter		
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt	normalt	normalt		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal	normal	normal		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	11.3	17.3	15.6	22.5		
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	61	37.5	45	52.4		
Markfuktighet (våt, normal, torr):	normal	normal	normal	normal		
Molnighet, %:	50	0	30	80		
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	2.1	3	0.8	2.2		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	längs	diagonalt	längs		
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	ingen	ingen		
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	¹⁾	nej		
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim		
Övrigt:			¹⁾ Ingen frost 5-12, 14,15 Maj, -0.4°C 13 Maj.			