



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2004 Örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A635 LÄN-FNR: E-144-2003 JBR.OMR: 12a

SIDA 1

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Peter Malmström

ADRESS: Broby Gård, Vadstena

GÖDSLING

NS 27-3 (Axan)

Flytgödsel, höns

DATUM

2004-04-23

2004-06-02

MÄNGD KG/HA

300

200

N P K

81

SORT: Marshal

SÄTT DEN: 2003-09-11 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.3 l Sumi-alpha

0.3 l Comet + 0.4 l Tilt Top

DATUM

2004-06-11

2004-06-19



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :	Förgät-migej		Förgät-migej		Svin-mälla		Svin-mälla		Våtarv		Våtarv				
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal			
	07-05		07-05		07-05		07-05		07-05		07-05				
A. Obehandlat	14.5	100	28.0	100	9.0	100	15.8	100	10.5	100	104.8	100			
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	11.0	76	11.5	41	13.8	153	9.3	59	4.8	45	3.3	3			
C. 0.75 l Cougar 1)	13.3	91	15.3	54	10.8	119	11.8	75	3.0	29	5.0	5			
D. 0.75 l Bacara 1)	8.8	60	18.8	67	8.0	89	14.0	89	3.3	31	4.8	5			
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)	10.8	74	14.3	51	6.5	72	40.0	254	3.8	36	4.8	5			
F. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	6.0	41	10.5	38	9.0	100	11.8	75	2.5	24	4.5	4			
G. 0.3 l Bacara 1) + 120 g Checker + 0.1 l Lissapol Bio 3)	2.8	19	1.8	6	3.0	33	2.3	14	0.0	0	0.0	0			
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)	5.8	40	7.5	27	1.5	17	0.8	5	4.3	40	4.5	4			
I. 50 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)	7.3	50	3.3	12	5.0	56	8.8	56	4.0	38	7.8	7			
J. 100 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)	0.8	5	1.3	4	6.0	67	9.8	62	2.5	24	6.3	6			
K. 100 ml Primus + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	2.5	17	2.0	7	1.5	17	1.0	6	1.0	10	4.5	4			
L. 60 ml Primus + 0.66 l Starane 180 3)	4.0	28	3.3	12	14.5	161	11.8	75	2.8	26	6.8	6			
M. 35 g Ally Class + 0.8 l Mekoprop 3)	2.0	14	1.0	4	1.8	19	0.8	5	4.0	38	15.0	14			
N. 50 g Ally Class 3)	1.0	7	0.3	1	4.5	50	2.0	13	2.8	26	8.8	8			
O. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)	0.5	3	0.5	2	1.0	11	0.5	3	2.0	19	8.8	8			
P. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)	5.5	38	5.0	18	2.5	28	2.5	16	0.0	0	0.0	0			
Q. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)	1.5	10	0.8	3	1.5	17	1.3	8	2.3	21	10.8	10			
R. 0.6 l Bacara + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)	3.0	21	2.8	10	2.3	25	1.8	11	5.3	50	54.8	52			
S. 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	2.5	17	2.0	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			

1) Då grödan har 2-3 blad på hösten

2) Mycket tidig vårbehandling

3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÅS 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2004 Örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A635 LÅN-FNR: E-144-2003 JBR.OMR: 12a

SIDA 2

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Peter Malmström

ADRESS: Broby Gård, Vadstena

GÖDSLING

NS 27-3 (Axan)

Flytgödsel, höns

DATUM

2004-04-23

2004-06-02

MÄNGD KG/HA

300

200

N P K

81

SORT: Marshal

SÄTT DEN: 2003-09-11 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.3 l Sumi-alpha

0.3 l Comet + 0.4 l Tilt Top

DATUM

2004-06-11

2004-06-19



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T :

F Ö R S Ö K S L E D :	Åker- binda	Rel tal	Åker- binda	Rel tal	Övriga ettåriga örtog	Rel tal	Övriga ettåriga örtog	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog	Rel tal			
	st/m2 07-05		g/m2 07-05		st/m2 07-05		g/m2 07-05		st/m2 07-05		st/m2 07-05				
A. Obehandlat	89.3	100	171.0	100	8.3	100	15.3	100	131.5	100	334.8	100			
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)	107.3	120	128.8	75	14.3	173	15.0	98	151.0	115	167.8	50			
C. 0.75 l Cougar 1)	80.0	90	138.3	81	10.0	121	13.8	90	117.0	89	184.0	55			
D. 0.75 l Bacara 1)	69.3	78	155.0	91	6.8	82	18.3	120	96.0	73	210.8	63			
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)	71.8	80	199.3	117	4.5	55	10.0	66	97.3	74	268.3	80			
F. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]	72.3	81	141.5	83	18.0	218	22.3	146	107.8	82	190.5	57			
G. 0.3 l Bacara 1) + 120 g Checker + 0.1 l Lissapol Bio 3)	80.8	90	60.8	36	5.3	64	5.8	38	91.8	70	70.5	21			
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)	56.5	63	91.3	53	3.0	36	1.8	11	71.0	54	105.8	32			
I. 50 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)	43.8	49	68.8	40	13.0	158	21.5	141	73.0	56	110.0	33			
J. 100 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)	27.3	31	20.5	12	12.5	152	16.5	108	49.0	37	54.3	16			
K. 100 ml Primus + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	25.0	28	46.5	27	4.8	58	8.0	52	34.8	26	62.0	19			
L. 60 ml Primus + 0.66 l Starane 180 3)	16.0	18	22.0	13	12.0	145	11.8	77	49.3	37	55.5	17			
M. 35 g Ally Class + 0.8 l Mekoprop 3)	16.0	18	11.8	7	7.0	85	6.3	41	30.8	23	34.8	10			
N. 50 g Ally Class 3)	53.8	60	22.5	13	5.0	61	9.0	59	67.0	51	42.5	13			
O. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)	17.8	20	19.5	11	3.3	39	3.0	20	24.5	19	32.3	10			
P. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)	16.5	18	20.3	12	10.5	127	19.3	126	35.0	27	47.0	14			
Q. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)	31.0	35	32.3	19	6.5	79	6.8	44	42.8	33	51.8	15			
R. 0.6 l Bacara + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)	19.5	22	26.5	15	1.8	21	1.5	10	31.8	24	87.3	26			
S. 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)	48.3	54	57.0	33	7.0	85	7.3	48	57.8	44	66.3	20			

1) Då grödan har 2-3 blad på hösten

2) Mycket tidig vårbehandling

3) Vid tillväxtens början på våren

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2004

Östra SverigeFörsöken

PLAN: L5- 306-2004 Örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A635 LÄN-FNR: E-144-2003 JBR.OMR: 12a

SIDA 1

ANSVARIG: Björn Andersson 018-671427

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Peter Malmström

ADRESS: Broby Gård, Vadstena

GÖDSLING

NS 27-3 (Axan)

Flytgödsel, höns

DATUM

2004-04-23

2004-06-02

MÄNGD KG/HA

300

200

N P K

81

SORT: Marshal

SÄTT DEN: 2003-09-11 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.3 l Sumi-alpha

0.3 l Comet + 0.4 l Tilt Top

DATUM

2004-06-11

2004-06-19



Bearbetat av FFE, SLU

R E S U L T A T:

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat
B. 1.2 l Duplosan Meko 1)
C. 0.75 l Cougar 1)
D. 0.75 l Bacara 1)
E. 0.15 l Lotus + 1.0 l Duplosan Meko 1)
F. 0.3 l Cougar 1) + [Behovsanpassning av preparat och dos på våren]
G. 0.3 l Bacara 1) + 120 g Checker + 0.1 l Lissapol Bio 3)
H. 0.25 l Lotus + 2.0 l Duplosan Super 2)
I. 50 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
J. 100 ml Primus + 0.1 l Lissapol Bio 3)
K. 100 ml Primus + 0.35 l Cougar + 0.1 l Lissapol Bio 3)
L. 60 ml Primus + 0.66 l Starane 180 3)
M. 35 g Ally Class + 0.8 l Mekoprop 3)
N. 50 g Ally Class 3)
O. 35 g Ally Class + 0.35 l Starane 180 3)
P. 1.5 tabl (7.5 g) Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l Lissapol Bio 3)
Q. 0.6 l Cougar + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
R. 0.6 l Bacara + 20 g Gratil + 0.1 l Lissapol Bio 3)
S. 150 g Hussar + 0.1 l Lissapol Bio 3)

- 1) Då grödan har 2-3 blad på hösten
2) Mycket tidig vårbehandling
3) Vid tillväxtens början på våren

Beh.
skada
höst
0-100
11-07

ANM:

Ej försöksmässig skörd p.g.a. svag gröda tidigt och liten förekomst av höstogräs.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A635
Plan-nr:	L5- 306-2004
Försöksnr:	E-144-2003
Närmaste väderstrn:	Malmslätt (Adconspjut på gården)

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-G	H	G, I-S			
Typ av spruta:	Ströby	Ströby	Västerås			
Spridare, typ:	Hardi F 03 - 110	Hardi F 03 - 110	Hardi F 03 - 110			
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	2003-10-15	2004-04-15	2004-05-11			
Tid på dagen:	11.00 - 12.00	13.00 - 13.20	10.00 - 12.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	13	24	29			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	10-11	23-25	24-28			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	glest	glest			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	låg	låg	låg			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	5.9	14.2	14.1			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	76.6	54.2	58.3			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	normal	normal			
Molnighet, %:	5	10	80			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	1.3	2.7	1.5			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt	längs	längs			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	frost lokalt	frost lokalt ¹⁾				
Regnfri tid efter behandling:	> 20 tim					
Övrigt:	Kallare väder spås (ev snö). Ogräs något för små men risk- abelt att vänta.	¹⁾ Frost 2 dygn före beh.	Vindskydd monterat			