



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A891

LÅN-FNR: H-025-2007

JBR.OMR: 6

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar

ADRESS: Bo Gård, Hossmo, Kalmar

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4	2008-04-01	310	84		
	NS 27-4	2008-05-05	250	68		
	Microplan Mangan 180	2008-06-08	0.4			
SORT:	Skalmeje (ej plöjt,kultivator)					
SÅTT DEN:	2007-09-20 KG/HA: 160					
FÖRFRUKT:	Ärter					
JORDART:	MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO					
PH-VÄRDE:						
	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH ENL PLAN		GRÖDANS UTV.STADIUM
	0.5 Proline + 0.2 Comet	2008-06-08		2007-10-09		DC 11-12
	0.25 Decis	2008-06-08		2008-04-14		DC 26

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Förgät-migej		Förgät-migej	
	st/m2 06-03	Rel tal	fältv g/m2 06-03	Rel tal		MATIN g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-03	Rel tal	fältv g/m2 06-03	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	1.5	100	15.3	100	100	9.5	100	17.0	100	61.5	100
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
C. [Utgår]											
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	0.3	17	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2.0 tabl Harmony Plus + 0.2 l vätm) 2) [Syn]	0.0	0	0.0	0	0			0.5	3	0.8	1
J. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
K. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]	1.3	83	2.5	16	25	10.0	106	7.8	46	6.3	10
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	0.3	17	0.0	0	0			5.5	32	3.8	6
M. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]	0.3	17	0.0	0	0			5.0	29	2.3	4
N. 70 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Region]	0.5	33	1.0	7	25	4.0	42	5.3	31	5.0	8
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten											
2) Vid tillväxtens början på våren											
STDEV%											
PROB F1								149.8			
								.8735			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Beh i led N ej enl den ursprungliga planen. Detta led får ej ingå i seriesammanställning.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra och våtarv.

OBS! Baldersbrå, raps, gröe, åkerfräken och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08B Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A891 LÅN-FNR: H-025-2007 JBR.OMR: 6

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar

ADRESS: Bo Gård, Hossmo, Kalmar

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4	2008-04-01	310	84		
	NS 27-4	2008-05-05	250	68		
	Microplan Mangan 180	2008-06-08	0.4			
SORT: Skalmeye (ej plöjt,kultivator)						
SÅTT DEN: 2007-09-20 KG/HA: 160						
FÖRFRUKT: Årter						
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALLTIG LERIG MO	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM		
PH-VÄRDE:	0.5 Proline + 0.2 Comet	2008-06-08	2007-10-09	DC 11-12		
	0.25 Decis	2008-06-08	2008-04-14	DC 26		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:	Stat: Frekv % av block	Förgät- migej MYOSS g/m2 geom.	Rel tal	Lomme st/m2 06-03	Rel tal	Lomme fältv g/m2 06-03	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Lomme CAPBP g/m2 geom.	Rel tal	Raps st/m2 06-03
A. Obehandlat [Regioner]	100	54.2	100	51.8	100	284.0	100	100	275.5	100	4.8
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	0			0.0	0	0.0	0	0			0.3
C. [Utgår]											
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]	0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]	0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]	0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]	0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2.0 tabl Harmony Plus + 0.2 l vätm) 2) [Syn]	25	3.0	6	0.0	0	0.0	0	0			0.0
J. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]	0			0.0	0	0.0	0	0			0.5
K. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]	100	3.9	7	1.0	2	0.0	0	0			0.0
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	100	2.9	5	0.0	0	0.0	0	0			0.0
M. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]	75	2.7	5	0.5	1	0.0	0	0			0.3
N. 70 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Region]	100	3.7	7	0.0	0	0.0	0	0			0.3
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten 2) Vid tillväxtens början på våren											
STDEV%		89.7							29.2		
PROB F1		.0029									

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Beh i led N ej enl den ursprungliga planen. Detta led får ej ingå i seriesammanställning.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra och våtarv.

OBS! Baldersbrå, raps, gröe, åkerfråken och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08B Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A891 LÅN-FNR: H-025-2007 JBR.OMR: 6

SIDA 3

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar

ADRESS: Bo Gård, Hossmo, Kalmar

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4	2008-04-01	310	84		
	NS 27-4	2008-05-05	250	68		
SORT: Skalmeye (ej plöjt,kultivator)	Microplan Mangan 180	2008-06-08	0.4			
SÅTT DEN: 2007-09-20 KG/HA: 160						
FÖRFRUKT: Årter						
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM		
PH-VÄRDE:	0.5 Proline + 0.2 Comet	2008-06-08	2007-10-09	DC 11-12		
	0.25 Decis	2008-06-08	2008-04-14	DC 26		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

	Rel tal	Raps fältv g/m2 06-03	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Raps BRSNN g/m2 geom.	Rel tal	Veronika st/m2 06-03	Rel tal	Veronika fältv g/m2 06-03	Rel tal	Stat: Frekv % av block
F Ö R S Ö K S L E D:											
A. Obehandlat [Regioner]	100	143.5	100	100	99.0	100	9.5	100	11.5	100	100
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	5	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
C. [Utgår]											
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2.0 tabl Harmony Plus + 0.2 l vätn) 2) [Syn]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
J. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]	11	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
K. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]	0	0.0	0	0			3.0	32	1.0	9	75
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	0	0.0	0	0			2.5	26	0.3	2	25
M. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]	5	0.3	0	25	1.0	1	6.8	71	7.0	61	75
N. 70 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Region]	5	0.5	0	25	2.0	2	10.5	111	6.0	52	100
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten											
2) Vid tillväxtens början på våren											
STDEV%					94.9						
PROB F1					.0316						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Beh i led N ej enl den ursprungliga planen. Detta led får ej ingå i seriesammanställning.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra och våtarv.

OBS! Baldersbrå, raps, gröe, åkerfråken och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A891 LÅN-FNR: H-025-2007 JBR.OMR: 6

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar

ADRESS: Bo Gård, Hossmo, Kalmar

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4	2008-04-01	310	84		
	NS 27-4	2008-05-05	250	68		
SORT: Skalmeye (ej plöjt,kultivator)	Microplan Mangan 180	2008-06-08	0.4			
SÅTT DEN: 2007-09-20 KG/HA: 160						
FÖRFRUKT: Årter						
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH ENL PLAN		GRÖDANS UTV.STADIUM
PH-VÄRDE:	0.5 Proline + 0.2 Comet	2008-06-08		2007-10-09		DC 11-12
	0.25 Decis	2008-06-08		2008-04-14		DC 26

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:	Veronika		Viol		Viol		Stat: Frekv % av block	Viol		Övr 1-år örtogräs	
	VERSS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-03	Rel tal	fältv g/m2 06-03	Rel tal		VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-03	fältv g/m2 06-03
A. Obehandlat [Regioner]	9.6	100	16.3	100	34.5	100	100	28.8	100	0.0	0.0
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]			0.3	2	0.0	0	0			0.0	0.0
C. [Utgår]											
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]			0.0	0	0.0	0	0			0.3	0.3
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2.0 tabl Harmony Plus + 0.2 l vätm) 2) [Syn]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0
J. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0
K. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]	1.3	13	2.3	14	1.3	4	50	2.0	7	0.3	1.3
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	1.0	10	3.8	23	0.8	2	50	1.4	5	0.0	0.0
M. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]	9.2	96	16.5	102	15.3	44	100	14.8	51	0.5	1.3
N. 70 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Region]	5.3	55	24.3	149	28.0	81	100	27.5	95	0.0	0.0
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten											
2) Vid tillväxtens början på våren											
STDEV%	57.3							53.8			
PROB F1	.0031							.0001			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Beh i led N ej enl den ursprungliga planen. Detta led får ej ingå i seriesammanställning.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra och våtarv.

OBS! Baldersbrå, raps, gröe, åkerfråken och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08B Åkervens och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A891 LÅN-FNR: H-025-2007 JBR.OMR: 6

SIDA 5

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar

ADRESS: Bo Gård, Hossmo, Kalmar

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4	2008-04-01	310	84		
	NS 27-4	2008-05-05	250	68		
SORT: Skalmeye (ej plöjt,kultivator)	Microplan Mangan 180	2008-06-08	0.4			

SÅTT DEN: 2007-09-20 KG/HA: 160

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: MÅTTLIGT MULLHÅLTIG LERIG MO

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 Proline + 0.2 Comet	2008-06-08	2007-10-09	DC 11-12
0.25 Decis	2008-06-08	2008-04-14	DC 26

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:

Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel tal	Samt lå örtogräs st/m2 06-03	Rel tal	Samt lå örtogräs fältv g/m2 06-03	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt lå örtogräs WEADT g/m2 geom.	Rel tal	Gröe st/m2 06-03
A. Obehandlat [Regioner]	0		100.8	100	550.3	100	100	529.0	100	0.0
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	0		0.5	0	0.0	0	0			0.0
C. [Utgår]										
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	0		0.3	0	0.0	0	0			0.0
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]	0		0.0	0	0.0	0	0			0.0
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]	25	1.0	100	0.3	0	0.3	0	25	1.0	0.0
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]	0		0.0	0	0.0	0	0			0.3
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]	0		0.0	0	0.0	0	0			0.3
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2.0 tabl Harmony Plus + 0.2 l vätn) 2) [Syn]	0		0.5	0	0.8	0	25	3.0	1	0.3
J. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]	0		0.5	0	0.0	0	0			0.0
K. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]	25	5.0	500	15.5	15	12.3	2	100	8.5	2
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	0		12.0	12	4.8	1	100	4.4	1	0.0
M. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]	50	2.4	245	29.8	30	26.0	5	100	25.9	5
N. 70 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Region]	0		40.8	40	40.5	7	100	39.8	8	0.0

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Beh i led N ej enl den ursprungliga planen. Detta led får ej ingå i seriesammanställning.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra och våtarv.

OBS! Baldersbrå, raps, gröe, åkerfråken och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A891 LÅN-FNR: H-025-2007 JBR.OMR: 6

SIDA 6

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar

ADRESS: Bo Gård, Hossmo, Kalmar

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4	2008-04-01	310	84		
	NS 27-4	2008-05-05	250	68		
	Microplan Mangan 180	2008-06-08	0.4			
SORT:	Skalmeje (ej plöjt,kultivator)					
SÅTT DEN:	2007-09-20 KG/HA: 160					
FÖRFRUKT:	Ärter					
JORDART:	MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO					
PH-VÄRDE:						
	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM		
	0.5 Proline + 0.2 Comet	2008-06-08	2007-10-09	DC 11-12		
	0.25 Decis	2008-06-08	2008-04-14	DC 26		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:	fälttv g/m2 06-03	Stat: Frekv % av block	Gröe XPOASS g/m2 geom.	* Rel tal	Åker- fräken st/m2 06-03	* fälttv g/m2 06-03	Stat: Frekv % av block	Åker- fräken XEQUAR g/m2 geom.	* Rel tal	Åker- tistel st/m2 06-03	* fälttv g/m2 06-03
A. Obehandlat [Regioner]	0.0	0			0.0	0.0	0			0.0	0.0
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	0.0	0			2.0	2.0	25	8.0	100	0.3	1.0
C. [Utgår]											
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	0.0	0			2.3	3.3	75	3.2	40	1.3	3.3
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]	0.0	0			0.8	1.3	25	5.0	63	0.0	0.0
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]	0.0	0			0.8	1.0	25	4.0	50	0.0	0.0
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]	0.0	0			1.3	0.5	25	2.0	25	0.0	0.0
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]	4.5	25	18.0	100	1.8	4.8	50	4.2	53	0.0	0.0
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2.0 tabl Harmony Plus + 0.2 l vätn) 2) [Syn]	2.8	25	11.0	61	0.0	0.0	0			0.0	0.0
J. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]	0.0	0			0.5	0.0	0			0.0	0.0
K. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]	0.0	0			0.3	0.3	25	1.0	13	0.0	0.0
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	0.0	0			1.0	2.0	50	3.5	43	0.0	0.0
M. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]	0.0	0			2.8	4.5	50	8.8	110	0.0	0.0
N. 70 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Region]	0.0	0			0.0	0.0	0			0.0	0.0
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten 2) Vid tillväxtens början på våren											
STDEV% PROB F1			0					119.4 .8908			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Beh i led N ej enl den ursprungliga planen. Detta led får ej ingå i seriesammanställning.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra och våtarv.

OBS! Baldersbrå, raps, gröe, åkerfräken och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08B Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A891 LÅN-FNR: H-025-2007 JBR.OMR: 6

SIDA 7

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar

ADRESS: Bo Gård, Hossmo, Kalmar

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4	2008-04-01	310	84		
	NS 27-4	2008-05-05	250	68		
	Microplan Mangan 180	2008-06-08	0.4			
SORT:	Skalmeje (ej plöjt,kultivator)					
SÅTT DEN:	2007-09-20 KG/HA: 160					
FÖRFRUKT:	Ärter					
JORDART:	MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM	
PH-VÄRDE:		0.5 Proline + 0.2 Comet	2008-06-08	2007-10-09	DC 11-12	
		0.25 Decis	2008-06-08	2008-04-14	DC 26	

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:	Stat:	Åker-	*	Åkerven*		Åkerven*		Stat:	Åkerven*	
	Frekv % av block	tistel XCIRAR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-03	Rel tal	fältv g/m2 06-03	Rel tal	Frekv % av block	XAPESV g/m2 geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	0			50.3	100	104.8	100	100	102.1	100
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	25	4.0	100	1.0	2	0.8	1	50	1.4	1
C. [Utgår]										
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	25	13.0	325	0.0	0	0.0	0	0		
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]	0			1.5	3	0.5	0	25	2.0	2
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]	0			2.5	5	0.8	1	50	1.4	1
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]	0			1.5	3	0.5	0	50	1.0	1
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]	0			1.3	2	1.0	1	50	2.0	2
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2.0 tabl Harmony Plus + 0.2 l vätm) 2) [Syn]	0			0.5	1	0.0	0	0		
J. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]	0			0.0	0	0.0	0	0		
K. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]	0			1.0	2	0.5	0	50	1.0	1
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	0			0.8	1	0.3	0	25	1.0	1
M. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]	0			0.3	0	0.0	0	0		
N. 70 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Region]	0			0.3	0	0.0	0	0		
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten										
2) Vid tillväxtens början på våren										
STDEV%		0							29.4	
PROB F1									.0001	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Beh i led N ej enl den ursprungliga planen. Detta led får ej ingå i seriesammanställning.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra och våtarv.

OBS! Baldersbrå, raps, gröe, åkerfråken och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

SIDA 8

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5-2424-08B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A891

LÅN-FNR: H-025-2007

JBR.OMR: 6

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar

ADRESS: Bo Gård, Hossmo, Kalmar

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4	2008-04-01	310	84		
	NS 27-4	2008-05-05	250	68		
	Microplan Mangan 180	2008-06-08	0.4			

SORT: Skalmeye (ej plöjt,kultivator)

SÅTT DEN: 2007-09-20 KG/HA: 160

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

BRSSN.GM2:F1 *	A<>M A<>N
MYOSS.GM2:F1 ***	A<>K A<>L A<>M A<>N
MYOSS.GM2:F1 *	A<>I
VERSS.GM2:F1 ***	A<>K
VERSS.GM2:F1 **	A<>L K<>M K<>N L<>M
VERSS.GM2:F1 *	L<>N
VIOSS.GM2:F1 ***	A<>K A<>L K<>N L<>M L<>N
VIOSS.GM2:F1 **	K<>M
WEADT.GM2:F1 ***	A<>F A<>I A<>K A<>L A<>M A<>N F<>M F<>N I<>N L<>M L<>N
WEADT.GM2:F1 **	F<>K I<>M K<>N
WEADT.GM2:F1 *	F<>L K<>M
XAPESV.GM2:F1 ***	A<>B A<>E A<>F A<>G A<>H A<>K A<>L
XAPESV.GM2:F1 *	G<>H H<>K



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08B Äkerväxt och örtgräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A891 LÄN-FNR: H-025-2007 JBR.OMR: 6

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar

ADRESS: Bo Gård, Hossmo, Kalmar

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4	2008-04-01	310	84		
	NS 27-4	2008-05-05	250	68		
	Microplan Mangan 180	2008-06-08	0.4			
SORT:	Skalmeje (ej plöjt,kultivator)					
SÄTT DEN:	2007-09-20 KG/HA: 160					
FÖRFRUKT:	Ärter					
JORDART:	MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO					
PH-VÄRDE:						
	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH	ENL	PLAN
	0.5 Proline + 0.2 Comet	2008-06-08		2007-10-09		GRÖDANS UTV.STADIUM
	0.25 Decis	2008-06-08		2008-04-14		DC 11-12
						DC 26

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2008-10-28

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-29	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg		
A. Obehandlat [Regioner]	11090	100	0.4	19.4	788	41.9	1.96	11.2	74.6	22.3	19.6		
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	12720	115	0.2	19.1	787	41.4	1.96	11.2	74.3	22.4	19.8		
C. [Utgår]													
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	12720	115	0.3	19.1	785	42.1	2.01	11.5	73.9	23.3	19.8		
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätmedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]	12610	114	0.2	19.1	787	42.6	1.98	11.3	74.4	22.7	19.7		
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [SJV]	12880	116	0.2	19.3	784	42.0	1.97	11.2	73.8	22.7	19.6		
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [Bayer]	12790	115	0.2	19.1	785	42.1	1.99	11.3	74.2	22.9	19.5		
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	12640	114	0.2	19.1	788	43.0	2.00	11.4	74.3	22.7	19.1		
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2.0 tabl Harmony Plus + 0.2 l vätm) 2) [Syn]	12780	115	0.3	19.1	788	42.4	1.98	11.3	73.8	22.6	19.4		
J. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]	12790	115	0.2	19.1	789	41.5	2.03	11.6	74.2	22.9	19.5		
K. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätmedel 2) [Bayer]	12750	115	0.2	19.2	789	43.1	2.01	11.5	74.2	23.6	18.7		
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	12610	114	0.2	19.1	788	42.8	1.97	11.2	74.4	22.6	19.7		
M. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätmedel 2) [Monsanto]	12810	115	0.3	19.2	788	42.9	1.95	11.1	74.7	21.7	19.0		
N. 70 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Region]	12740	115	0.2	19.1	786	42.6	1.90	10.9	74.4	21.1	19.2		
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten													
2) Vid tillväxtens början på våren													
-X-	12610												
CV%	1.8												
OBS	52												
PROB F1	.0001												
LSD F1	330												

ANM:

Beh i led N ej enl den ursprungliga planen. Detta led får ej ingå i seriesammanställning.

Missfärgningar 2007-10-17 (DC 12): Guldfärgning i led D, I och J. Gula band tvärs bladen i led I (100 = helt dött).

Missfärgningar 2007-11-21: Led D och J ljusare grön färg jämfört med övriga led: Missfärgningar 2008-04-24: Led L

något ljusare färg än övriga led. Utvecklingsstadier: 2007-10-17 DC 12, 2008-04-14 DC 26.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08B Äkervren och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A891 LÄN-FNR: H-025-2007 JBR.OMR: 6

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar

ADRESS: Bo Gård, Hossmo, Kalmar

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4	2008-04-01	310	84		
	NS 27-4	2008-05-05	250	68		
	Microplan Mangan 180	2008-06-08	0.4			
SORT:	Skalmeje (ej plöjt,kultivator)					
SÅTT DEN:	2007-09-20 KG/HA: 160					
FÖRFRUKT:	Ärter					
JORDART:	MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO					
PH-VÄRDE:						
	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH	ENL	PLAN
	0.5 Proline + 0.2 Comet	2008-06-08		2007-10-09		GRÖDANS UTV.STADIUM
	0.25 Decis	2008-06-08		2008-04-14		DC 11-12
						DC 26

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2008-10-28

F Ö R S Ö K S L E D:	Miss färgn höst 0-100 10-17	Miss färgn höst 0-100 11-21	Be stånd vår 0-100 04-14	Miss färgn vår 0-100 04-24	Strå st vid skörd 08-29	Ogräs före komst grad 08-29								
A. Obehandlat [Regioner]	0	0	100	0	97	0								
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	0	0	100	0	98	0								
C. [Utgår]														
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	11	10	100	0	99	0								
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]	0	0	100	0	99	0								
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]	0	0	100	0	95	0								
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]	0	0	100	0	98	0								
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]	0	0	100	0	99	0								
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2.0 tabl Harmony Plus + 0.2 l vätn) 2) [Syn]	6	0	100	0	100	0								
J. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]	13	10	100	0	100	0								
K. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]			100	0	93	0								
L. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]			100	1	99	0								
M. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]			100	0	97	0								
N. 70 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Region]			100	0	100	0								
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten														
2) Vid tillväxtens början på våren														
-X-					98									
CV%					3.7									
OBS					52									
PROB F1					.3344									
LSD F1					5									

ANM:

Beh i led N ej enl den ursprungliga planen. Detta led får ej ingå i seriesammanställning.

Missfärgningar 2007-10-17 (DC 12): Gulsfärgning i led D, I och J. Gula band tvärs bladen i led I (100 = helt dött).

Missfärgningar 2007-11-21: Led D och J ljusare grön färg jämfört med övriga led: Missfärgningar 2008-04-24: Led L något ljusare färg än övriga led. Utvecklingsstadier: 2007-10-17 DC 12, 2008-04-14 DC 26.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08B Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A891

LÅN-FNR: H-025-2007

JBR.OMR: 6

SIDA 3

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Ljungar

ADRESS: Bo Gård, Hossmo, Kalmar

		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
		NS 27-4	2008-04-01	310	84		
		NS 27-4	2008-05-05	250	68		
SORT: Skalmeje (ej plöjt,kultivator)		Microplan Mangan 180	2008-06-08	0.4			
SÅTT DEN: 2007-09-20 KG/HA: 160							
FÖRFRUKT: Årter							
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO	VÄXTSKYDD		DATUM		BEH	ENL	PLAN
							GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 ***

A<>B A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M A<>N

STS.SH:F1 *

B<>K D<>K E<>K H<>K I<>K J<>K K<>L K<>N