



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A892

LÅN-FNR: E-179-2007

JBR.OMR: 12b

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING
NPK 27-3-3DATUM
2008-04-08
MÄNGD KG/HA
560N P K
149 15 15

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2007-10-04

DC 11.5

2008-05-05

DC 29

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:

	Balders- brå st/m2 06-26	Rel tal	Balders- brå fältv g/m2 06-26	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Balders- brå MATIN g/m2 geom.	Rel tal	Hampdån st/m2 06-26	Rel tal	Hampdån fältv g/m2 06-26	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	0.8	100	27.8	100	50	55.1	100	2.3	100	3.5	100
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			0.8	33	1.3	36
C. [Utgår]											
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			2.8	122	6.8	193
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätn) 2) [Syn]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
J. (1.0 l Boxer + 0.2 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätn) 2) [Syn]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
K. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Syngenta/DuPont]	0.3	33	1.8	6	25	7.0	13	5.0	222	19.3	550
L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	0.3	33	0.3	1	25	1.0	2	0.0	0	0.0	0
N. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]	0.3	33	0.3	1	25	1.0	2	0.0	0	0.0	0
O. [Utgår]											
P. 20 g Monitor + 0.8 tabl Ally 50 ST + vätnedel 2) [Monsanto]	0.3	33	0.8	3	25	3.0	5	0.0	0	0.0	0

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%
PROB F116.6
.0609ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led H och I block IV kasserade p.g.a. felbeh.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, jordrök, snärjmåra.

OBS! Baldersbrå och hampdån får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A892

LÅN-FNR: E-179-2007

JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING
NPK 27-3-3DATUM MÄNGD KG/HA
2008-04-08 560N P K
149 15 15

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2007-10-04

DC 11.5

2008-05-05

DC 29

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:

Stat: Frekv % av block	Hampdån GAESP g/m2 geom.	Rel tal	Lomme st/m2 06-26	Rel tal	Lomme fältv g/m2 06-26	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Lomme CAPBP g/m2 geom.	Rel tal	Viol st/m2 06-26
A. Obehandlat [Regioner]	100	2.8	100	6.8	100	47.3	100	100	100	11.8
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	50	2.4	88	0.0	0	0.0	0	0		0.0
C. [Utgår]										
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	100	6.3	228	0.0	0	0.0	0	0		0.0
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]	0			0.0	0	0.0	0	0		0.0
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]	0			0.0	0	0.0	0	0		0.0
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]	0			0.0	0	0.0	0	0		0.0
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]	0			0.0	0	0.0	0	0		0.0
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätnedel) 2) [Syn]	0			0.0	0	0.0	0	0		0.0
J. (1.0 l Boxer + 0.2 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätnedel) 2) [Syn]	0			0.0	0	0.0	0	0		0.0
K. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Syngenta/DuPont]	100	9.1	329	0.3	4	0.3	1	25	1.0	3
L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]	0			0.0	0	0.0	0	0		6.5
M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	0			0.0	0	0.0	0	0		4.0
N. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]	0			0.0	0	0.0	0	0		9.8
O. [Utgår]										
P. 20 g Monitor + 0.8 tabl Ally 50 ST + vätnedel 2) [Monsanto]	0			0.0	0	0.0	0	0		4.0
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten										
2) Vid tillväxtens början på våren										
STDEV%	103.8							78.7		
PROB F1	.3409							.0261		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led H och I block IV kasserade p.g.a. felbeh.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, jordrök, snärjmåra.

OBS! Baldersbrå och hampdån får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A892 LÅN-FNR: E-179-2007 JBR.OMR: 12b

SIDA 3

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING
NPK 27-3-3DATUM MÄNGD KG/HA
2008-04-08 560N P K
149 15 15

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2007-10-04

DC 11.5

2008-05-05

DC 29

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:

	Rel tal	Viol fältv g/m2 06-26	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Våtarv st/m2 06-26	Rel tal	Våtarv fältv g/m2 06-26	Rel tal	Stat: Frekv % av block
A. Obehandlat [Regioner]	100	22.0	100	100	11.7	100	9.5	100	78.3	100	100
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
C. [Utgår]											
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	0	0.0	0	0			0.5	5	0.8	1	50
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätnedel) 2) [Syn]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
J. (1.0 l Boxer + 0.2 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätnedel) 2) [Syn]	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
K. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Syngenta/DuPont]	0	0.0	0	0			1.5	16	1.8	2	75
L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]	55	11.8	53	100	7.6	65	0.0	0	0.0	0	0
M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	34	5.3	24	75	5.5	47	0.3	3	0.5	1	25
N. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]	83	19.5	89	100	16.6	141	0.0	0	0.0	0	0
O. [Utgår]											
P. 20 g Monitor + 0.8 tabl Ally 50 ST + vätnedel 2) [Monsanto]	34	6.0	27	100	4.4	37	0.8	8	0.8	1	25
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten											
2) Vid tillväxtens början på våren											
STDEV%					118.1						
PROB F1					.5327						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led H och I block IV kasserade p.g.a. felbeh.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, jordrök, snärjmåra.

OBS! Baldersbrå och hampdån får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A892

LÅN-FNR: E-179-2007

JBR.OMR: 12b

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING
NPK 27-3-3DATUM
2008-04-08
MÄNGD KG/HA
560N P K
149 15 15

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2007-10-04

DC 11.5

2008-05-05

DC 29

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:

Vätarv	STEME g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år örtogräs st/m2 06-26	Rel tal	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2 06-26	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel tal	Samt 1år örtogräs st/m2 06-26	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	62.3	100	2.0	100	9.0	100	75	9.6	100	33.0	100
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]			0.3	13	0.3	3	25	1.0	10	1.0	3
C. [Utgår]											
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	1.4	2	1.5	75	3.8	42	50	6.0	63	4.8	14
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]			0.3	13	0.3	3	25	1.0	10	0.3	1
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]			0.5	25	1.5	17	25	6.0	63	0.5	2
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]			0.6	30	2.4	27	25	8.0	83	0.6	2
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätn) 2) [Syn]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0
J. (1.0 l Boxer + 0.2 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätn) 2) [Syn]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0
K. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Syngenta/DuPont]	2.0	3	1.5	75	1.5	17	75	1.8	19	8.5	26
L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]			3.5	175	7.5	83	50	12.0	125	10.0	30
M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	2.0	3	2.0	100	4.5	50	75	3.7	39	6.5	20
N. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]			3.3	163	4.3	47	100	3.1	32	13.3	40
O. [Utgår]											
P. 20 g Monitor + 0.8 tabl Ally 50 ST + vätnedel 2) [Monsanto]	3.0	5	3.3	163	5.5	61	75	6.6	69	8.3	25
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten											
2) Vid tillväxtens början på våren											
STDEV%	73.4							90.9			
PROB F1	.0031							.2476			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led H och I block IV kasserade p.g.a. felbeh.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, jordrök, snärjmåra.

OBS! Baldersbrå och hampdån får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A892 LÅN-FNR: E-179-2007 JBR.OMR: 12b

SIDA 5

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING
NPK 27-3-3DATUM
2008-04-08 MÄNGD KG/HA
560N P K
149 15 15

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2007-10-04

DC 11.5

2008-05-05

DC 29

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:	Samt lär örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lär örtogräs		Kvick- rot fältv g/m2 06-26	*	Stat: Frekv % av block	Kvick- rot XAGRRE g/m2 geom.	*	Åkerven*
	fältv g/m2 06-26	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal						st/m2 06-26
A. Obehandlat [Regioner]	187.8	100	100	176.5	100	5.0	100	100	4.2	100	20.0
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	1.5	1	50	2.8	2	10.0	200	100	7.6	182	7.5
C. [Utgår]											
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]	11.3	6	100	8.8	5	8.0	160	100	7.5	181	6.8
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätmedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]	0.3	0	25	1.0	1	0.0	0	0			1.3
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [SJV]	1.5	1	25	6.0	3	0.0	0	0			3.5
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [Bayer]	0.0	0	0			0.0	0	0			2.0
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]	2.6	1	25	8.0	5	8.6	172	75	6.6	159	0.3
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätm) 2) [Syn]	0.0	0	0			8.9	179	75	6.9	165	2.0
J. (1.0 l Boxer + 0.2 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätm) 2) [Syn]	0.0	0	0			9.0	180	100	6.8	164	0.8
K. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Syngenta/DuPont]	24.5	13	100	16.2	9	5.5	110	100	4.2	102	5.5
L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätmedel 2) [Bayer]	19.3	10	100	11.0	6	0.0	0	0			1.5
M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	10.5	6	75	13.9	8	7.0	140	100	5.6	134	0.5
N. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätmedel 2) [Monsanto]	24.0	13	100	21.0	12	0.0	0	0			1.5
O. [Utgår]											
P. 20 g Monitor + 0.8 tabl Ally 50 ST + vätmedel 2) [Monsanto]	13.0	7	100	10.8	6	0.0	0	0			5.3
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten 2) Vid tillväxtens början på våren											
STDEV%				90.8					79.3		
PROB F1				.0010					.9111		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led H och I block IV kasserade p.g.a. felbeh.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, jordrök, snärjmåra.

OBS! Baldersbrå och hampdån får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A892 LÅN-FNR: E-179-2007 JBR.OMR: 12b

SIDA 6

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING
NPK 27-3-3DATUM MÄNGD KG/HA
2008-04-08 560N P K
149 15 15

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2007-10-04

DC 11.5

2008-05-05

DC 29

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]
C. [Utgår]
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus + 0.1 vol-% vätnedel + 12.5 g Monitor) 2) [DOW]
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Syn]
J. (1.0 l Boxer + 0.2 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Syn]
K. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Syngenta/DuPont]
L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]
M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]
N. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]
O. [Utgår]
P. 20 g Monitor + 0.8 tabl Ally 50 ST + vätnedel 2) [Monsanto]

Rel tal	Åkerven* fältv g/m2 06-26	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Åkerven* XAPESV g/m2 geom.	Rel tal					
100	107.8	100	100	89.2	100					
38	21.8	20	100	21.3	24					
34	19.8	18	75	24.2	27					
6	1.0	1	25	4.0	4					
18	2.0	2	50	2.6	3					
10	1.3	1	75	1.6	2					
2	0.4	0	25	1.0	1					
10	4.9	5	50	5.9	7					
4	0.8	1	75	1.0	1					
28	17.3	16	75	18.6	21					
8	1.0	1	75	1.3	1					
3	2.5	2	25	10.0	11					
8	2.0	2	75	2.2	2					
26	5.5	5	75	6.6	7					
				61.0						
				.0001						

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led H och I block IV kasserade p.g.a. felbeh.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, jordrök, snärjmåra.

OBS! Baldersbrå och hampdån får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2008
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-2424-08C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A892 LÅN-FNR: E-179-2007 JBR.OMR: 12b GRÖDA: Höstvete
FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos
ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

SIDA 7

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-3	2008-04-08	560	149	15	15

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
--	-----------	-------	--------------	---------------------

CAPBP.GM2:F1 *	A<>K
MATIN.GM2:F1 *	A<>M A<>N A<>P
STEME.GM2:F1 ***	A<>D A<>K
STEME.GM2:F1 **	A<>M
STEME.GM2:F1 *	A<>P
WEADR.GM2:F1 *	A<>K B<>L E<>L K<>L
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B A<>D A<>E A<>L A<>P
WEADT.GM2:F1 **	A<>F A<>H A<>K A<>M A<>N E<>N
WEADT.GM2:F1 *	B<>K B<>N D<>E E<>K E<>L E<>M E<>P
XAPESV.GM2:F1 ***	A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>L A<>N A<>P B<>F B<>G B<>H B<>J B<>L
XAPESV.GM2:F1 ***	B<>N D<>F D<>G D<>H D<>J D<>L D<>N G<>K H<>K J<>K J<>P K<>L K<>N
XAPESV.GM2:F1 **	A<>B A<>K A<>M F<>K G<>P I<>J J<>M L<>M L<>P
XAPESV.GM2:F1 *	A<>D B<>E B<>I B<>P D<>E D<>I D<>P E<>K G<>I G<>M H<>I H<>M H<>P I<>L
XAPESV.GM2:F1 *	K<>P M<>N N<>P



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkervren och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A892 LÅN-FNR: E-179-2007 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING
NPK 27-3-3

DATUM
2008-04-08

MÄNGD KG/HA
560

N P K
149 15 15

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2007-10-04
2008-05-05

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 11.5
DC 29

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2008-10-28

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]
C. [Utgår]
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätmedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [SJV]
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [Bayer]
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätm) 2) [Syn]
J. (1.0 l Boxer + 0.2 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätm) 2) [Syn]
K. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Syngenta/DuPont]
L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätmedel 2) [Bayer]
M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]
N. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätmedel 2) [Monsanto]
O. [Utgår]
P. 20 g Monitor + 0.8 tabl Ally 50 ST + vätmedel 2) [Monsanto]

- 1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-29	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg		
8540	100	0.7	19.7	802	45.5	2.03	11.6	73.1	23.5	19.3		
10260	120	0.9	20.6	789	45.3	2.05	11.6	73.2	23.0	19.3		
10540	123	0.9	21.2	789	45.0	2.08	12.0	73.0	24.1	19.7		
9610	112	0.5	20.0	794	45.0	2.15	12.1	73.1	24.6	19.0		
10200	119	0.8	20.5	793	44.9	2.13	12.1	73.2	24.5	19.8		
9790	115	0.8	20.7	789	45.0	2.08	11.9	73.3	23.9	19.5		
10220	120	1.0	21.1	786	43.8	2.08	11.9	72.8	23.8	19.0		
10270	120	0.9	21.0	785	45.8	2.08	11.8	73.2	23.4	19.8		
10510	123	0.9	20.7	784	44.6	2.10	11.9	73.0	24.0	19.4		
10390	122	0.9	20.7	790	45.9	2.13	12.2	73.1	24.3	19.1		
9450	111	0.5	19.5	802	46.8	2.10	12.0	73.0	24.9	19.5		
9310	109	0.6	20.2	795	45.2	2.10	11.9	73.0	24.4	18.9		
9820	115	0.6	19.9	798	45.8	2.08	11.9	72.9	24.3	19.4		
9710	114	0.7	20.2	795	46.5	2.13	12.0	73.0	24.1	19.1		
9890												
4.7												
54												
.0001												
690												

ANM:

Led H och I block IV kasserade p.g.a. felbeh.
Missfärgning 2007-10-15 och 2008-05-13: Gulfärgning.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A892

LÅN-FNR: E-179-2007

JBR.OMR: 12b

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Roos

ADRESS: Tuna Kungsgård, Rystad, Linköping

GÖDSLING
NPK 27-3-3

DATUM
2008-04-08

MÄNGD KG/HA
560

N P K
149 15 15

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 ***	A<>B A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>N D<>M J<>M
Y.M15:F1 **	A<>E A<>L A<>P B<>M D<>E D<>L E<>J F<>M J<>L K<>L K<>M
Y.M15:F1 *	A<>M B<>L D<>G D<>N D<>P E<>K F<>L G<>J H<>M I<>L I<>M J<>N J<>P K<>P
STS.SH:F1 ***	A<>B A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K
STS.SH:F1 **	A<>E G<>L G<>M J<>L
STS.SH:F1 *	A<>N A<>P B<>L B<>M D<>L D<>M F<>L F<>M G<>N G<>P H<>L H<>M I<>L I<>M
STS.SH:F1 *	J<>M J<>N K<>L

Jordanalys:

ADB-nr: 05A892
Serienr: L5-2424-08C
Län-fnr: E-179-2007

Jordart:	mmh I Mj	pH:	6.5		
Mullhalt %:	3.7	P-AL (mg/100g):	7.9	KI:	III
Lerhalt %:	9.0	K-AL (mg/100g):	15.3	KI:	III
Mjåla %:	63.0	Mg-AL (mg/100g):	15.8		
Sand+grovmå %:	24.3	K/Mg (mg/100g):	1.0		
		Ca-AL (mg/100g):	248		
		K-HCl (mg/100g):	125	KI:	3
		Cu-HCl (mg/kg):	10.4		
		P-HCl (mg/100g):	54	KI:	3