



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkervens och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A893

LÅN-FNR: E-180-2007

JBR.OMR: 12b

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

Axan

2008-04-15

205

55

Axan

2008-05-08

270

73

Axan

2008-06-02

125

34

SORT: Lars

SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SAND

PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2007-10-04

DC 11.5

2008-05-06

DC 25

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]
C. [Utgår]
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätnedel) 2) [Syn]
J. (1.0 l Boxer + 0.2 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätnedel) 2) [Syn]
K. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Syngenta/DuPont]
L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]
M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]
N. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]
O. [Utgår]
P. 20 g Monitor + 0.8 tabl Ally 50 ST + vätnedel 2) [Monsanto]

Blåklint		Blåklint		Stat:	Blåklint		Åker-	Rel	Åker-	Rel
st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	CENCY	Rel	senap		senap	
06-25	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	st/m2	tal	fältv	tal
		06-25		block	geom.		06-25		06-25	
1.0	100	99.0	100	67	142.0	100	3.0	100	18.3	100
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
1.0	100	39.0	39	67	53.1	37	0.0	0	0.0	0
0.7	67	25.0	25	33	75.0	53	0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
0.3	33	4.3	4	33	13.0	9	0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
0.3	33	3.3	3	33	10.0	7	1.0	33	1.7	9
0.3	33	53.3	54	33	160.0	113	0.0	0	0.0	0
0.3	33	1.3	1	33	4.0	3	0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
53.9										
.1135										

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV kasserad av Inst för växtproduktionsekologi, led A i detta block skadegränsat.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, lomme, viol, åkerbinda.

OBS! Blåklint, åkersenap och fräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A893

LÅN-FNR: E-180-2007

JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

SORT: Lars

SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SAND

PH-VÄRDE: 6.8

GÖDSLING

Axan

Axan

Axan

DATUM

2008-04-15

2008-05-08

2008-06-02

MÄNGD KG/HA

205

270

125

N P K

55

73

34

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2007-10-04

2008-05-06

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 11.5

DC 25

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. [Utgår]

D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]

E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätmiddel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]

F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmiddel) 2) [SJV]

G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmiddel) 2) [Bayer]

H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]

I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätm) 2) [Syn]

J. (1.0 l Boxer + 0.2 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätm) 2) [Syn]

K. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Syngenta/DuPont]

L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätmiddel 2) [Bayer]

M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

N. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätmiddel 2) [Monsanto]

O. [Utgår]

P. 20 g Monitor + 0.8 tabl Ally 50 ST + vätmiddel 2) [Monsanto]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

Stat: Frekv % av block	Åker- senap SINAR g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år örtogräs st/m2 06-25	Rel tal	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2 06-25	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel tal	Samt lå örtogräs st/m2 06-25
100	17.1	100	2.3	100	4.0	100	67	5.7	100	6.3
0			0.3	14	0.7	17	33	2.0	35	0.3
0			1.3	57	1.0	25	100	1.0	18	1.3
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			1.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.7
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.3
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
67	2.0	12	0.0	0	0.0	0	0			1.3
0			1.7	71	4.7	117	67	4.9	87	2.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.3
0			1.3	57	2.7	67	67	3.9	68	1.3
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
	68.5							62.9		
	.0413							.1150		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV kasserad av Inst för växtproduktionsekologi, led A i detta block skadegränsat.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, lomme, viol, åkerbinda.

OBS! Blåklint, åkersenap och fräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A893

LÅN-FNR: E-180-2007

JBR.OMR: 12b

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

SORT: Lars

SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SAND

PH-VÄRDE: 6.8

GÖDSLING

Axan

Axan

Axan

DATUM

2008-04-15

2008-05-08

2008-06-02

MÄNGD KG/HA

205

270

125

N P K

55

73

34

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2007-10-04

2008-05-06

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 11.5

DC 25

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. [Utgår]

D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]

E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]

F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]

G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]

H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]

I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätnedel) 2) [Syn]

J. (1.0 l Boxer + 0.2 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätnedel) 2) [Syn]

K. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Syngenta/DuPont]

L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]

M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

N. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]

O. [Utgår]

P. 20 g Monitor + 0.8 tabl Ally 50 ST + vätnedel 2) [Monsanto]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

Rel tal	Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs		Fräken *		Fräken *		Stat: Frekv % av block
	fältv g/m2 06-25	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-25	Rel tal	fältv g/m2 06-25	Rel tal	
100	121.3	100	100	79.6	100	0.3	100	1.7	100	33
5	0.7	1	33	2.0	3	0.0	0	0.0	0	0
21	1.0	1	100	1.0	1	2.0	600	7.0	420	33
0	0.0	0	0			1.0	300	4.0	240	33
16	39.0	32	67	53.1	67	1.3	400	4.3	260	33
11	25.0	21	33	75.0	94	0.0	0	0.0	0	0
0	0.0	0	0			1.3	400	5.7	340	33
5	4.3	4	33	13.0	16	0.0	0	0.0	0	0
0	0.0	0	0			1.3	400	5.7	340	33
21	5.0	4	67	6.6	8	0.7	200	1.3	80	33
32	58.0	48	100	15.7	20	2.0	600	8.3	500	33
5	1.3	1	33	4.0	5	0.0	0	0.0	0	0
21	2.7	2	67	3.9	5	0.0	0	0.0	0	0
0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
				125.6						
				.0516						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV kasserad av Inst för växtproduktionsekologi, led A i detta block skadegränsat.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, lomme, viol, åkerbinda.

OBS! Blåklint, åkersenap och fräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A893

LÅN-FNR: E-180-2007

JBR.OMR: 12b

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

SORT: Lars

SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SAND

PH-VÄRDE: 6.8

GÖDSLING

Axan

Axan

Axan

DATUM

2008-04-15

2008-05-08

2008-06-02

MÄNGD KG/HA

205

270

125

N P K

55

73

34

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2007-10-04

2008-05-06

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 11.5

DC 25

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-07-02

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. [Utgår]

D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]

E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]

F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]

G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]

H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]

I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätnedel) 2) [Syn]

J. (1.0 l Boxer + 0.2 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätnedel) 2) [Syn]

K. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Syngenta/DuPont]

L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]

M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

N. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]

O. [Utgår]

P. 20 g Monitor + 0.8 tabl Ally 50 ST + vätnedel 2) [Monsanto]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

GISKARTISDATA 2012-07-02										
Fräken *		Åkerven*		Åkerven*		Stat:	Åkerven*			
XEQUSS	Rel		Rel	fältv	Rel	Frekv	XAPESV	Rel		
g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal		
geom.		06-25		06-25		block	geom.			
5.0	100	75.0	100	436.3	100	100	431.4	100		
		2.3	3	21.0	5	100	16.1	4		
21.0	420	0.0	0	0.0	0	0				
12.0	240	12.0	16	44.7	10	100	34.7	8		
13.0	260	18.7	25	98.7	23	100	96.7	22		
		23.0	31	100.0	23	100	89.2	21		
17.0	340	17.3	23	96.3	22	100	91.1	21		
		0.7	1	0.7	0	33	2.0	0		
17.0	340	1.0	1	13.0	3	67	14.1	3		
4.0	80	1.3	2	7.0	2	33	21.0	5		
25.0	500	41.7	56	134.7	31	100	134.6	31		
		54.0	72	177.3	41	100	174.8	41		
		35.0	47	113.7	26	100	91.6	21		
		22.0	29	58.0	13	100	50.5	12		
0							64.6			
							.0001			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV kasserad av Inst för växtproduktionsekologi, led A i detta block skadegränsat.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, lomme, viol, åkerbinda.

OBS! Blåklint, åkersenap och fräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

SIDA 5

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5-2424-08C Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A893

LÅN-FNR: E-180-2007

JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

SORT: Lars

SÅTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SAND

GÖDSLING

Axan

Axan

Axan

DATUM

2008-04-15

2008-05-08

2008-06-02

MÄNGD KG/HA

205

270

125

N P K

55

73

34

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CENCY.GM2:F1 * A<>M L<>M
SINAR.GM2:F1 * A<>K
WEADR.GM2:F1 * A<>D D<>L
WEADT.GM2:F1 ** A<>D D<>F
WEADT.GM2:F1 * A<>B A<>N D<>G D<>L
XAPESV.GM2:F1 *** A<>B A<>E A<>I A<>J A<>K A<>P B<>L B<>M E<>I F<>I G<>I H<>I I<>L I<>M
XAPESV.GM2:F1 *** I<>N I<>P J<>L J<>M
XAPESV.GM2:F1 ** A<>F A<>G A<>H A<>N B<>F B<>G B<>H B<>N E<>M F<>J G<>J H<>J J<>N K<>M
XAPESV.GM2:F1 * A<>L B<>I B<>P E<>L I<>J I<>K J<>P K<>L M<>P



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08C Åkervren och örtogräs i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05A893 LÅN-FNR: E-180-2007 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

GÖDSLING

Axan

Axan

Axan

DATUM

2008-04-15

2008-05-08

2008-06-02

MÄNGD KG/HA

205

270

125

N

55

73

34

P

K

SORT: Lars

SÄTT DEN: 2007-09-17 KG/HA: 170

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SAND

PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2007-10-04

2008-05-06

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 11.5

DC 25

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2008-10-28

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]
C. [Utgår]
D. 1.5 l Boxer + 50 g Pico + 10 g Lexus 1) [BASF]
E. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus +0.1 vol-% vätnedel +12.5 g Monitor) 2) [DOW]
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [SJV]
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätnedel) 2) [Bayer]
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]
I. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätn) 2) [Syn]
J. (1.0 l Boxer + 0.2 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus +0.1 vol-% vätn) 2) [Syn]
K. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Syngenta/DuPont]
L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Bayer]
M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Bayer]
N. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätnedel 2) [Monsanto]
O. [Utgår]
P. 20 g Monitor + 0.8 tabl Ally 50 ST + vätnedel 2) [Monsanto]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

Miss färgn höst 0-100 10-15	Miss färgn vår 0-100 05-26	Nek roser vår 0-100 05-26	Tillv hämn vår 0-100 05-26										
0	10	0	5										
0	0	0	0										
4	0	0	0										
0	1	0	0										
0	3	0	0										
0	1	0	0										
0	2	0	0										
4	0	0	0										
4	0	0	0										
8	0	0	0										
	17	10	10										
	18	10	10										
	10	0	0										
	10	0	0										

ANM:

Block IV kasserad av Inst för växtproduktionsekologi, led A i detta block skadegränsat.

Missfärgningar: Guldfärgning.

Skörden KASSERAD, försöket torkskadat.

Jordanalys:

ADB-nr: 05A893
Serienr: L5-2424-08C
Län-fnr: E-180-2007

Jordart: nmh Sa

Mullhalt %: 2.1

Lerhalt %: 0.0

Mjåla %: 18.0

Sand+grovmå %: 79.9

pH: 6.8

P-AL (mg/100g): 16.2

K-AL (mg/100g): 9.4

Mg-AL (mg/100g): 8.7

K/Mg (mg/100g): 1.1

Ca-AL (mg/100g): 221

K-HCl (mg/100g): 35

Cu-HCl (mg/kg): 0.5

P-HCl (mg/100g): 50

KI: V

KI: III

KI: 1

KI: 3