

R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08D Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A905

LÄN-FNR: N-546-2007

JBR.OMR: 7

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Carl-Anders Carlsson

ADRESS: Hovgård, Söndrum, Halmstad

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Harnesk

SÅTT DEN: 2007-10-07 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV. STADIUM

2007-11-27

1.5 blad

2008-05-05

DC 30

RESULTS:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-07

F Ö R S Ö K S L E D:

F Ö R S Ö K S L E D:		Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Förgät-migej		Förgät-migej	
		st/m2 06-03	Rel tal	fältv g/m2 06-03	Rel tal		MATIN g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-03	Rel tal	fältv g/m2 06-03	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]		14.5	100	97.0	100	75	127.0	100	11.5	100	24.5	100
B. 1.25 l Bacara 1) [Animaliebältet]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
C. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus + 0.1 vol-% vätningsmedel + 12.5 g Monitor) 2) [AB]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
D. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätningsmedel) 2) [SJV]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
E. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätningsmedel) 2) [AB]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
F. 0.3 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Animaliebältet]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
G. 0.3 l Bacara 1) + (12.5 g Monitor + 1 tabl Express + 0.1 vol-% vätningsmedel) 2) [AB]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
H. (1.0 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.1 vol-% vätningsmedel) 2) [AB]		1.5	10	14.5	15	50	28.8	23	0.0	0	0.0	0
I. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Animaliebältet]		2.5	17	0.5	1	25	2.0	2	0.0	0	0.0	0
J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Animaliebältet]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
K. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätningsmedel 2) [Animaliebältet]		1.5	10	2.5	3	25	10.0	8	2.0	17	0.5	2
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten												
2) Vid tillväxtens början på våren												
STDEV%							21.5					
PROB F1							.0015					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Skörden KASSERAD.

Led D och E inom block I och III omkastade.

OBS! Kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08D Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A905 LÅN-FNR: N-546-2007 JBR.OMR: 7

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Carl-Anders Carlsson

ADRESS: Hovgård, Söndrum, Halmstad

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Harnesk

SÅTT DEN: 2007-10-07 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2007-11-27

1.5 blad

2008-05-05

DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-07

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Animaliebältet]

C. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus + 0.1 vol-% vätmedel + 12.5 g Monitor) 2) [AB]

D. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [SJV]

E. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [AB]

F. 0.3 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Animaliebältet]

G. 0.3 l Bacara 1) + (12.5 g Monitor + 1 tabl Express + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [AB]

H. (1.0 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.1 vol-% vätm) 2) [AB]

I. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Animaliebältet]

J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Animaliebältet]

K. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätmedel 2) [Animaliebältet]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

Stat: Frekv % av block	Förgät- migej MYOSS g/m2 geom.	Rel tal	Styv- morsviol st/m2 06-03	Rel tal	Styv- morsviol fältv g/m2 06-03	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Styv- morsviol VIOTR g/m2 geom.	Rel tal	Våtarv st/m2 06-03
75	25.7	100	74.5	100	153.0	100	100	141.2	100	13.5
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			2.5	3	0.5	0	25	2.0	1	0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			0.5	1	0.0	0	0			0.0
0			0.5	1	0.0	0	0			0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
25	2.0	8	11.5	15	5.0	3	75	4.8	3	0.0
	84.8							72		
	.1210							.0024		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Skörden KASSERAD.

Led D och E inom block I och III omkastade.

OBS! Kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08D Åkerven och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05A905 LÅN-FNR: N-546-2007 JBR.OMR: 7

SIDA 3

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Carl-Anders Carlsson

ADRESS: Hovgård, Söndrum, Halmstad

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Harnesk

SÅTT DEN: 2007-10-07 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2007-11-27

1.5 blad

2008-05-05

DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-07

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Animaliebältet]

C. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus + 0.1 vol-% vätmedel + 12.5 g Monitor) 2) [AB]

D. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [SJV]

E. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [AB]

F. 0.3 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Animaliebältet]

G. 0.3 l Bacara 1) + (12.5 g Monitor + 1 tabl Express + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [AB]

H. (1.0 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.1 vol-% vätm) 2) [AB]

I. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Animaliebältet]

J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Animaliebältet]

K. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätmedel 2) [Animaliebältet]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

Rel tal	Våtarv fältv g/m2 06-03	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Våtarv STEME g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år örtogräs st/m2 06-03	Rel tal	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2 06-03	Rel tal	Stat: Frekv % av block
100	40.0	100	75	45.4	100	7.0	100	6.5	100	50
0	0.0	0	0			0.5	7	0.0	0	0
0	0.0	0	0			3.5	50	1.0	15	25
0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0	0.0	0	0			1.5	21	0.5	8	25
0	0.0	0	0			1.0	14	0.0	0	0
0	0.0	0	0			3.0	43	0.0	0	0
0	0.0	0	0			4.0	57	1.5	23	25
0	0.0	0	0			8.0	114	2.5	38	75
0	0.0	0	0			3.0	43	1.0	15	50
0	0.0	0	0			5.5	79	8.0	123	50
				67.4						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Skörden KASSERAD.

Led D och E inom block I och III omkastade.

OBS! Kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08D Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A905 LÅN-FNR: N-546-2007 JBR.OMR: 7

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Carl-Anders Carlsson

ADRESS: Hovgård, Söndrum, Halmstad

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Harnesk

SÅTT DEN: 2007-10-07 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2007-11-27

1.5 blad

2008-05-05

DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-07

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Animaliebältet]

C. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus + 0.1 vol-% vätmedel + 12.5 g Monitor) 2) [AB]

D. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [SJV]

E. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [AB]

F. 0.3 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Animaliebältet]

G. 0.3 l Bacara 1) + (12.5 g Monitor + 1 tabl Express + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [AB]

H. (1.0 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.1 vol-% vätm) 2) [AB]

I. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Animaliebältet]

J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Animaliebältet]

K. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätmedel 2) [Animaliebältet]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

Övr 1-år örtogräs		Samt 1år örtogräs		Samt 1år örtogräs		Stat:	Samt 1år örtogräs		Kvick-	*
WEADR	Rel	WEADR	Rel	fältv	Rel	Frekv	WEADT	Rel	rot	
g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	fältv	Rel
geom.		06-03		06-03		block	geom.		06-03	tal
11.0	100	121.0	100	321.0	100	100	303.2	100	1.0	100
		0.5	0	0.0	0	0			0.0	0
4.0	37	6.0	5	1.5	0	25	6.0	2	0.0	0
		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0
2.0	18	1.5	1	0.5	0	25	2.0	1	0.0	0
		1.0	1	0.0	0	0			0.0	0
		3.0	2	0.0	0	0			0.0	0
6.0	55	6.0	5	16.0	5	50	32.0	11	0.0	0
2.9	26	11.0	9	3.0	1	75	3.2	1	0.0	0
2.0	18	3.0	2	1.0	0	50	2.0	1	0.0	0
15.9	145	20.5	17	16.0	5	75	15.9	5	0.0	0
55.9							63.7			
.0769							.0001			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Skörden KASSERAD.

Led D och E inom block I och III omkastade.

OBS! Kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-08D Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05A905 LÅN-FNR: N-546-2007 JBR.OMR: 7

SIDA 5

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Carl-Anders Carlsson

ADRESS: Hovgård, Söndrum, Halmstad

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Harnesk

SÅTT DEN: 2007-10-07 KG/HA:

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2007-11-27

2008-05-05

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 blad

DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-07

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.25 l Bacara 1) [Animaliebältet]
C. 0.3 l Bacara 1) + (0.075 l Primus + 0.1 vol-% vätmedel + 12.5 g Monitor) 2) [AB]
D. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [SJV]
E. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [AB]
F. 0.3 l Bacara 1) + (100 g Hussar + 0.5 l Renol) 2) [Animaliebältet]
G. 0.3 l Bacara 1) + (12.5 g Monitor + 1 tabl Express + 0.1 vol-% vätmedel) 2) [AB]
H. (1.0 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.1 vol-% vätm) 2) [AB]
I. (1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara) 1) [Animaliebältet]
J. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar + 0.5 l Renol 2) [Animaliebältet]
K. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 vol-% vätmedel 2) [Animaliebältet]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%
PROB F1

Stat: Frekv % av block	Åkerven* st/m2 06-03	Rel tal	Åkerven* fältv g/m2 06-03	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Åkerven* XAPESV g/m2 geom.	Rel tal			
25	13.0	100	25.0	100	75	16.9	100			
0	0.0	0	0.0	0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0					
0	1.5	12	5.0	20	50	9.2	54			
0	0.0	0	0.0	0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0					
						154.7				
						.6949				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Skörden KASSERAD.

Led D och E inom block I och III omkastade.

OBS! Kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2008
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-2424-08D Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05A905 LÅN-FNR: N-546-2007 JBR.OMR: 7
GRÖDA: Höstvete
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276
SIDA 6
FÖRSÖKSVÄRD: Carl-Anders Carlsson
ADRESS: Hovgård, Söndrum, Halmstad

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT:	Harnesk					
SÅTT DEN:	2007-10-07	KG/HA:				
FÖRFRUKT:	Höstvete					
JORDART:	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM		

MATIN.GM2:F1 ***	A<>I
MATIN.GM2:F1 **	A<>H A<>K H<>I
MATIN.GM2:F1 *	H<>K I<>K
VIOTR.GM2:F1 **	A<>C A<>K
WEADR.GM2:F1 *	A<>I A<>J E<>K I<>K J<>K
WEADT.GM2:F1 ***	A<>C A<>E A<>I A<>J A<>K
WEADT.GM2:F1 **	A<>H E<>H H<>I H<>J J<>K
WEADT.GM2:F1 *	E<>K I<>K