



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B015 LÅN-FNR: R-531-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 1

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Hallerfors

ADRESS: Forshall, Grästorp

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

NPK 20-4-8

2009-08-20

250

50 10 20

NPK 22-6-6

2010-04-13

200

43 12 12

NS 27-4 (Axan)

2010-04-16

200

54

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-20 FRÖN/KVM: 55

FÖRFRUKT: Höstvetete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-13

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2009-08-15

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2.0 l Focus Ultra

2009-09-10

2009-08-21

-

2009-09-07

DC 10

2009-09-17

DC 13

2010-04-28

DC 51-52

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-03

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Snärj-måra		Snärj-måra		Stat: Frekv % av block	Snärj-måra			
	st/m2 04-12	Rel tal	fältv g/m2 04-12	Rel tal		MATIN g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 04-12	Rel tal	fältv g/m2 04-12	Rel tal		GALAP g/m2 geom.	Rel tal		
A. Obehandlat [Svensk Raps]	0.5	100	0.2	100	25	0.6	100	5.5	100	2.3	100	50	4.4	100		
B. 2.0 l Nimbus 1) [SJV]	0.0	0	0.0	0	0			3.0	55	0.4	16	75	0.4	9		
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0				
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0.5	9	0.1	2	25	0.2	5		
E. 0.25 l 0808 1) + 1.0 l Matrigon 4) [NA]	0.5	100	0.1	67	25	0.4	67	1.5	27	0.3	11	50	0.4	9		
F. 0.33 l 0808 1) [NA]	0.0	0	0.0	0	0			1.0	18	0.2	7	25	0.6	14		
G. 1.25 l Butisan Top 2) + (0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil) 5) [Dow]	0.5	100	0.1	33	25	0.2	33	1.0	18	0.1	4	50	0.2	5		
H. 2.0 l Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	0.5	100	0.1	33	25	0.2	33	0.5	9	0.1	4	25	0.4	9		
I. 1.0 l Fox 3) + 1.0 l Matrigon 4) [Svensk Raps / SJV]	0.5	100	0.1	33	25	0.2	33	0.0	0	0.0	0	0				
J. (1.0 l Fox + 0.5 l Matrigon) 3) [Machtshim]	0.0	0	0.0	0	0			1.0	18	0.2	7	50	0.3	6		
K. 0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil 5) [Dow]	0.5	100	0.1	67	25	0.4	67	6.0	109	1.3	56	50	1.6	37		
1) Senast 3 dygn efter sådd.																
2) Vid grödans hjärtbladsstadium.																
3) Grödans DC 13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).																
4) På våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.																
5) Grödans DC 30-40 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.																
STDEV%																
PROB F1																
0																
76.3																
.0652																

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

30 m avbrott mellan ruta 8 och 9 i block III.

Ogräsräkningen utförd innan kvävet verkade på våren.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av veronika, förgätmigej, blåklint, lomme och plister.

OBS! Baldersbrå och snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B015 LÅN-FNR: R-531-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 2
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Hallerfors

ADRESS: Forshall, Grästorp

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 20-4-8	2009-08-20	250	50	10	20
NPK 22-6-6	2010-04-13	200	43	12	12
NS 27-4 (Axan)	2010-04-16	200	54		

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-20 FRÖN/KVM: 55

FÖRFRUKT: Höstvetete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-13

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2009-08-15

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
2.0 l Focus Ultra	2009-09-10	2009-08-21	-
		2009-09-07	DC 10
		2009-09-17	DC 13
		2010-04-28	DC 51-52

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-03

F Ö R S Ö K S L E D:	Viol		Viol		Stat:	Viol		Vätarv		Stat:	Vätarv				
	st/m2	Rel	fältv	Rel	% av	VIOSS	Rel	fältv	Rel	% av	STEME	Rel			
	04-12	tal	g/m2	tal	block	geom.		04-12		block	geom.				
A. Obehandlat [Svensk Raps]	70.0	100	6.8	100	100	6.1	100	18.5	100	100	12.2	100			
B. 2.0 l Nimbus 1) [SJV]	43.0	61	4.7	70	100	3.8	61	0.0	0	0					
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	24.0	34	2.3	33	100	2.2	36	0.0	0	0					
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]	67.0	96	6.1	90	100	5.8	95	0.1	0	25	0.2	2			
E. 0.25 l 0808 1) + 1.0 l Matrigon 4) [NA]	49.5	71	5.7	84	100	5.3	86	0.0	0	0					
F. 0.33 l 0808 1) [NA]	103.0	147	12.9	190	100	10.5	172	0.0	0	0					
G. 1.25 l Butisan Top 2) + (0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil) 5) [Dow]	61.0	87	6.2	92	100	5.6	91	3.6	19	100	2.0	16			
H. 2.0 l Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	80.5	115	9.8	144	100	9.1	149	1.2	6	100	0.8	7			
I. 1.0 l Fox 3) + 1.0 l Matrigon 4) [Svensk Raps / SJV]	0.0	0	0.0	0	0			20.0	108	100	19.3	158			
J. (1.0 l Fox + 0.5 l Matrigon) 3) [Machteshim]	0.0	0	0.0	0	0			16.2	87	100	15.8	130			
K. 0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil 5) [Dow]	64.0	91	7.0	103	100	6.5	106	18.5	100	100	11.0	90			
1) Senast 3 dygn efter sådd.															
2) Vid grödans hjärtbladsstadium.															
3) Grödans DC 13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).															
4) På våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.															
5) Grödans DC 30-40 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.															
STDEV%						54.4					96.6				
PROB F1						.0204					.0003				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

30 m avbrott mellan ruta 8 och 9 i block III.

Ogräsräkningen utförd innan kvävet verkade på våren.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av veronika, förgätmigej, blåklint, lomme och plister.

OBS! Baldersbrå och snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B015

LÅN-FNR: R-531-2009

JBR.OMR: 15a

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Hallerfors

ADRESS: Forshall, Grästorp

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-20 FRÖN/KVM: 55

FÖRFRUKT: Höstvetete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-13

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2009-08-15

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING

NPK 20-4-8

NPK 22-6-6

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2009-08-20

2010-04-13

2010-04-16

MÄNGD KG/HA

250

200

200

N P K

50 10 20

43 12 12

54

VÄXTSKYDD

2.0 1 Focus Ultra

DATUM

2009-09-10

BEH ENL PLAN

2009-08-21

2009-09-07

2009-09-17

2010-04-28

GRÖDANS UTV.STADIUM

-

DC 10

DC 13

DC 51-52

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-03

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Svensk Raps]

B. 2.0 1 Nimbus 1) [SJV]

C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]

D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]

E. 0.25 1 0808 1) + 1.0 1 Matrigon 4) [NA]

F. 0.33 1 0808 1) [NA]

G. 1.25 1 Butisan Top 2) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 Dasoil) 5) [Dow]

H. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]

I. 1.0 1 Fox 3) + 1.0 1 Matrigon 4) [Svensk Raps / SJV]

J. (1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon) 3) [Machteshim]

K. 0.3 1 Galera + 0.3 1 Dasoil 5) [Dow]

1) Senast 3 dygn efter sådd.

2) Vid grödans hjärtbladsstadium.

3) Grödans DC 13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).

4) På våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.

5) Grödans DC 30-40 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.

STDEV%

PROB F1

Övr 1-år örtogräs st/m2 04-12	Rel tal	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2 04-12	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel tal	Samt 1år örtogräs fältv g/m2 04-12	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt 1år örtogräs WEADT g/m2 geom.	Rel tal				
3.5	100	0.5	100	75	0.5	100	28.2	100	100	25.6	100				
0.5	14	0.4	80	25	1.6	305	5.5	19	100	5.2	20				
0.0	0	0.0	0	0			2.3	8	100	2.2	9				
0.0	0	0.0	0	0			6.2	22	100	5.9	23				
2.0	57	0.5	100	75	0.4	76	6.6	23	100	6.4	25				
0.5	14	0.1	20	25	0.4	76	13.1	47	100	10.7	42				
0.0	0	0.0	0	0			9.9	35	100	8.1	32				
0.5	14	0.2	30	25	0.6	114	11.3	40	100	10.7	42				
0.5	14	1.1	220	25	4.4	839	21.1	75	100	20.7	81				
0.0	0	0.0	0	0			16.3	58	100	16.0	62				
5.5	157	0.4	70	100	0.3	54	27.2	96	100	21.3	83				
					92.2					48.4					
					.3056					.0001					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

30 m avbrott mellan ruta 8 och 9 i block III.

Ogräsräkningen utförd innan kvävet verkade på våren.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av veronika, förgätmigej, blåklint, lomme och plister.

OBS! Baldersbrå och snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B015

LÅN-FNR: R-531-2009

JBR.OMR: 15a

SIDA 4
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Hallerfors

ADRESS: Forshall, Grästorp

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-20 FRÖN/KVM: 55

FÖRFRUKT: Höstvetete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-13

GÖDSLING

NPK 20-4-8

NPK 22-6-6

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2009-08-20

2010-04-13

2010-04-16

MÄNGD KG/HA

250

200

200

N P K

50 10 20

43 12 12

54

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

GALAP0GM2:F1 ** A<>G A<>J
GALAP0GM2:F1 * A<>B A<>D A<>E A<>H G<>K
STEME0GM2:F1 *** D<>I D<>J H<>I H<>J
STEME0GM2:F1 ** A<>D A<>H D<>K G<>I G<>J H<>K
STEME0GM2:F1 * A<>G D<>G G<>K
VIOSS0GM2:F1 *** C<>F
VIOSS0GM2:F1 ** C<>H
VIOSS0GM2:F1 * A<>C B<>F B<>H C<>D C<>E C<>G C<>K
WEADROGM2:F1 * I<>K
WEADT0GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E B<>I B<>K C<>F C<>G C<>H C<>I C<>J C<>K D<>I D<>K
WEADT0GM2:F1 ** A<>G B<>J C<>D C<>E D<>J E<>I E<>K G<>I G<>K
WEADT0GM2:F1 * A<>F A<>H B<>C B<>F B<>H E<>J



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B015 LÅN-FNR: R-531-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 2

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Hallerfors

ADRESS: Forshall, Grästorp

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 20-4-8	2009-08-20	250	50	10	20
NPK 22-6-6	2010-04-13	200	43	12	12
NS 27-4 (Axan)	2010-04-16	200	54		

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-20 FRÖN/KVM: 55

FÖRFRUKT: Höstvete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-13

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2009-08-15

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
2.0 1 Focus Ultra	2009-09-10	2009-08-21	-
		2009-09-07	DC 10
		2009-09-17	DC 13
		2010-04-28	DC 51-52

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-04

F Ö R S Ö K S L E D:	Våtarv		Stat:	Våtarv		Övr 1-år		Övr 1-år		Stat:	Övr 1-år					
	fältv	Rel	Frekv	STEME	Rel	Örtogräs	Rel	fältv	Rel	Frekv	Örtogräs	Rel				
	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	% av	WEADR	tal				
	06-01		block	geom.		06-01		06-01		block	geom.					
A. Obehandlat [Svensk Raps]	110.9	100	100	110.8	100	15.0	100	29.9	100	100	23.9	100				
B. 2.0 1 Nimbus 1) [SJV]	1.4	1	25	5.4	5	3.0	20	6.1	20	75	1.2	5				
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0			5.0	33	0.5	2	75	0.5	2				
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	15.7	14	75	4.6	4	1.5	10	3.7	12	50	1.7	7				
E. 0.25 1 0808 1) + 1.0 1 Matrigon 4) [NA]	0.0	0	0			8.5	57	8.6	29	100	8.4	35				
F. 0.33 1 0808 1) [NA]	0.0	0	0			10.0	67	38.0	127	100	26.3	110				
G. 1.25 1 Butisan Top 2) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 Dasoil) 5) [Dow]	7.6	7	100	5.6	5	1.0	7	1.2	4	50	2.2	9				
H. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	3.7	3	100	1.7	2	8.0	53	29.7	99	100	19.7	82				
I. 1.0 1 Fox 3) + 1.0 1 Matrigon 4) [Svensk Raps / SJV]	91.6	83	100	88.3	80	0.5	3	0.1	0	25	0.2	1				
J. (1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon) 3) [Machteshim]	73.2	66	100	24.5	22	1.5	10	0.5	2	75	0.5	2				
K. 0.3 1 Galera + 0.3 1 Dasoil 5) [Dow]	136.4	123	100	118.8	107	6.0	40	4.9	16	100	2.7	11				
1) Senast 3 dygn efter sådd.																
2) Vid grödans hjärtbladsstadium.																
3) Grödans DC 13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).																
4) På våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.																
5) Grödans DC 30-40 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.																
STDEV%				142							134.6					
PROB F1				.0018							.0014					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
30 m avbrott mellan ruta 8 och 9 i block III.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B015

LÅN-FNR: R-531-2009

JBR.OMR: 15a

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

SIDA 4

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Hallerfors

ADRESS: Forshall, Grästorp

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-20 FRÖN/KVM: 55

FÖRFRUKT: Höstvetete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-13

GÖDSLING

NPK 20-4-8

NPK 22-6-6

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2009-08-20

2010-04-13

2010-04-16

MÄNGD KG/HA

250

200

200

N P K

50 10 20

43 12 12

54

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

GALAP.GM2:F1 * A<>G
STEME.GM2:F1 *** A<>H H<>I H<>K
STEME.GM2:F1 ** A<>D A<>G D<>K G<>K
STEME.GM2:F1 * D<>I G<>I H<>J
VIOSS.GM2:F1 *** A<>I A<>J B<>I B<>J C<>I C<>J D<>I D<>J E<>I E<>J F<>I F<>J G<>I G<>J
VIOSS.GM2:F1 *** H<>I H<>J I<>K J<>K
WEADR.GM2:F1 *** A<>C A<>J C<>F F<>J
WEADR.GM2:F1 ** A<>B A<>I B<>F C<>H F<>I H<>I H<>J
WEADR.GM2:F1 * A<>D A<>K B<>H C<>E D<>F D<>H E<>I E<>J F<>G F<>K H<>K
WEADT.GM2:F1 *** A<>C A<>J F<>J J<>K
WEADT.GM2:F1 ** A<>B A<>I C<>F C<>K E<>J G<>J H<>J
WEADT.GM2:F1 * A<>D B<>F B<>K C<>E C<>G C<>H I<>K



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B015 LÅN-FNR: R-531-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 1

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Hallerfors

ADRESS: Forshall, Grästorp

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 20-4-8	2009-08-20	250	50	10	20
NPK 22-6-6	2010-04-13	200	43	12	12
NS 27-4 (Axan)	2010-04-16	200	54		

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-20 FRÖN/KVM: 55

FÖRFRUKT: Höstvete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-13

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2009-08-15

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
2.0 l Focus Ultra	2009-09-10	2009-08-21	-
		2009-09-07	DC 10
		2009-09-17	DC 13
		2010-04-28	DC 51-52

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-04

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv sk/ha 08-14	Rel tal	Rå fett skörd kg/ha 08-14	Rel tal	Rå fett %	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Be stånd vår 0-100 04-13	Beh. skada vår 0-100 05-07	Stjälk styrka vid skörd 08-14	Ogräs före komst grad 08-14		
A. Obehandlat [Svensk Raps]	3500	100	1587	100	50	3.1	17.1	85	0	90	16		
B. 2.0 l Nimbus 1) [SJV]	3810	109	1719	108	50	1.3	17.1	83	0	90	18		
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	3780	108	1704	107	50	1.0	16.9	80	0	90	18		
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]	3850	110	1740	110	50	1.1	17.0	84	0	90	16		
E. 0.25 l 0808 1) + 1.0 l Matrigon 4) [NA]	3830	109	1740	110	50	1.3	17.1	85	0	90	14		
F. 0.33 l 0808 1) [NA]	3660	105	1665	105	50	1.1	16.8	81	0	90	15		
G. 1.25 l Butisan Top 2) + (0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil) 5) [Dow]	3790	108	1719	108	50	1.1	17.4	85	0	90	15		
H. 2.0 l Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	3680	105	1683	106	50	1.1	16.6	84	0	90	18		
I. 1.0 l Fox 3) + 1.0 l Matrigon 4) [Svensk Raps / SJV]	3900	111	1754	110	49	1.9	16.9	85	0	90	13		
J. (1.0 l Fox + 0.5 l Matrigon) 3) [Machteshim]	3760	107	1690	106	49	2.1	17.2	83	0	90	16		
K. 0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil 5) [Dow]	3630	104	1630	103	49	1.6	17.1	84	0	90	15		
1) Senast 3 dygn efter sådd.													
2) Vid grödans hjärtbladsstadium.													
3) Grödans DC 13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).													
4) På våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.													
5) Grödans DC 30-40 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.													
-X-	3740		1694										
CV%	3		3.2										
OBS	44		44										
PROB F1	.0010		.0036										
LSD F1	160		78										

ANM: 30 m avbrott mellan ruta 8 och 9 i block III.

Missfärgningar 2009-09-07: Små i led E, större i led B, C och F.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

SIDA 2

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B015

LÅN-FNR: R-531-2009

JBR.OMR: 15a

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Erik Hallerfors

ADRESS: Forshall, Grästorp

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NPK 20-4-8	2009-08-20	250	50	10	20
	NPK 22-6-6	2010-04-13	200	43	12	12
	NS 27-4 (Axan)	2010-04-16	200	54		

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-20 FRÖN/KVM: 55

FÖRFRUKT: Höstvete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-13

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M09:F1 ***	A<>B A<>D A<>E A<>I
Y.M09:F1 **	A<>C A<>G A<>J D<>K F<>I H<>I I<>K
Y.M09:F1 *	A<>H B<>K D<>F D<>H E<>F E<>K
Y-FAT:F1 ***	A<>D A<>E A<>I
Y-FAT:F1 **	A<>B A<>C A<>G D<>K E<>K I<>K
Y-FAT:F1 *	A<>H A<>J B<>K F<>I G<>K

Jordanalys:

ADB-nr: 05B015
Serienr: OS5-8010-10
Län-fnr: R-531-2009

Jordart: nmh ML

pH: 6.3

Mullhalt %: 2.9

Lerhalt %: 32

Finler %: 24

Sand+grovmå %: 9