



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 1

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SORT: Catalina
SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45
FÖRFRUKT: Vall
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
Kalimagnesia	2011-04-15	25		6	
NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
4 kg Mesuroi	2010-09-03	2010-08-23	DC 2
0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21	2010-09-01	DC 10 (3 cm)
0.7 Amistar	2011-05-19	2010-09-10	DC 12 (4 cm)
		2010-09-22	DC 14 (7 cm)
		2011-04-14	DC 19 (11 cm)

R E S U L T A T: UTSKRIFTS DATUM: 2011-10-13

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Lomme			Lomme			Stat: Frekv % av block	Lomme	
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		MATIN g/m2	Rel tal		Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	Rel tal	fältv g/m2		CAPBP g/m2	Rel tal
	10-26		10-26			geom.		10-26		10-26			10-26		geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	0.5	100	2.8	100	50	4.9	100	2.0	100	6.8	100	75	6.9	100		
B. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0				
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0				
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0				
E. 1.25 1 Butisan Top 3) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N) 5) [Dow]	0.8	150	1.3	45	25	5.0	102	2.0	100	5.3	78	75	5.8	84		
F. 1.0 1 Fox 4) [Makhteshim]	0.3	50	0.8	27	25	3.0	61	0.3	13	0.5	7	25	2.0	29		
G. 1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon 4) [Makhteshim]	0.0	0	0.0	0	0			2.0	100	6.3	93	75	6.6	96		
1) Senast 3 dygn efter sådd.																
2) Vid grödans hjärtbladsstadium.																
3) Grödans DC 10-12.																
4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).																
5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.																
STDEV%						69.4							83.2			
PROB F1						.8494							.6328			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Baldersbrå, lomme, rödplister, trampört och spillsäd får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 2

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SORT: Catalina
SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45
FÖRFRUKT: Vall
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
Kalimagnesia	2011-04-15	25		6	
NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
4 kg Mesurol	2010-09-03	2010-08-23	DC 2
0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21	2010-09-01	DC 10 (3 cm)
0.7 Amistar	2011-05-19	2010-09-10	DC 12 (4 cm)
		2010-09-22	DC 14 (7 cm)
			DC 19 (11 cm)

RESULTAT: UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13 2011-04-14

F Ö R S Ö K S L E D :	Röd-plister		Röd-plister		Stat: Frekv % av block	Röd-plister		Trampört		Trampört		Stat: Frekv % av block	Trampört	
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		LAMPU g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		POLAV g/m2	Rel tal
	10-26		10-26			geom.		10-26		10-26			geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	4.0	100	23.5	100	75	28.4	100	1.8	100	5.5	100	100	4.1	100
B. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	0.0	0	0.0	0	0			0.3	14	0.8	14	25	3.0	73
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			1.0	57	3.8	68	50	7.5	183
E. 1.25 1 Butisan Top 3) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N) 5) [Dow]	0.0	0	0.0	0	0			1.8	100	2.8	50	50	4.2	104
F. 1.0 1 Fox 4) [Makhteshim]	0.8	19	1.8	7	50	3.2	11	0.3	14	0.5	9	25	2.0	49
G. 1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon 4) [Makhteshim]	0.5	13	1.0	4	50	2.0	7	0.5	29	1.8	32	25	7.0	171
1) Senast 3 dygn efter sådd. 2) Vid grödans hjärtbladsstadium. 3) Grödans DC 10-12. 4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad). 5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.														
STDEV%						51.8							91.8	
PROB F1						.0089							.8484	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Baldersbrå, lomme, rödplister, trampört och spillsäd får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 3

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SORT: Catalina
SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45
FÖRFRUKT: Vall
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
Kalimagnesia	2011-04-15	25		6	
NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
4 kg Mesurol	2010-09-03	2010-08-23	DC 2
0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21	2010-09-01	DC 10 (3 cm)
0.7 Amistar	2011-05-19	2010-09-10	DC 12 (4 cm)
		2010-09-22	DC 14 (7 cm)
		2011-04-14	DC 19 (11 cm)

RESULTAT: UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

F Ö R S Ö K S L E D:	Veronika		Veronika		Stat:	Veronika		Viol		Viol		Stat:	Viol	
	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	VERSS	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel	% av	VIOSS	Rel
	10-26	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	10-26	tal	g/m2	tal	block	g/m2	tal
	10-26		10-26		block	geom.		10-26		10-26			geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	11.8	100	27.3	100	100	15.4	100	29.8	100	35.8	100	100	33.4	100
B. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	0.0	0	0.0	0	0			42.5	143	12.8	36	100	11.0	33
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			28.8	97	15.3	43	100	13.2	39
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			37.5	126	21.0	59	100	17.9	54
E. 1.25 1 Butisan Top 3) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N) 5) [Dow]	0.0	0	0.0	0	0			47.8	161	31.3	87	100	26.6	80
F. 1.0 1 Fox 4) [Makhteshim]	0.8	6	1.0	4	50	2.0	13	4.0	13	3.5	10	100	3.5	10
G. 1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon 4) [Makhteshim]	0.5	4	0.5	2	50	1.0	6	2.0	7	2.0	6	75	2.3	7
1) Senast 3 dygn efter sådd.														
2) Vid grödans hjärtbladsstadium.														
3) Grödans DC 10-12.														
4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).														
5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.														
STDEV%						105.6							60.0	
PROB F1						.0576							.0001	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Baldersbrå, lomme, rödplister, trampört och spillsäd får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 4

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SORT: Catalina

SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45

FÖRFRUKT: Vall

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
Kalimagnesia	2011-04-15	25		6	
NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
4 kg Mesurol	2010-09-03	2010-08-23	DC 2
0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21	2010-09-01	DC 10 (3 cm)
0.7 Amistar	2011-05-19	2010-09-10	DC 12 (4 cm)
		2010-09-22	DC 14 (7 cm)
		2011-04-14	DC 19 (11 cm)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

F Ö R S Ö K S L E D:	Våtarv		Våtarv		Stat: Frekv % av block	Våtarv		Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs	
	st/m2 10-26	Rel tal	fältv g/m2 10-26	Rel tal		STEME g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 10-26	Rel tal	fältv g/m2 10-26	Rel tal		WEADR g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	14.0	100	84.3	100	100	73.5	100	5.0	100	12.8	100	100	10.0	100
B. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	1.3	9	1.5	2	75	1.8	2	5.3	105	6.0	47	100	4.2	42
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0.5	10	0.5	4	50	1.0	10
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	0.3	2	0.3	0	25	1.0	1	1.5	30	2.8	22	100	2.7	27
E. 1.25 1 Butisan Top 3) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N) 5) [Dow]	2.0	14	3.0	4	75	3.8	5	4.3	85	9.5	75	100	5.7	57
F. 1.0 1 Fox 4) [Makhteshim]	8.0	57	56.8	67	100	54.0	73	1.8	35	6.0	47	50	11.6	116
G. 1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon 4) [Makhteshim]	7.0	50	41.5	49	100	37.0	50	3.3	65	5.8	45	100	4.0	40
1) Senast 3 dygn efter sådd. 2) Vid grödans hjärtbladsstadium. 3) Grödans DC 10-12. 4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad). 5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.														
STDEV%						50.6							88.2	
PROB F1						.0001							.0957	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Baldersbrå, lomme, rödplister, trampört och spillsäd får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 5

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SORT: Catalina
SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45
FÖRFRUKT: Vall
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
Kalimagnesia	2011-04-15	25		6	
NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
4 kg Mesurol	2010-09-03	2010-08-23	DC 2
0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21	2010-09-01	DC 10 (3 cm)
0.7 Amistar	2011-05-19	2010-09-10	DC 12 (4 cm)
		2010-09-22	DC 14 (7 cm)
		2011-04-14	DC 19 (11 cm)

R E S U L T A T: UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

F Ö R S Ö K S L E D:	Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs		Spill-säd	*	Stat: Frekv % av block	Spill-säd	*		
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		WEADT g/m2	Rel tal				st/m2	fältv g/m2		
	10-26		10-26			geom.		10-26	10-26		10-26	10-26		
A. Obehandlat [Regioner]	68.8	100	198.5	100	100	190.7	100	0.0	0.0	0	15.2	100		
B. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	49.3	72	21.0	11	100	19.3	10	0.0	0.0	0	15.2	100		
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	29.3	43	15.8	8	100	13.9	7	0.3	1.8	25	11.6	77		
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	40.3	59	27.8	14	100	24.5	13	0.0	0.0	0	15.2	100		
E. 1.25 1 Butisan Top 3) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N) 5) [Dow]	58.5	85	53.0	27	100	48.4	25	0.0	0.0	0	15.2	100		
F. 1.0 1 Fox 4) [Makhteshim]	16.0	23	70.8	36	100	69.0	36	0.0	0.0	0	15.2	100		
G. 1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon 4) [Makhteshim]	15.8	23	58.8	30	100	56.9	30	0.0	0.0	0	15.2	100		
1) Senast 3 dygn efter sådd. 2) Vid grödans hjärtbladsstadium. 3) Grödans DC 10-12. 4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad). 5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.														
STDEV%						46.7								
PROB F1						.0001								

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Baldersbrå, lomme, rödplister, trampört och spillsäd får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 6
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SORT: Catalina
SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45
FÖRFRUKT: Vall
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
Kalimagnesia	2011-04-15	25		6	
NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
4 kg Mesuroi	2010-09-03	2010-08-23	DC 2
0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21	2010-09-01	DC 10 (3 cm)
0.7 Amistar	2011-05-19	2010-09-10	DC 12 (4 cm)
		2010-09-22	DC 14 (7 cm)
		2011-04-14	DC 19 (11 cm)

RESULTAT: UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

F Ö R S Ö K S L E D :	Vitgröe*		fältv g/m2 10-26	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Vitgröe*		Stat: Frekv % av block							
	st/m2 10-26	Rel tal				XPOAAN g/m2 geom.	Rel tal								
A. Obehandlat [Regioner]	15.8	100	11.0	100	100	8.6	100	100							
B. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	0.0	0	0.0	0	0			0							
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0							
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0							
E. 1.25 1 Butisan Top 3) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N) 5) [Dow]	0.0	0	0.0	0	0			0							
F. 1.0 1 Fox 4) [Makhteshim]	18.0	114	4.0	36	100	3.9	45	100							
G. 1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon 4) [Makhteshim]	9.0	57	2.8	25	100	2.1	25	100							
1) Senast 3 dygn efter sådd.															
2) Vid grödans hjärtbladsstadium.															
3) Grödans DC 10-12.															
4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).															
5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.															
STDEV%						73									
PROB F1						.0671									

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
OBS! Baldersbrå, lomme, rödplister, trampört och spillsäd får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 7
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollerups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollerup, Tomelilla

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
	Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
	NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
	Kalimagnesia	2011-04-15	25			6
	NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		
	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH	ENL	PLAN
						GRÖDANS UTV.STADIUM

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30

LAMPU0GM2:F1 **	A<>F A<>G
STEME0GM2:F1 ***	A<>B A<>D A<>E B<>F B<>G D<>F D<>G E<>F E<>G
STEME0GM2:F1 *	D<>E
VERSS0GM2:F1 *	A<>G
VIOSS0GM2:F1 ***	A<>F A<>G D<>F D<>G E<>F E<>G
VIOSS0GM2:F1 **	B<>G C<>F C<>G
VIOSS0GM2:F1 *	A<>B A<>C B<>E B<>F
WEADROGM2:F1 **	A<>C
WEADROGM2:F1 *	C<>E C<>F
WEADT0GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E B<>F C<>F C<>G
WEADT0GM2:F1 **	A<>F A<>G B<>G C<>E D<>F
WEADT0GM2:F1 *	B<>E D<>G
XPOAAN0GM2:F1 *	A<>G



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 1

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SORT: Catalina
SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45
FÖRFRUKT: Vall
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
Kalimagnesia	2011-04-15	25		6	
NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
4 kg Mesurol	2010-09-03	2010-08-23	DC 2
0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21	2010-09-01	DC 10 (3 cm)
0.7 Amistar	2011-05-19	2010-09-10	DC 12 (4 cm)
		2010-09-22	DC 14 (7 cm)
		2011-04-14	DC 19 (11 cm)

R E S U L T A T: UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Fliknäva		Fliknäva		Stat: Frekv % av block	Fliknäva	
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		MATIN g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		GERDI g/m2	Rel tal
	06-10		06-10			geom.		06-10		06-10			geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	0.3	100	0.3	100	25	1.0	100	2.5	100	50.3	100	100	18.0	100
B. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	0.3	100	0.3	100	25	1.0	100	0.0	0	0.0	0	0		
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0.5	20	1.3	2	50	2.0	11
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			1.3	50	1.8	3	50	3.5	19
E. 1.25 1 Butisan Top 3) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N) 5) [Dow]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
F. 1.0 1 Fox 4) [Makhteshim]	0.5	200	26.3	10500	50	10.2	1020	0.3	10	0.3	0	25	1.0	6
G. 1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon 4) [Makhteshim]	0.3	100	0.3	100	25	1.0	100	0.8	30	2.5	5	50	4.9	27
1) Senast 3 dygn efter sådd.														
2) Vid grödans hjärtbladsstadium.														
3) Grödans DC 10-12.														
4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).														
5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.														
STDEV%						328.4							140.2	
PROB F1						.8886							.3379	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda och svinmålla.

OBS! Baldersbrå, fliknäva, lomme, rödplister, veronika, korn och maskros får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 2

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SORT: Catalina
SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45
FÖRFRUKT: Vall
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
Kalimagnesia	2011-04-15	25		6	
NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
4 kg Mesurol	2010-09-03	2010-08-23	DC 2
0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21	2010-09-01	DC 10 (3 cm)
0.7 Amistar	2011-05-19	2010-09-10	DC 12 (4 cm)
		2010-09-22	DC 14 (7 cm)
			DC 19 (11 cm)

RESULTAT: UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13 2011-04-14

F Ö R S Ö K S L E D:	Lomme		Lomme		Stat: Frekv % av block	Lomme		Röd- plister		Röd- plister		Stat: Frekv % av block	Röd- plister	
	st/m2 06-10	Rel tal	fältv g/m2 06-10	Rel tal		CAPBP g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-10	Rel tal	fältv g/m2 06-10	Rel tal		LAMP g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	2.0	100	47.8	100	50	89.8	100	2.0	100	19.0	100	75	19.6	100
B. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	0.8	38	5.0	10	50	4.4	5	0.0	0	0.0	0	0		
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	0.3	13	0.5	1	25	2.0	2	0.0	0	0.0	0	0		
E. 1.25 1 Butisan Top 3) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N) 5) [Dow]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
F. 1.0 1 Fox 4) [Makhteshim]	1.8	88	19.5	41	75	18.0	20	0.0	0	0.0	0	0		
G. 1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon 4) [Makhteshim]	0.8	38	18.3	38	50	20.0	22	0.0	0	0.0	0	0		
1) Senast 3 dygn efter sådd. 2) Vid grödans hjärtbladsstadium. 3) Grödans DC 10-12. 4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad). 5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.														
STDEV%						140.8							84.7	
PROB F1						.2777								

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda och svinmålla.

OBS! Baldersbrå, fliknäva, lomme, rödplister, veronika, korn och maskros får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 3

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SORT: Catalina
SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45
FÖRFRUKT: Vall
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
Kalimagnesia	2011-04-15	25		6	
NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
4 kg Mesurol	2010-09-03	2010-08-23	DC 2
0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21	2010-09-01	DC 10 (3 cm)
0.7 Amistar	2011-05-19	2010-09-10	DC 12 (4 cm)
		2010-09-22	DC 14 (7 cm)
		2011-04-14	DC 19 (11 cm)

RESULTAT: UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

FÖRSÖKSLED:	Trampört		Trampört		Stat: Frekv % av block	Trampört		Veronika		Veronika		Stat: Frekv % av block	Veronika	
	st/m2 06-10	Rel tal	fältv g/m2 06-10	Rel tal		POLAV g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-10	Rel tal	fältv g/m2 06-10	Rel tal		VERSS g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	19.5	100	5.5	100	100	2.8	100	3.5	100	7.8	100	75	10.3	100
B. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	28.5	146	3.3	59	100	3.0	106	0.8	21	0.8	10	75	1.0	10
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	16.3	83	1.5	27	100	1.4	50	0.5	14	0.5	6	50	1.0	10
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	74.3	381	9.8	177	100	7.6	267	0.0	0	0.0	0	0		
E. 1.25 1 Butisan Top 3) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N) 5) [Dow]	23.0	118	2.5	45	75	2.7	96	0.3	7	0.3	3	25	1.0	10
F. 1.0 1 Fox 4) [Makhteshim]	25.0	128	3.3	59	100	2.5	90	0.0	0	0.0	0	0		
G. 1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon 4) [Makhteshim]	15.8	81	2.3	41	100	1.8	63	0.0	0	0.0	0	0		
1) Senast 3 dygn efter sådd. 2) Vid grödans hjärtbladsstadium. 3) Grödans DC 10-12. 4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad). 5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.														
STDEV%						84.6							3.5	
PROB F1						.2127							.0001	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda och svinmålla.

OBS! Baldersbrå, fliknäva, lomme, rödplister, veronika, korn och maskros får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 4

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SORT: Catalina SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45 FÖRFRUKT: Vall SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30 PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13 JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND PH-VÄRDE: 6.3	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K									
	NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36											
	Kalksalpeter	2011-03-23	200	31											
	NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50											
	Kalimagnesia	2011-04-15	25		6										
	NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54											
	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM											
	4 kg Mesurol	2010-09-03	2010-08-23	DC 2											
	0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21	2010-09-01	DC 10 (3 cm)											
	0.7 Amistar	2011-05-19	2010-09-10	DC 12 (4 cm)											
		2010-09-22	DC 14 (7 cm)												
		2011-04-14	DC 19 (11 cm)												
R E S U L T A T:															
	Viol		Viol		Stat: Frekv	Viol		Våtarv		Våtarv		Stat: Frekv	Våtarv		
	st/m2	Rel	fältv	Rel	% av	VIOS	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel	% av	STEME	Rel	
F Ö R S Ö K S L E D:	06-10	tal	g/m2	tal	block	geom.	tal	06-10	tal	g/m2	tal	block	geom.	tal	
A. Obehandlat [Regioner]	21.0	100	142.3	100	100	131.8	100	10.8	100	172.0	100	100	135.9	100	
B. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	16.3	77	135.8	95	100	100.9	77	0.8	7	8.3	5	50	5.7	4	
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	7.8	37	20.5	14	100	11.5	9	2.8	26	18.0	10	25	72.0	53	
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	11.0	52	68.3	48	100	54.9	42	0.3	2	0.3	0	25	1.0	1	
E. 1.25 1 Butisan Top 3) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N) 5) [Dow]	11.5	55	78.8	55	100	75.2	57	1.0	9	0.8	0	50	1.4	1	
F. 1.0 1 Fox 4) [Makhteshim]	0.0	0	0.0	0	0			5.5	51	160.8	93	100	117.7	87	
G. 1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon 4) [Makhteshim]	0.0	0	0.0	0	0			9.5	88	331.5	193	100	249.5	184	
1) Senast 3 dygn efter sådd.															
2) Vid grödans hjärtbladsstadium.															
3) Grödans DC 10-12.															
4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).															
5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.															
STDEV%						94.7							109.1		
PROB F1						.0194							.0008		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda och svinmålla.

OBS! Baldersbrå, fliknäva, lomme, rödplister, veronika, korn och maskros får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 5

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SORT: Catalina
SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45
FÖRFRUKT: Vall
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
Kalimagnesia	2011-04-15	25		6	
NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
4 kg Mesurol	2010-09-03	2010-08-23	DC 2
0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21	2010-09-01	DC 10 (3 cm)
0.7 Amistar	2011-05-19	2010-09-10	DC 12 (4 cm)
		2010-09-22	DC 14 (7 cm)
		2011-04-14	DC 19 (11 cm)

R E S U L T A T: UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

F Ö R S Ö K S L E D:	Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs	
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		WEADR g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		WEADT g/m2	Rel tal
	06-10		06-10			geom.		06-10		06-10			geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	2.0	100	0.8	100	50	1.4	100	63.5	100	445.5	100	100	442.4	100
B. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	4.0	200	2.3	300	100	2.0	141	51.3	81	155.5	35	100	124.9	28
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	2.5	125	1.3	167	100	1.2	84	30.3	48	43.0	10	100	38.2	9
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	4.0	200	1.5	200	100	1.4	100	91.0	143	82.0	18	100	67.5	15
E. 1.25 1 Butisan Top 3) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N) 5) [Dow]	0.3	13	0.3	33	25	1.0	71	36.0	57	82.5	19	100	78.2	18
F. 1.0 1 Fox 4) [Makhteshim]	2.5	125	0.8	100	75	1.0	71	35.5	56	210.8	47	100	182.2	41
G. 1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon 4) [Makhteshim]	2.3	113	3.3	433	100	2.3	165	29.3	46	358.0	80	100	271.6	61
1) Senast 3 dygn efter sådd. 2) Vid grödans hjärtbladsstadium. 3) Grödans DC 10-12. 4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad). 5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.														
STDEV%						57.4							66.4	
PROB F1						.4503							.0005	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda och svinmålla.

OBS! Baldersbrå, fliknäva, lomme, rödplister, veronika, korn och maskros får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÄN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 6

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollерups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollерup, Tomelilla

SORT: Catalina
SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45
FÖRFRUKT: Vall
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
Kalimagnesia	2011-04-15	25		6	
NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
4 kg Mesurol	2010-09-03	2010-08-23	DC 2
0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21	2010-09-01	DC 10 (3 cm)
0.7 Amistar	2011-05-19	2010-09-10	DC 12 (4 cm)
		2010-09-22	DC 14 (7 cm)
		2011-04-14	DC 19 (11 cm)


RESULTAT: UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

FÖRSÖKSLED:	Korn	*	Korn	*	Stat:	Maskros*		Maskros*		Stat:				
	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv				
	06-10	tal	g/m2	tal	% av block	06-10	tal	g/m2	tal	% av block				
A. Obehandlat [Regioner]	0.3	100	4.3	100	25	0.5	100	0.8	100	25				
B. 2.0 1 Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0				
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0				
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0				
E. 1.25 1 Butisan Top 3) + (0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N) 5) [Dow]	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0				
F. 1.0 1 Fox 4) [Makhteshim]	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0				
G. 1.0 1 Fox + 0.5 1 Matrigon 4) [Makhteshim]	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0				
1) Senast 3 dygn efter sådd.														
2) Vid grödans hjärtbladsstadium.														
3) Grödans DC 10-12.														
4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).														
5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.														
STDEV%														
PROB F1														

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda och svinmålla.

OBS! Baldersbrå, fliknäva, lomme, rödplister, veronika, korn och maskros får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.





R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 8

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollerups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollerup, Tomelilla

SORT: Catalina

SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45

FÖRFRUKT: Vall

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

Kalksalpeter

NS 27-4 (Axan)

Kalimagnesia

NS 27-4 (Axan)

VÄXTSKYDD

DATUM

2010-08-20

2011-03-23

2011-04-12

2011-04-15

2011-04-18

DATUM

MÄNGD KG/HA

135

200

185

25

200

N P K

36

31

50

6

54

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

POLAV.GM2:F1 * C<>D D<>G
STEME.GM2:F1 *** A<>E D<>G E<>F E<>G
STEME.GM2:F1 ** A<>B A<>D B<>F B<>G D<>F
STEME.GM2:F1 * C<>D C<>E
VERSS.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>E
VIOSS.GM2:F1 ** A<>C B<>C
VIOSS.GM2:F1 * C<>D C<>E
WEADT.GM2:F1 *** A<>C A<>D C<>G
WEADT.GM2:F1 ** A<>E C<>F D<>G
WEADT.GM2:F1 * A<>B B<>C D<>F E<>G



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: OS5-8010-11 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B069 LÅN-FNR: LB-251-2010 JBR.OMR: 4b

SIDA 1
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Bollerups lantbruksinstitut
ADRESS: Bollerup, Tomelilla

SORT: Catalina
SÅTT DEN: 2010-08-21 KG/HA: 3.45
FÖRFRUKT: Vall
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2010-07-30
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2010-08-13
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-08-20	135	36		
Kalksalpeter	2011-03-23	200	31		
NS 27-4 (Axan)	2011-04-12	185	50		
Kalimagnesia	2011-04-15	25		6	
NS 27-4 (Axan)	2011-04-18	200	54		
VÄXTSKYDD	DATUM	BEH	ENL	PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
4 kg Mesuroi	2010-09-03			2010-08-23	DC 2
0.3 Biscaya + 2 Bor	2011-04-21			2010-09-01	DC 10 (3 cm)
0.7 Amistar	2011-05-19			2010-09-10	DC 12 (4 cm)
				2010-09-22	DC 14 (7 cm)
				2011-04-14	DC 19 (11 cm)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-04	Rel tal	Råfett skörd kg/ha 08-04	Rel tal	Råfett %	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Beh. skada höst 0-100	Be stånd höst 0-100 11-21	Be stånd vår 0-100 04-24	Beh. skada vår 0-100 04-29	Stjälk styrka vid skörd 07-19	Ogräs före komst grad 07-19	
A. Obehandlat [Regioner]	5220	100	2340	100	49.2	2.0	7.4	0	100	100	0	80	20	
B. 2.0 l Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	5410	103	2409	103	49.0	2.0	7.7	0	100	98	0	80	4	
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	5310	102	2364	101	49.0	1.9	7.2	0	100	98	0	80	1	
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]	5280	101	2338	100	48.6	1.8	7.4	0	100	93	0	80	2	
E. 1.25 l Butisan Top 3) + (0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [Dow]	5260	101	2286	98	47.8	2.0	7.3	0	100	98	0	80	2	
F. 1.0 l Fox 4) [Makhteshim]	5360	103	2368	101	48.6	1.9	7.4	0	100	98	0	80	5	
G. 1.0 l Fox + 0.5 l Matrigon 4) [Makhteshim]	5210	100	2308	99	48.7	2.2	7.2	0	100	90	0	80	5	
1) Senast 3 dygn efter sådd. 2) Vid grödans hjärtbladsstadium. 3) Grödans DC 10-12. 4) Grödans DC 12-13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad). 5) Vid grödans DC 41 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över +8°C.														
-X-	5300		2349											
CV%	5.2		5.3											
OBS	27		27											
PROB F1	.9374		.8146											
LSD F1	420		189											

ANM: Led C block I ej skördad p.g.a. stopp i tröskan.

Datum för gradering av beh.skador hösten 2010: Led C och D 09-06, led B 09-08, led E-G 10-25.

Jordanalys:

ADB-nr: 05B069
Serienr: OS5-8010-11
Län-fnr: LB-251-2010

Jordart: nmh I Sa

Mullhalt %: 2.5

Lerhalt %: 13

Sand+grovmå %: 62

pH: 6.3

P-AL (mg/100g): 8.9

K-AL (mg/100g): 11

Mg-AL (mg/100g): 6.1

K/Mg (kvot): 1.8

Ca-AL (mg/100g): 140

KI: IVA

KI: III