



RESULTBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B112 LÅN-FNR: D-002-2011

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Malmström
ADRESS: Tärby gård, Eskilstuna

GÖDSLING
NPK 28-3-5
Photrel

DATUM MÄNGD KG/HA
2011-04-24 482
2011-06-03 3

N P K
135 14 24

SORT: Brando

SÅTT DEN: 2011-04-24 KG/HA: 3

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 7.1

VÄXTSKYDD
0.2 Mavrik

DATUM
2011-06-03

BEH ENL PLAN

2011-04-26

2011-05-12

2011-06-01

GRÖDANS UTV.STADIUM

Före uppkomst

DC 10 (1 cm)

DC 13 (5 cm)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-27

FÖRSÖKSLED:	Plister		Plister		Stat: Frekv % av block	Plister		Snärj- måra	Rel	Snärj- måra	Rel	Stat: Frekv % av block	Snärj- måra	Rel
	st/m2 07-06	Rel tal	fältv g/m2 07-06	Rel tal		LAMSS g/m2 geom.	Rel tal			fältv g/m2 07-06			fältv g/m2 07-06	
A. Obehandlat [Regioner]	4.8	100	1.8	100	75	2.0	100	12.0	100	22.8	100	100	21.3	100
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.8	16	0.0	0	0			9.5	79	8.8	38	100	7.6	35
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	3.0	63	0.5	29	50	1.0	50	8.5	71	11.3	49	100	5.9	28
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	5.3	111	1.8	100	100	1.7	84	9.3	77	11.8	52	100	8.2	38
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	2.8	58	0.5	29	25	2.0	100	5.8	48	3.3	14	100	3.1	15
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	5.0	105	2.0	114	50	2.6	132	20.0	167	25.5	112	100	24.8	116
G. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [SJV]	7.0	147	3.8	214	75	3.2	160	5.5	46	3.8	16	100	3.3	16
H. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [DOW]	6.5	137	2.5	143	100	2.4	119	14.5	121	11.0	48	100	10.8	51
1) Senast 3 dagar efter sådd														
2) Vid grödans stadium DC 10 (hjärtblad)														
3) Vid grödans stadium DC 12-13, minst 2 fullt utveckl örtblad														
4) Vid grödans stadium DC 12-14														
STDEV%						73.3							68.3	
PROB F1						.7099							.0014	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål, jordrök och pilört.

OBS! Plister, våtarv, åkerbinda, åkersenap, åkermolke och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B112 LÅN-FNR: D-002-2011

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Malmström
ADRESS: Tärby gård, Eskilstuna

GÖDSLING
NPK 28-3-5
Photrel

DATUM
2011-04-24
2011-06-03
MÄNGD KG/HA
482
3

N P K
135 14 24

SORT: Brando

SÅTT DEN: 2011-04-24 KG/HA: 3

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 7.1

VÄXTSKYDD
0.2 Mavrik

DATUM
2011-06-03

BEH ENL PLAN

2011-04-26
2011-05-12
2011-06-01
Före uppkomst
DC 10 (1 cm)
DC 13 (5 cm)

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-27

F Ö R S Ö K S L E D:	Svin- målla	Rel	Svin- målla	Rel	Stat: Frekv	Svin- målla	Rel	Våtarv	Rel	Stat: Frekv	Våtarv	Rel		
	st/m2	tal	fältv g/m2	tal	% av block	CHEAL g/m2	tal	fältv g/m2	tal	% av block	STEME g/m2	tal		
	07-06		07-06			geom.		07-06			geom.			
A. Obehandlat [Regioner]	12.3	100	24.8	100	100	12.0	100	0.5	100	25	2.0	100		
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	8.3	67	22.0	89	75	6.9	58	0.0	0	0				
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	8.8	71	10.3	41	100	4.5	38	0.0	0	0				
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	9.3	76	15.3	62	100	8.7	73	0.3	50	25	1.0	50		
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	6.0	49	3.0	12	75	3.2	27	0.0	0	0				
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	16.0	131	13.5	55	100	9.1	76	0.5	100	25	2.0	100		
G. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [SJV]	0.8	6	0.5	2	50	1.0	8	0.8	150	50	1.4	71		
H. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [DOW]	2.0	16	5.8	23	25	23.0	192	4.8	950	75	4.4	219		
1) Senast 3 dagar efter sådd														
2) Vid grödans stadium DC 10 (hjärtblad)														
3) Vid grödans stadium DC 12-13, minst 2 fullt utveckl örtblad														
4) Vid grödans stadium DC 12-14														
STDEV%						139.4					88.5			
PROB F1						.4944					.6050			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål, jordrök och pilört.

OBS! Plister, våtarv, åkerbinda, åkersenap, åkermolke och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B112 LÅN-FNR: D-002-2011

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Malmström
ADRESS: Tärby gård, Eskilstuna

GÖDSLING
NPK 28-3-5
Photrel

DATUM MÄNGD KG/HA
2011-04-24 482
2011-06-03 3

N P K
135 14 24

SORT: Brando

SÅTT DEN: 2011-04-24 KG/HA: 3

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 7.1

VÄXTSKYDD
0.2 Mavrik

DATUM
2011-06-03

BEH ENL PLAN

2011-04-26

2011-05-12

2011-06-01

GRÖDANS UTV.STADIUM

Före uppkomst

DC 10 (1 cm)

DC 13 (5 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-27

F Ö R S Ö K S L E D:	Åker- binda	Rel	Åker- binda	Rel	Stat: Frekv	Åker- binda	Rel	Åker- senap	Rel	Åker- senap	Rel	Stat: Frekv	Åker- senap	Rel
	st/m2 07-06	tal	fältv g/m2 07-06	tal	% av block	POLCO g/m2 geom.	tal	st/m2 07-06	tal	fältv g/m2 07-06	tal	% av block	SINAR g/m2 geom.	tal
A. Obehandlat [Regioner]	4.3	100	5.3	100	75	5.2	100	0.5	100	1.0	100	50	2.0	100
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	4.3	100	4.3	81	100	3.1	60	0.0	0	0.0	0	0		
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	6.5	153	2.5	48	100	2.4	46	0.0	0	0.0	0	0		
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	3.5	82	6.0	114	100	4.4	84	1.0	200	18.0	1800	25	72.0	3600
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	3.0	71	4.3	81	100	3.0	58	0.0	0	0.0	0	0		
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	4.3	100	3.8	71	75	4.9	95	0.3	50	0.3	25	25	1.0	50
G. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [SJV]	2.5	59	1.5	29	75	1.6	31	0.5	100	1.3	125	25	5.0	250
H. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			0.3	50	0.5	50	25	2.0	100
1) Senast 3 dagar efter sådd														
2) Vid grödans stadium DC 10 (hjärtblad)														
3) Vid grödans stadium DC 12-13, minst 2 fullt utveckl örtblad														
4) Vid grödans stadium DC 12-14														
STDEV%						84.1							0	
PROB F1						.5671							.0001	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål, jordrök och pilört.

OBS! Plister, våtarv, åkerbinda, åkersenap, åkermolke och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B112 LÅN-FNR: D-002-2011

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Malmström
ADRESS: Tärby gård, Eskilstuna

GÖDSLING
NPK 28-3-5
Photrel

DATUM
2011-04-24
2011-06-03
MÄNGD KG/HA
482
3

N P K
135 14 24

SORT: Brando

SÅTT DEN: 2011-04-24 KG/HA: 3

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 7.1

VÄXTSKYDD
0.2 Mavrik

DATUM
2011-06-03

BEH ENL PLAN

2011-04-26

2011-05-12

2011-06-01

GRÖDANS UTV.STADIUM

Före uppkomst

DC 10 (1 cm)

DC 13 (5 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-27

F Ö R S Ö K S L E D:	Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs			
	st/m2 07-06	Rel tal	fältv g/m2 07-06	Rel tal		WEADR g/m2 geom.	Rel tal	fältv g/m2 07-06	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal		
A. Obehandlat [Regioner]	3.8	100	8.3	100	100	7.6	100	64.3	100	100	56.8	100		
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	5.3	140	2.8	33	75	2.8	36	37.8	59	100	21.3	37		
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	4.8	127	5.5	67	75	4.2	55	30.0	47	100	27.3	48		
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	6.3	167	8.3	100	100	6.9	90	61.3	95	100	51.2	90		
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	2.0	53	2.8	33	50	4.2	56	13.8	21	100	12.7	22		
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	3.5	93	13.3	161	75	14.9	195	58.8	91	100	57.3	101		
G. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [SJV]	4.5	120	11.8	142	100	7.7	102	23.3	36	100	20.8	37		
H. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [DOW]	6.3	167	6.3	76	100	5.0	66	30.8	48	100	28.7	50		
1) Senast 3 dagar efter sådd														
2) Vid grödans stadium DC 10 (hjärtblad)														
3) Vid grödans stadium DC 12-13, minst 2 fullt utveckl örtblad														
4) Vid grödans stadium DC 12-14														
STDEV%						89.4					64.7			
PROB F1						.4597					.0248			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål, jordrök och pilört.

OBS! Plister, våtarv, åkerbinda, åkersenap, åkermolke och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B112 LÅN-FNR: D-002-2011

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Malmström
ADRESS: Tärby gård, Eskilstuna

GÖDSLING
NPK 28-3-5
Photrel

DATUM MÄNGD KG/HA
2011-04-24 482
2011-06-03 3

N P K
135 14 24

SORT: Brando

SÅTT DEN: 2011-04-24 KG/HA: 3

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 7.1

VÄXTSKYDD
0.2 Mavrik

DATUM
2011-06-03

BEH ENL PLAN

2011-04-26

2011-05-12

2011-06-01

GRÖDANS UTV.STADIUM

Före uppkomst

DC 10 (1 cm)

DC 13 (5 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-27

F Ö R S Ö K S L E D:	Åker- molke	*	Åker- molke	*	Stat: Frekv	Åker- molke	*	Åker- tistel	*	Stat: Frekv	Åker- tistel	*		
	st/m2 07-06	Rel tal	fältv g/m2 07-06	Rel tal	% av block	XSONAR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-06	fältv g/m2 07-06	% av block	g/m2 geom.	Rel tal		
A. Obehandlat [Regioner]	0.5	100	0.5	100	25	2.0	100	0.0	0.0	0				
B. 2.0 1 Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0	0				
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			1.5	7.5	25	30.0	100		
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [Svensk Raps]	0.5	100	0.8	150	25	3.0	150	2.3	75.5	50	102.4	341		
E. 2.0 1 Butisan Top 2) [Svensk Raps]	0.0	0	0.0	0	0			3.3	90.3	100	54.0	180		
F. 1.0 1 Fox 3) [MA]	0.0	0	0.0	0	0			2.5	21.0	50	41.8	139		
G. 1.0 1 Butisan Top + 0.15 1 Galera + 0.3 1 PG26N 4) [SJV]	0.3	50	0.5	100	25	2.0	100	0.0	0.0	0				
H. 0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N 4) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			2.0	5.8	25	23.0	77		
1) Senast 3 dagar efter sådd														
2) Vid grödans stadium DC 10 (hjärtblad)														
3) Vid grödans stadium DC 12-13, minst 2 fullt utveckl örtblad														
4) Vid grödans stadium DC 12-14														
STDEV%						0					130.9			
PROB F1											.8739			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål, jordrök och pilört.

OBS! Plister, våtarv, åkerbinda, åkersenap, åkermolke och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B112 LÅN-FNR: D-002-2011

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Malmström
ADRESS: Tärby gård, Eskilstuna

GÖDSLING
NPK 28-3-5
Photrel

DATUM MÄNGD KG/HA
2011-04-24 482
2011-06-03 3

N P K
135 14 24

SORT: Brando

SÅTT DEN: 2011-04-24 KG/HA: 3

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 7.1

VÄXTSKYDD
0.2 Mavrik

DATUM
2011-06-03

BEH ENL PLAN
2011-04-26
2011-05-12
2011-06-01

GRÖDANS UTV.STADIUM
Före uppkomst
DC 10 (1 cm)
DC 13 (5 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-27

F Ö R S Ö K S L E D:	Övriga *	Stat:	Övriga *										
	flerårig	Frekv	flerårig										
	st/m2	% av	XWEEPD										
	07-06	fältv	g/m2	geom.	Rel								
A. Obehandlat [Regioner]	0.0	0.0	0										
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.0	0.0	0										
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.3	0.0	0										
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	0.0	0.0	0										
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	1.5	18.8	50	14.7	100								
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	0.0	0.0	0										
G. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [SJV]	0.0	0.0	0										
H. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [DOW]	0.0	0.0	0										
1) Senast 3 dagar efter sådd													
2) Vid grödans stadium DC 10 (hjärtblad)													
3) Vid grödans stadium DC 12-13, minst 2 fullt utveckl örtblad													
4) Vid grödans stadium DC 12-14													
STDEV%				224.7									
PROB F1													

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål, jordrök och pilört.

OBS! Plister, våtarv, åkerbinda, åkersenap, åkermolke och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B112 LÅN-FNR: D-002-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 7
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027
GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Malmström
ADRESS: Tärby gård, Eskilstuna

GÖDSLING
NPK 28-3-5
Photrel

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2011-04-24	482	135	14	24
2011-06-03	3			

SORT: Brando
SÅTT DEN: 2011-04-24 KG/HA: 3
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
-------	--------------	---------------------

GALAP.GM2:F1 ***	A<>E A<>G E<>F F<>G
GALAP.GM2:F1 **	C<>F
GALAP.GM2:F1 *	A<>B A<>C B<>F D<>F E<>H G<>H
SINAR.GM2:F1 ***	A<>D A<>F A<>G D<>F D<>G D<>H F<>G F<>H G<>H
WEADR.GM2:F1 *	B<>F
WEADT.GM2:F1 **	A<>E D<>E E<>F
WEADT.GM2:F1 *	A<>B A<>G B<>F F<>G



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B112 LÅN-FNR: D-002-2011

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Malmström
ADRESS: Tärby gård, Eskilstuna

GÖDSLING
NPK 28-3-5
Photrel

DATUM MÄNGD KG/HA
2011-04-24 482
2011-06-03 3

N P K
135 14 24

SORT: Brando

SÅTT DEN: 2011-04-24 KG/HA: 3

FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 7.1

VÄXTSKYDD
0.2 Mavrik

DATUM
2011-06-03

BEH ENL PLAN

2011-04-26

2011-05-12

2011-06-01

GRÖDANS UTV.STADIUM

Före uppkomst

DC 10 (1 cm)

DC 13 (5 cm)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-28

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]
F. 1.0 l Fox 3) [MA]
G. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [SJV]
H. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [DOW]

1) Senast 3 dagar efter sådd
2) Vid grödans stadium DC 10 (hjärtblad)
3) Vid grödans stadium DC 12-13, minst 2 fullt utveckl örtblad
4) Vid grödans stadium DC 12-14

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 09-05	Rel tal	Råfett skörd kg/ha 09-05	Rel tal	Råfett %	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Stjälk styrka vid skörd 09-05							
2380	100	1021	100	47.1	1.9	10.4	73							
2330	98	1010	99	47.7	1.5	10.0	73							
2370	100	1039	102	48.2	1.5	10.2	80							
2280	96	989	97	47.7	1.7	9.6	73							
2370	99	1038	102	48.2	1.3	10.6	80							
2330	98	1012	99	47.8	1.8	10.4	80							
2350	99	999	98	46.7	1.5	9.8	80							
2050	86	848	83	45.6	2.2	9.5	80							
2300		994					77							
4.1		4.6					11.7							
30		30					32							
.0018		.0003					.6430							
150		70					13							

ANM: Skörden (och analysvärdena) kasserad i led E block I och led D block IV p.g.a. hög vikt (>200 g/kvm) av fleråriga ogräs vid ogräsräkningen 07-06.
Tillväxthämningar: 5 cm i led G och H 07-14.
Ogräsbestånd vid skörd ej graderat, låga mängder i samtliga rutor.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B112 LÅN-FNR: D-002-2011

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

SIDA 2

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Malmström
ADRESS: Tärby gård, Eskilstuna

GÖDSLING
NPK 28-3-5
Photrel

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2011-04-24	482	135	14	24
2011-06-03	3			

SORT: Brando

SÅTT DEN: 2011-04-24 KG/HA: 3

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M09:F1 ***	A<>H B<>H C<>H E<>H F<>H G<>H
Y.M09:F1 **	D<>H
Y-FAT:F1 ***	A<>H B<>H C<>H E<>H F<>H G<>H
Y-FAT:F1 **	D<>H

Jordanalys:

ADB-nr: 05B112
Serienr: L5-8020-2011
Län-fnr: D-002-2011

Jordart: mmh ML

Mullhalt %: 5.4

Lerhalt %: 40

Mjåla %: 44

Sand+grovmå %: 10.6

pH: 7.1

P-AL (mg/100g): 3.8

K-AL (mg/100g): 19.8

Mg-AL (mg/100g): 51.1

K/Mg (kvot): 0.4

Ca-AL (mg/100g): 402

Al-AL (mg/100g): 28.6

Fe-AL (mg/100g): 40.8

K-HCl (mg/100g): 465

P-HCl (mg/100g): 50

Cu-HCl (mg/kg): 30.0

KI: II

KI: IV

KI: 5

KI: 3