



R E S U L T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B113 LÅN-FNR: E-028-2011

JBR.OMR: 12b

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården, Vreta kloster

GÖDSLING
NPK 26-3-4

DATUM MÄNGD KG/HA
2011-04-28 430

N P K
110 11 15

SORT: Joplin
SÅTT DEN: 2011-04-28 KG/HA: 7.5
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.6

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2011-04-29 -
2011-05-18 DC 10
2011-05-26 DC 12

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-14

F Ö R S Ö K S L E D:	Plister		Plister		Stat: Frekv % av block	Plister		Svin- målla	Rel	Svin- målla	Rel	Stat: Frekv % av block	Svin- målla	Rel
	st/m2 07-01	Rel tal	fältv g/m2 07-01	Rel tal		LAMSS g/m2 geom.	Rel tal			fältv g/m2 07-01	Rel tal		CHEAL g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	5.8	100	3.0	100	100	2.3	100	7.3	100	60.8	100	100	52.1	100
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	5.5	96	3.5	117	100	3.4	148	4.8	66	41.0	67	100	39.0	75
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	3.5	61	2.5	83	100	2.2	96	6.3	86	53.5	88	100	46.5	89
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	1.5	26	0.8	25	75	1.0	43	6.8	93	38.5	63	100	28.5	55
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	2.3	39	0.8	25	75	1.0	43	3.5	48	21.8	36	100	17.5	34
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	0.5	9	0.3	8	25	1.0	43	8.8	121	9.0	15	100	5.8	11
G. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [SJV]	1.8	30	0.5	17	50	1.0	43	0.3	3	1.0	2	25	4.0	8
H. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [DOW]	4.5	78	2.3	75	75	2.5	107	0.5	7	0.8	1	25	3.0	6
1) Senast 3 dagar efter sådd 2) Vid grödans stadium DC 10 (hjärtblad) 3) Vid grödans stadium DC 12-13, minst 2 fullt utveckl örtblad 4) Vid grödans stadium DC 12-14														
STDEV% PROB F1						53.6 .0470							82.8 .0055	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra, lin, förgätmigej, trampört, åkerbinda, groblad, jordrök.
OBS! Plister och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B113 LÅN-FNR: E-028-2011

JBR.OMR: 12b

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården, Vreta kloster

GÖDSLING
NPK 26-3-4

DATUM MÄNGD KG/HA
2011-04-28 430

N P K
110 11 15

SORT: Joplin
SÅTT DEN: 2011-04-28 KG/HA: 7.5
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.6

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2011-04-29 -
2011-05-18 DC 10
2011-05-26 DC 12

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-14

F Ö R S Ö K S L E D:	Åkerviol		Åkerviol		Stat: Frekv % av block	Åkerviol		Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs	
	st/m2 07-01	Rel tal	fältv g/m2 07-01	Rel tal		VIOAR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-01	Rel tal	fältv g/m2 07-01	Rel tal		WEADR g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	32.0	100	13.0	100	100	11.3	100	4.0	100	6.5	100	100	3.9	100
B. 2.0 1 Nimbus 1) [BASF]	18.5	58	8.5	65	100	5.2	46	4.0	100	6.0	92	100	3.7	95
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	19.3	60	9.3	71	100	7.4	66	2.5	63	1.0	15	75	1.3	32
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [Svensk Raps]	13.3	41	6.5	50	100	5.6	49	1.5	38	3.3	50	50	3.5	88
E. 2.0 1 Butisan Top 2) [Svensk Raps]	17.5	55	9.0	69	100	8.8	78	1.3	31	0.8	12	50	1.4	36
F. 1.0 1 Fox 3) [MA]	1.5	5	0.5	4	50	1.0	9	5.5	138	2.5	38	100	2.2	56
G. 1.0 1 Butisan Top + 0.15 1 Galera + 0.3 1 PG26N 4) [SJV]	21.5	67	10.5	81	100	10.2	91	2.8	69	3.8	58	50	5.1	130
H. 0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N 4) [DOW]	18.3	57	7.0	54	100	5.9	53	3.5	88	2.0	31	75	1.8	46
1) Senast 3 dagar efter sådd 2) Vid grödans stadium DC 10 (hjärtblad) 3) Vid grödans stadium DC 12-13, minst 2 fullt utveckl örtblad 4) Vid grödans stadium DC 12-14														
STDEV%						71.6							104.6	
PROB F1						.0333							.6987	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra, lin, förgätmigej, trampört, åkerbinda, groblad, jordrök.
OBS! Plister och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B113 LÅN-FNR: E-028-2011

JBR.OMR: 12b

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården, Vreta kloster

GÖDSLING
NPK 26-3-4

DATUM MÄNGD KG/HA
2011-04-28 430

N P K
110 11 15

SORT: Joplin
SÅTT DEN: 2011-04-28 KG/HA: 7.5
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.6

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2011-04-29 -
2011-05-18 DC 10
2011-05-26 DC 12

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-14

F Ö R S Ö K S L E D:	Samt låar örtogräs		Samt låar örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt låar örtogräs		Kvick- rot	*	Stat: Frekv % av block	Kvick- rot	*		
	st/m2 07-01	Rel tal	fältv g/m2 07-01	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal				st/m2 07-01	fältv g/m2 07-01		
A. Obehandlat [Regioner]	49.0	100	83.3	100	100	73.6	100	0.0	0.0	0				
B. 2.0 1 Nimbus 1) [BASF]	32.8	67	59.0	71	100	55.7	76	0.3	3.5	25	14.0		100	
C. 3.0 1 Nimbus 1) [BASF]	31.5	64	66.3	80	100	60.4	82	0.0	0.0	0				
D. 2.0 1 Butisan Top 1) [Svensk Raps]	23.0	47	49.0	59	100	38.2	52	0.5	2.3	25	9.0		64	
E. 2.0 1 Butisan Top 2) [Svensk Raps]	24.5	50	32.3	39	100	30.1	41	0.0	0.0	0				
F. 1.0 1 Fox 3) [MA]	16.3	33	12.3	15	100	10.5	14	0.0	0.0	0				
G. 1.0 1 Butisan Top + 0.15 1 Galera + 0.3 1 PG26N 4) [SJV]	26.3	54	15.8	19	100	14.1	19	0.0	0.0	0				
H. 0.3 1 Galera + 0.3 1 PG26N 4) [DOW]	26.8	55	12.0	14	100	9.8	13	0.0	0.0	0				
1) Senast 3 dagar efter sådd 2) Vid grödans stadium DC 10 (hjärtblad) 3) Vid grödans stadium DC 12-13, minst 2 fullt utveckl örtblad 4) Vid grödans stadium DC 12-14														
STDEV% PROB F1						62.9 .0002						0		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra, lin, förgätmigej, trampört, åkerbinda, groblad, jordrök.
OBS! Plister och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B113 LÅN-FNR: E-028-2011 JBR.OMR: 12b

SIDA 4

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården, Vreta kloster

GÖDSLING
NPK 26-3-4

DATUM MÄNGD KG/HA N P K
2011-04-28 430 110 11 15

SORT: Joplin
SÅTT DEN: 2011-04-28 KG/HA: 7.5
FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CHEAL.GM2:F1 **	A<>F A<>H B<>F C<>F C<>H
CHEAL.GM2:F1 *	A<>G B<>G B<>H C<>G D<>F D<>G D<>H
LAMSS.GM2:F1 **	B<>D B<>E
LAMSS.GM2:F1 *	B<>G
VIOAR.GM2:F1 ***	A<>F
VIOAR.GM2:F1 **	C<>F E<>F F<>G F<>H
VIOAR.GM2:F1 *	B<>F D<>F
WEADT.GM2:F1 ***	A<>F A<>H B<>F B<>H C<>F C<>H
WEADT.GM2:F1 **	A<>G B<>G C<>G D<>F D<>H
WEADT.GM2:F1 *	D<>G E<>F E<>H



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B113 LÅN-FNR: E-028-2011

JBR.OMR: 12b

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården, Vreta kloster

GÖDSLING
NPK 26-3-4

DATUM MÄNGD KG/HA
2011-04-28 430

N P K
110 11 15

SORT: Joplin
SÅTT DEN: 2011-04-28 KG/HA: 7.5
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.6

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2011-04-29 -
2011-05-18 DC 10
2011-05-26 DC 12

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-16

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 09-03	Rel tal	Råfett skörd kg/ha 09-03	Rel tal	Råfett %	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Tusen korn vikt g	Nek roser vår 0-100 06-21	Stjälk styrka vid skörd 09-03	Ogräs före komst grad 09-03			
A. Obehandlat [Regioner]	2640	100	1150	100	47.9	2.9	16.6	3.9	0	90	15			
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	2720	103	1178	102	47.6	1.9	15.7	3.4	0	89	3			
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	2720	103	1179	102	47.6	1.7	15.8	3.6	0	78	4			
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	2750	104	1179	103	47.2	1.9	16.1	3.6	0	83	3			
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	2690	102	1140	99	46.6	1.3	15.4	3.6	0	80	3			
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	2740	104	1173	102	47.1	1.1	15.2	3.6	20	80	3			
G. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [SJV]	2730	103	1173	102	47.2	0.9	14.9	3.6	0	90	4			
H. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 4) [DOW]	2690	102	1158	101	47.2	1.0	14.8	4.0	0	94	5			
1) Senast 3 dagar efter sådd 2) Vid grödans stadium DC 10 (hjärtblad) 3) Vid grödans stadium DC 12-13, minst 2 fullt utveckl örtblad 4) Vid grödans stadium DC 12-14														
-X-	2710		1166							85				
CV%	2.6		2.4							6.2				
OBS	32		32							32				
PROB F1	.4460		.3604							.0017				
LSD F1	100		41							8				

ANM: Inga beh.skador 05-26.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2011 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B113 LÅN-FNR: E-028-2011 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården, Vreta kloster

GÖDSLING
NPK 26-3-4

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2011-04-28	430	110	11	15

SORT: Joplin
SÅTT DEN: 2011-04-28 KG/HA: 7.5
FÖRFRUKT: Höstvetete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
---	-----------	-------	--------------	---------------------

Y.M09:F1 *	A<>D
STS.SH:F1 ***	C<>H
STS.SH:F1 **	A<>C B<>C C<>G D<>H E<>H F<>H
STS.SH:F1 *	A<>E A<>F B<>E B<>F E<>G F<>G

Jordanalys:

ADB-nr: 05B113
Serienr: L5-8020-2011
Län-fnr: E-028-2011

Jordart: mmh ML

Mullhalt %: 5.2

Lerhalt %: 32

Mjåla %: 46

Sand+grovmå %: 16.8

pH: 6.6

P-AL (mg/100g): 7.4

K-AL (mg/100g): 12.4

Mg-AL (mg/100g): 13.8

K/Mg (kvot): 0.9

Ca-AL (mg/100g): 402

K-HCl (mg/100g): 260

Cu-HCl (mg/kg): 18.5

P-HCl (mg/100g): 59

KI: III

KI: III

KI: 4

KI: 3