



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B140 LÅN-FNR: U-112-2011 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4	2012-04-15	270	73		
Svinflytgödsel	2012-05-01	32000			

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2011-10-26 DC 11 (4 cm)

2012-05-03 DC 23 (8 cm)

2012-05-15 DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-22

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Blåklint		Blåklint		Stat: Frekv % av block
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		MATIN g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	
	07-03		07-03			geom.		07-03		07-03		
A. Obehandlat [Regioner]	2.8	100	46.8	100	100	30.3	100	3.8	100	59.0	100	100
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	1.5	55	23.0	49	75	11.7	39	1.8	47	35.5	60	50
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	0.3	9	0.1	0	25	0.5	2	0.0	0	0.0	0	0
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätnedel) 1) [DuPont]	2.3	82	5.1	11	100	4.1	13	0.0	0	0.0	0	0
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel) 2) [Regioner]	2.5	91	4.4	9	25	17.4	57	0.0	0	0.0	0	0
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten												
2) Vid tillväxtens början på våren												
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren												
STDEV%						123.4						
PROB F1						.0965						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av harkål, penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, lomme, trampört, viol, kämpar, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning

p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B140 LÅN-FNR: U-112-2011 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4	2012-04-15	270	73		
Svinflytgödsel	2012-05-01	32000			

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2011-10-26 DC 11 (4 cm)

2012-05-03 DC 23 (8 cm)

2012-05-15 DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-22

F Ö R S Ö K S L E D:	Blåklint		Förgät-migej		Förgät-migej		Stat: Frekv % av block	Förgät-migej MYOSS		Jordrök		Jordrök
	CENCY g/m2 geom.	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		geom.	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2
A. Obehandlat [Regioner]	30.7	100	19.0	100	40.8	100	100	36.1	100	7.5	100	18.7
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	61.8	201	8.0	42	8.3	20	75	11.0	30	20.3	270	54.0
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]			1.5	8	0.2	0	50	0.3	1	6.8	90	8.0
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätmedel) 1) [DuPont]			20.8	109	11.0	27	100	10.2	28	27.5	367	67.9
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]			0.5	3	0.1	0	25	0.5	1	4.3	57	1.2
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel) 2) [Regioner]			0.5	3	0.1	0	25	0.5	1	14.8	197	9.0
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten												
2) Vid tillväxtens början på våren												
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren												
STDEV%	128.2							63.8				
PROB F1	.5623							.0001				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av harkål, penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, lomme, trampört, viol, kämpar, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning

p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B140 LÅN-FNR: U-112-2011 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 3

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4	2012-04-15	270	73		
Svinflytgödsel	2012-05-01	32000			

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2011-10-26 DC 11 (4 cm)

2012-05-03 DC 23 (8 cm)

2012-05-15 DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-22

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Stat:	Jordrök		Lomme		Lomme		Stat:	Lomme	Rel tal	Plister
		Frekv % av block	FUMOF g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-03	Rel tal	fältv g/m2 07-03	Rel tal	Frekv % av block	CAPBP g/m2 geom.		
A. Obehandlat [Regioner]	100	75	20.8	100	3.0	100	15.0	100	75	16.9	100	8.5
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	289	100	48.0	231	0.0	0	0.0	0	0			14.8
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	43	75	9.3	45	0.0	0	0.0	0	0			18.8
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätnedel) 1) [DuPont]	364	100	67.4	324	0.3	8	0.1	1	25	0.4	2	23.5
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]	7	100	1.1	5	0.0	0	0.0	0	0			6.8
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel) 2) [Regioner]	48	100	7.7	37	0.0	0	0.0	0	0			5.8
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten												
2) Vid tillväxtens början på våren												
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren												
STDEV%			56.7									
PROB F1			.0001									

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av harkål, penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, lomme, trampört, viol, kämpar, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning

p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B140 LÅN-FNR: U-112-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås
ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING
NS 27-4
Svinflytgödsel

DATUM
2012-04-15 270
2012-05-01 32000

N P K
73

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2011-10-26 DC 11 (4 cm)
2012-05-03 DC 23 (8 cm)
2012-05-15 DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-22

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Plister		Stat: Frekv % av block	Plister		Snärj- måra st/m2 07-03	Rel tal	Snärj- måra fältv g/m2 07-03	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Snärj- måra GALAP g/m2 geom.
		fältv g/m2 07-03	Rel tal		LAMSS g/m2 geom.	Rel tal						
A. Obehandlat [Regioner]	100	6.5	100	100	4.4	100	8.5	100	111.8	100	100	85.8
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	174	13.0	202	100	11.6	262	1.5	18	4.6	4	75	3.4
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	221	9.8	152	100	9.2	209	1.0	12	0.8	1	50	1.6
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätnedel) 1) [DuPont]	276	13.3	206	100	12.4	281	0.5	6	0.7	1	50	1.2
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]	79	2.2	34	100	2.2	49	1.0	12	0.9	1	100	0.7
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel) 2) [Regioner]	68	3.7	58	75	3.7	83	1.5	18	2.5	2	25	10.0
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten												
2) Vid tillväxtens början på våren												
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren												
STDEV%					70.7							104
PROB F1					.0149							.0011

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av harkål, penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, lomme, trampört, viol, kämpar, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning

p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

SIDA 5

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B140

LÅN-FNR: U-112-2011

JBR.OMR: 13c

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N P K

73

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2011-10-26

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 11 (4 cm)

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-22

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Trampört		Trampört		Stat: Frekv % av block	Trampört		Veronika		Veronika	
		st/m2 07-03	Rel tal	fältv g/m2 07-03	Rel tal		POLAV g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-03	Rel tal	fältv g/m2 07-03	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	100	4.0	100	9.3	100	100	8.1	100	17.5	100	25.0	100
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	4	1.0	25	2.5	27	75	2.4	30	0.8	4	0.8	3
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	2	0.0	0	0.0	0	0			7.8	44	6.9	27
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätmedel) 1) [DuPont]	1	8.3	206	5.2	56	75	5.4	66	11.0	63	6.1	24
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]	1	2.3	56	1.0	10	25	3.8	47	9.5	54	1.6	7
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel) 2) [Regioner]	12	0.5	13	0.1	1	25	0.3	4	19.8	113	21.5	86
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten												
2) Vid tillväxtens början på våren												
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren												
STDEV%							79.7					
PROB F1							.0589					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av harkål, penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, lomme, trampört, viol, kämpar, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning

p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B140 LÅN-FNR: U-112-2011 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 6

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4	2012-04-15	270	73		
Svinflytgödsel	2012-05-01	32000			

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2011-10-26	DC 11 (4 cm)
		2012-05-03	DC 23 (8 cm)
		2012-05-15	DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-22

F Ö R S Ö K S L E D:	Stat: Frekv % av block	Veronika		Viol		Viol		Stat: Frekv % av block	Viol		Våtarv	
		VERSS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-03	Rel tal	fältv g/m2 07-03	Rel tal		VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	fältv g/m2 07-03	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	100	23.6	100	3.5	100	5.9	100	100	3.5	100	9.3	100
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	25	3.0	13	0.8	21	0.3	6	50	0.5	15	22.5	242
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	75	4.0	17	1.5	43	0.5	9	75	0.6	16	0.3	3
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätmedel) 1) [DuPont]	100	5.4	23	7.3	207	2.7	46	75	2.6	75	65.9	709
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]	100	1.5	7	2.0	57	0.3	6	25	1.3	37	0.5	5
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel) 2) [Regioner]	100	19.1	81	3.5	100	1.9	32	75	1.4	41	1.2	12
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten												
2) Vid tillväxtens början på våren												
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren												
STDEV%		76.9							115.6			
PROB F1		.0017							.3309			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av harkål, penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, lomme, trampört, viol, kämpar, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning

p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B140 LÅN-FNR: U-112-2011 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 7

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4	2012-04-15	270	73		
Svinflytgödsel	2012-05-01	32000			

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2011-10-26	DC 11 (4 cm)
		2012-05-03	DC 23 (8 cm)
		2012-05-15	DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-22

F Ö R S Ö K S L E D:	Stat: Frekv % av block	Våtarv STEME g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år örtogräs st/m2 07-03	Rel tal	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2 07-03	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel tal	Samt lå örtogräs fältv g/m2 07-03	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	75	8.7	100	3.8	100	3.2	100	75	4.0	100	350.9	100
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	100	22.0	252	1.3	33	1.2	37	75	1.5	37	165.6	47
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	75	0.4	4	0.0	0	0.0	0	0			26.7	8
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätnedel) 1) [DuPont]	100	62.4	714	2.8	73	1.2	39	50	2.3	58	179.1	51
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]	75	0.5	6	0.0	0	0.0	0	0			7.9	2
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel) 2) [Regioner]	75	1.2	14	0.5	13	0.5	17	50	0.4	11	44.8	13
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten												
2) Vid tillväxtens början på våren												
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren												
STDEV%		69.8							94.3			
PROB F1		.0001							.1851			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av harkål, penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, lomme, trampört, viol, kämpar, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning

p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B140 LÅN-FNR: U-112-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 8

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås
ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4	2012-04-15	270	73		
Svinflytgödsel	2012-05-01	32000			

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2011-10-26	DC 11 (4 cm)
		2012-05-03	DC 23 (8 cm)
		2012-05-15	DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-22

F Ö R S Ö K S L E D:	Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs		Kämpar *		Kämpar *		Stat: Frekv % av block	Maskros*		Maskros*	
		WEADT g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-03	Rel tal	fältv g/m2 07-03	Rel tal		st/m2 07-03	Rel tal	fältv g/m2 07-03	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	100	339.5	100	0.3	100	0.1	100	25	0.3	100	3.8	100
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	100	153.3	45	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	100	23.8	7	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätnedel) 1) [DuPont]	100	174.5	51	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]	100	7.5	2	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel) 2) [Regioner]	100	43.7	13	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten												
2) Vid tillväxtens början på våren												
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren												
STDEV%		38.3										
PROB F1		.0001										

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av harkål, penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, lomme, trampört, viol, kämpar, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning

p.g.a. få plantor i led A.

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås
ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING
NS 27-4
Svinflytgödsel

DATUM	MÄNGD KG/HA
2012-04-15	270
2012-05-01	32000

N	P	K
73		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV. STADIUM

2011-10-26	DC 11 (4 cm)
2012-05-03	DC 23 (8 cm)
2012-05-15	DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-22

	Stat: Frekv % av block	Åker- fräken st/m2 07-03	* fältv g/m2 07-03	Stat: Frekv % av block	Åker- fräken XEQUAR g/m2 geom.	* Rel tal	Gräs- ogräs fältv g/m2 07-03	* Rel tal	Stat: Frekv % av block	Gräs- ogräs XWEEDG g/m2 geom.	* Rel tal	
F Ö R S Ö K S L E D:												
A. Obehandlat [Regioner]	25	0.0	0.0	0			0.8	100	50	0.5	100	
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	0	0.0	0.0	0			0.0	0	0			
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	0	0.0	0.0	0			1.8	226	25	7.0	1278	
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätnedel) 1) [DuPont]	0	1.0	2.3	50	3.8	100	4.1	523	50	2.8	512	
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]	0	0.0	0.0	0			2.0	252	25	7.8	1424	
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel) 2) [Regioner]	0	0.8	1.6	50	2.5	66	1.0	126	25	3.9	712	
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten												
2) Vid tillväxtens början på våren												
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren												
STDEV%					90.3					242.1		
PROB F1					.6958					.8557		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av harkål, penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, lomme, trampört, viol, kämpar, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T , OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B140

LÅN-FNR: U-112-2011

JBR.OMR: 13c

SIDA 10
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N P K

73

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CAPBP.GM2:F1 *	A<>D
FUMOF.GM2:F1 ***	A<>E B<>E B<>F C<>D C<>E D<>E D<>F E<>F
FUMOF.GM2:F1 **	B<>C
FUMOF.GM2:F1 *	A<>D A<>F
GALAP.GM2:F1 ***	A<>D A<>E
GALAP.GM2:F1 **	A<>B A<>C
GALAP.GM2:F1 *	E<>F
LAMSS.GM2:F1 **	B<>E C<>E D<>E
LAMSS.GM2:F1 *	B<>F D<>F
MATIN.GM2:F1 *	A<>C
MYOSS.GM2:F1 ***	A<>C A<>E A<>F B<>C C<>D
MYOSS.GM2:F1 **	B<>E B<>F D<>E D<>F
MYOSS.GM2:F1 *	A<>B A<>D
POLAV.GM2:F1 **	A<>F
POLAV.GM2:F1 *	D<>F
STEME.GM2:F1 ***	A<>C A<>E B<>C B<>E B<>F C<>D D<>E D<>F
STEME.GM2:F1 **	A<>D A<>F
VERSS.GM2:F1 ***	A<>E E<>F
VERSS.GM2:F1 **	A<>C
VERSS.GM2:F1 *	A<>B A<>D B<>F C<>F D<>E D<>F
WEADR.GM2:F1 *	A<>F
WEADT.GM2:F1 ***	A<>C A<>E A<>F B<>C B<>E B<>F C<>D C<>E D<>E D<>F E<>F
WEADT.GM2:F1 **	A<>B
WEADT.GM2:F1 *	A<>D C<>F



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvet, höst och vår

ADB-NR: 05B140

LÅN-FNR: U-112-2011

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N

P

K

73

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2011-10-26

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 11 (4 cm)

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T :

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-22

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat [Regioner]

B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]

C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]

D. (15 g Lexus + 0.1 l vätmedel) 1) [DuPont]

E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]

F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel) 2) [Regioner]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 09-08	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100 05-23	Strå st vid skörd 09-08	Ogräs före komst grad 09-08
6940	100	1.6	19.0	804	2.29	13.0	70.4	31.4	16.2	0	81	98
6830	98	1.1	18.6	809	2.13	12.1	71.6	29.2	15.0	0	83	55
7040	101	1.3	18.3	809	2.17	12.4	71.3	30.0	14.9	0	89	19
6480	93	1.2	18.6	805	2.02	11.5	72.1	27.2	14.9	0	94	43
6840	99	1.3	18.3	810	2.14	12.2	71.5	29.5	14.8	0	85	10
6820	98	1.4	18.4	816	2.09	11.9	71.9	28.5	15.0	0	83	43
6830											86	
6.8											16.6	
24											24	
.6510											.8050	
700											21	

ANM: