

RESULTATBLANKETT, OGRÅS 2013
 Inst för växtproduktionssekologi, ogräsreglering
 PLAN: L5-8010-2013 Örtogräsbekämpning i hösträps.
 ADB-NR: 05B181 LÄN-FNR: E-114-2012 JBR.OMR: 12b
 FÖRSÖKSVÄRD: Mats Wiklund
 ADRESS: Räfsjö säteri, Vadstena

SIDA 1

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

SORT: Festivo
SÄTT DEN: 2012-08-17 KG/HA: 3.5
FÖRFRUKT: Korn
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2012-08-12
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2012-08-15
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.5

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2012-09-01	200	54		
NPK 22-6-6	2013-04-04	450	97	27	26
NS 27-4 (Axan)	2013-05-03	225	61		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
5.0 kg Sluxx	2012-08-19	2012-08-20	-
6.0 kg Sluxx	2012-09-20	2012-09-04	DC 10
0.3 Biscaya + 2.5 Raps Super	2013-05-10	2012-09-12	DC 12
0.5 Acanto + 0.5 Sportak	2013-05-31	2012-09-19	DC 13
0.25 Mavrik	2013-05-31	2012-05-03	DC 41
R E S U L T A T:	UTSKRIFTSDATUM: 2013-10-04	2012-05-07	DC 41

UTSKRIFTSDATUM: 2013-10-04


F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]	0.0	0.0	0			29.0	100	100	28.9	100
B. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	0.5	0.4	67	0.3	100	2.3	8	100	1.5	5
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.9	0.3	67	0.5	136	0.0	0	0		
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]	0.2	0.2	67	0.2	61	2.5	9	100	1.7	6
E. (16 g Salsa + 1.0 l Butisan Top) 3) [DuPont]	0.6	0.0	33	0.1	38	4.4	15	100	3.5	12
F. 1.0 l Butisan Top 3) + (16 g Salsa + 0.2 l vätmiddel) 4) [DuPont]	1.3	0.3	67	0.4	108	1.8	6	100	1.7	6
G. 1.0 l Butisan Top 3) + 25 g Salsa 5) [DuPont]	0.2	0.0	33	0.1	29	13.9	48	100	12.5	43
H. 1.0 l Butisan Top 3) + (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]	0.1	0.1	33	0.4	115	8.6	30	100	8.0	28
I. 1.5 l Butisan Top 3) + (165 g Matrigon 72 SG + 0.5 l Renol) 6) [Dow]	0.2	0.1	33	0.4	115	15.3	53	100	15.2	53
J. (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]			0					0		
K. 25 g Salsa 5) [DuPont]			0					0		
1) Senast 3 dygn efter sådd										
2) Vid grödans hjärtbladsstadium										
3) Vid grödans stadium DC 10-12										
4) Vid grödans stadium DC 12-13 (minst 2 örtblad)										
5) Vid gröd stadium DC 41 på våren när tillväxten börjat och lufttemp över +8°C										
6) På våren med lufttemp över +12°C och senast vid grödans stadium DC 55										
STDEV%					130.0				73.6	
PROB F1					.9523				.0005	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block III kasserat, ojämnt p.g.a. sniglar.

OBS! Viol får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. ingen förekomst i led A.



ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

PH-VÄRDE: 6.5

NS 27-4 (Axan)

2013-05-03

225

61

RESULTS:

2013-05-31

2012-05-03

DC 41

DC 41

6) På våren med lufttemp över +12°C och senast vid grödans stadium DC 55

PROB F1

Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv	Övr 1-år örtogräs		Samt 1år örtogräs		Stat: Frekv	Samt 1år örtogräs		
st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	% av block	WEADR	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	% av block	WEADT	Rel tal	
10-03		10-03			geom.		10-03			geom.		
0.0	100	0.1	100	33	0.3	100	29.1	100	100	29.0	100	
0.0	0	0.0	0	0			2.7	9	100	2.3	8	
0.1	433	0.0	40	33	0.1	40	0.4	1	67	0.6	2	
0.0	0	0.0	0	0			2.7	9	100	2.4	8	
0.0	100	0.0	30	33	0.1	30	4.5	15	100	3.7	13	
0.1	300	0.1	50	33	0.2	50	2.1	7	100	2.0	7	
0.1	333	0.0	40	33	0.1	40	14.0	48	100	12.7	44	
0.4	1333	0.1	80	33	0.3	80	8.8	30	100	8.2	28	
0.1	267	0.1	80	33	0.3	80	15.6	53	100	15.4	53	
				0					0			
				0					0			
					0					52.6		
										.0001		

OBS! Viol får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2013
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8010-2013 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B181 LÅN-FNR: E-114-2012 JBR.OMR: 12b

SIDA 3

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Wiklund
ADRESS: Räfsjö säteri, Vadstena

SORT: Festivo

SÅTT DEN: 2012-08-17 KG/HA: 3.5

FÖRFRUKT: Korn

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2012-08-12

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NPK 22-6-6

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2012-09-01

2013-04-04

2013-05-03

MÄNGD KG/HA

200

450

225

N P K

54

97 27 26

61

VÄXTSKYDD

5.0 kg Sluux

DATUM

2012-08-19

BEH ENL PLAN

2012-08-20

GRÖDANS UTV.STADIUM

-

STEME0GM2:F1 *** A<>B A<>D A<>F
STEME0GM2:F1 ** A<>E B<>G B<>I D<>G D<>I F<>G F<>I
STEME0GM2:F1 * A<>H B<>H D<>H E<>G E<>I F<>H
WEADT0GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F B<>G B<>I C<>G C<>H C<>I D<>I F<>G F<>I
WEADT0GM2:F1 ** A<>H B<>C B<>H C<>D C<>E D<>G D<>H E<>I F<>H
WEADT0GM2:F1 * C<>F E<>G

RESULTATBLANKETT, OGRÅS 2013
 Inst för växtproduktionssekologi, ogräsreglering
 PLAN: L5-8010-2013 Örtogräsbekämpning i höstraps.
 ADB-NR: 05B181 LÄN-FNR: E-114-2012 JBR.OMR: 12b
 FÖRSÖKSVÄRD: Mats Wiklund
 ADRESS: Räfsjö säteri, Vadstena

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Hösträps

SORT: Festivo
SÄTT DEN: 2012-08-17 KG/HA: 3.5
FÖRFRUKT: Korn
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2012-08-12
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2012-08-15
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.5

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2012-09-01	200	54		
NPK 22-6-6	2013-04-04	450	97	27	26
NS 27-4 (Axan)	2013-05-03	225	61		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
5.0 kg Sluxx	2012-08-19	2012-08-20	-
6.0 kg Sluxx	2012-09-20	2012-09-04	DC 10
0.3 Biscaya + 2.5 Raps Super	2013-05-10	2012-09-12	DC 12
0.5 Acanto + 0.5 Sportak	2013-05-31	2012-09-19	DC 13
0.25 Mavrik	2013-05-31	2012-05-03	DC 41
R E S U L T A T:	UTSKRIFTSDATUM: 2013-10-04	2012-05-07	DC 41

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]	4.0	100	136.0	100	67	182.1	100	46.7	100	682.7	100
B. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			5.3	11	46.7	7
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
E. (16 g Salsa + 1.0 l Butisan Top) 3) [DuPont]	1.3	33	6.7	5	33	20.0	11	8.0	17	26.7	4
F. 1.0 l Butisan Top 3) + (16 g Salsa + 0.2 l vätmiddel) 4) [DuPont]	1.3	33	101.3	75	33	304.0	167	5.3	11	25.3	4
G. 1.0 l Butisan Top 3) + 25 g Salsa 5) [DuPont]	1.3	33	8.0	6	33	24.0	13	12.0	26	85.3	13
H. 1.0 l Butisan Top 3) + (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]	0.0	0	0.0	0	0			12.0	26	64.0	9
I. 1.5 l Butisan Top 3) + (165 g Matrigon 72 SG + 0.5 l Renol) 6) [Dow]	2.7	67	21.3	16	33	64.0	35	6.7	14	18.7	3
J. (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]	1.3	33	34.7	25	33	104.0	57	17.3	37	108.0	16
K. 25 g Salsa 5) [DuPont]	1.3	33	1.3	1	33	4.0	2	21.3	46	372.0	54

- 1) Senast 3 dygn efter sådd
- 2) Vid grödans hjärtbladsstadium
- 3) Vid grödans stadium DC 10-12
- 4) Vid grödans stadium DC 12-13 (minst 2 örtblad)
- 5) Vid gröd stadium DC 41 på våren när tillväxten börjat och lufttemp över +8°C
- 6) På våren med lufttemp över +12°C och senast vid grödans stadium DC 55

STDEV%

PROB F1

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block III kasserat, ojämnt p.g.a. sniglar.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av svinmålla, lomme, trampört, dân, revormstörel.

OBS! Baldersbrå, snärjmåra och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2013
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8010-2013 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B181 LÅN-FNR: E-114-2012 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Mats Wiklund
ADRESS: Räfsjö säteri, Vadstena

SIDA 2
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

SORT: Festivo

SÅTT DEN: 2012-08-17 KG/HA: 3.5

FÖRFRUKT: Korn

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2012-08-12

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2012-08-15

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.5

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2012-09-01	200	54		
NPK 22-6-6	2013-04-04	450	97	27	26
NS 27-4 (Axan)	2013-05-03	225	61		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
5.0 kg SluXX	2012-08-19	2012-08-20	-
6.0 kg SluXX	2012-09-20	2012-09-04	DC 10
0.3 Biscaya + 2.5 Raps Super	2013-05-10	2012-09-12	DC 12
0.5 Acanto + 0.5 Sportak	2013-05-31	2012-09-19	DC 13
0.25 Mavrik	2013-05-31	2012-05-03	DC 41
RESULTAT:	UTSKRIFTS DATUM: 2013-10-04	2012-05-07	DC 41

FÖRSÖKSLED:

	Stat: Frekv % av block	Förgät- migej MYOSS g/m2 geom.	Rel tal	Snärj- måra st/m2 06-24	Rel tal	Snärj- måra fältv g/m2 06-24	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Snärj- måra GALAP g/m2 geom.	Rel tal	Viol st/m2 06-24
A. Obehandlat [Regioner]	100	447.6	100	9.3	100	50.7	100	67	76.0	100	142.7
B. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	0			0.0	0	0.0	0	0			177.3
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	33	140.0	31	2.7	29	8.0	16	67	8.9	12	140.0
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]	0			1.3	14	2.7	5	33	8.0	11	110.7
E. (16 g Salsa + 1.0 l Butisan Top) 3) [DuPont]	67	39.8	9	12.0	129	78.7	155	67	51.8	68	150.7
F. 1.0 l Butisan Top 3) + (16 g Salsa + 0.2 l vätnedel) 4) [DuPont]	100	23.0	5	1.3	14	1.3	3	33	4.0	5	152.0
G. 1.0 l Butisan Top 3) + 25 g Salsa 5) [DuPont]	67	99.9	22	0.0	0	0.0	0	0			161.3
H. 1.0 l Butisan Top 3) + (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]	67	27.4	6	1.3	14	13.3	26	33	40.0	53	89.3
I. 1.5 l Butisan Top 3) + (165 g Matrigon 72 SG + 0.5 l Renol) 6) [Dow]	67	19.6	4	0.0	0	0.0	0	0			138.7
J. (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]	100	101.3	23	5.3	57	14.7	29	67	12.6	17	93.3
K. 25 g Salsa 5) [DuPont]	100	168.2	38	4.0	43	18.7	37	67	14.4	19	102.7

- 1) Senast 3 dygn efter sådd
- 2) Vid grödans hjärtbladsstadium
- 3) Vid grödans stadium DC 10-12
- 4) Vid grödans stadium DC 12-13 (minst 2 örtblad)
- 5) Vid gröd stadium DC 41 på våren när tillväxten börjat och lufttemp över +8°C
- 6) På våren med lufttemp över +12°C och senast vid grödans stadium DC 55

STDEV%

PROB F1

136.9

.2434

151.8

.6814

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block III kasserat, ojämnt p.g.a. sniglar.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av svinmålla, lomme, trampört, dån, revormstörel.

OBS! Baldersbrå, snärjmåra och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2013
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8010-2013 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B181 LÅN-FNR: E-114-2012 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Mats Wiklund
ADRESS: Räfsjö säteri, Vadstena

SIDA 3
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K				
		NS 27-4 (Axan)	2012-09-01	200	54						
		NPK 22-6-6	2013-04-04	450	97	27	26				
		NS 27-4 (Axan)	2013-05-03	225	61						
SORT: Festivo											
SÅTT DEN: 2012-08-17 KG/HA: 3.5											
FÖRFRUKT: Korn		VÄXTSKYDD	DATUM		BEH	ENL	PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM			
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2012-08-12		5.0 kg Sluxx	2012-08-19		2012-08-20			-			
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2012-08-15		6.0 kg Sluxx	2012-09-20		2012-09-04			DC 10			
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA		0.3 Biscaya + 2.5 Raps Super	2013-05-10		2012-09-12			DC 12			
PH-VÄRDE: 6.5		0.5 Acanto + 0.5 Sportak	2013-05-31		2012-09-19			DC 13			
		0.25 Mavrik	2013-05-31		2012-05-03			DC 41			
R E S U L T A T:			UTSKRIFTSDATUM: 2013-10-04		2012-05-07			DC 41			
		Rel	Viol	Stat:	Viol	Rel	Våtarv	Rel	Våtarv	Rel	Stat:
		tal	fältv	Frekv	g/m2	tal	st/m2	tal	fältv	tal	Frekv
			06-24	% av	geom.		06-24		06-24		% av
F Ö R S Ö K S L E D:				block							block
A. Obehandlat [Regioner]		100	697.3	100	100	696.0	100	37.3	100	145.3	100
B. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]		124	697.3	100	100	661.0	95	132.0	354	264.0	182
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]		98	662.7	95	100	403.1	58	2.7	7	2.7	2
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]		78	382.7	55	100	295.5	42	2.7	7	38.7	27
E. (16 g Salsa + 1.0 l Butisan Top) 3) [DuPont]		106	536.0	77	100	346.8	50	1.3	4	1.3	1
F. 1.0 l Butisan Top 3) + (16 g Salsa + 0.2 l vätnedel) 4) [DuPont]		107	542.7	78	100	455.5	65	17.3	46	66.7	46
G. 1.0 l Butisan Top 3) + 25 g Salsa 5) [DuPont]		113	681.3	98	100	592.8	85	14.7	39	40.0	28
H. 1.0 l Butisan Top 3) + (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]		63	138.7	20	100	123.2	18	6.7	18	13.3	9
I. 1.5 l Butisan Top 3) + (165 g Matrigon 72 SG + 0.5 l Renol) 6) [Dow]		97	514.7	74	100	452.7	65	2.7	7	1.3	1
J. (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]		65	198.7	28	100	172.4	25	48.0	129	69.3	48
K. 25 g Salsa 5) [DuPont]		72	502.7	72	100	486.3	70	32.0	86	182.7	126
1) Senast 3 dygn efter sådd											
2) Vid grödans hjärtbladsstadium											
3) Vid grödans stadium DC 10-12											
4) Vid grödans stadium DC 12-13 (minst 2 örtblad)											
5) Vid gröd stadium DC 41 på våren när tillväxten börjat och lufttemp över +8°C											
6) På våren med lufttemp över +12°C och senast vid grödans stadium DC 55											
STDEV%						79.5					
PROB F1						.2415					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Block III kasserat, ojämnt p.g.a. sniglar.
Övriga ettåriga örtogräs bestod av svinmålla, lomme, trampört, dân, revormstörel.
OBS! Baldersbrå, snärjmåra och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2013
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8010-2013 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B181 LÅN-FNR: E-114-2012 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Mats Wiklund
ADRESS: Räfsjö säteri, Vadstena

SIDA 4
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

		GÖDSLING			DATUM	MÄNGD KG/HA		N		P	K
		NS 27-4 (Axan)			2012-09-01	200		54			
		NPK 22-6-6			2013-04-04	450		97		27	26
		NS 27-4 (Axan)			2013-05-03	225		61			
SORT: Festivo		VÄXTSKYDD			DATUM			BEH ENL PLAN		GRÖDANS UTV.STADIUM	
SÅTT DEN: 2012-08-17 KG/HA: 3.5		5.0 kg SluXX			2012-08-19			2012-08-20		-	
FÖRFRUKT: Korn		6.0 kg SluXX			2012-09-20			2012-09-04		DC 10	
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2012-08-12		0.3 Biscaya + 2.5 Raps Super			2013-05-10			2012-09-12		DC 12	
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2012-08-15		0.5 Acanto + 0.5 Sportak			2013-05-31			2012-09-19		DC 13	
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA		0.25 Mavrik			2013-05-31			2012-05-03		DC 41	
PH-VÄRDE: 6.5		R E S U L T A T:			UTSKRIFTSDATUM: 2013-10-04		2012-05-07		DC 41		
			Våtarv		Åker- binda		Åker- binda		Stat: Frekv	Åker- binda	Övr 1-år örtogräs
			STEME	Rel		Rel	fältv	Rel	% av	POLCO	Rel
			g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	block	g/m2	st/m2
			geom.		06-24		06-24			geom.	06-24
F Ö R S Ö K S L E D:											
A. Obehandlat [Regioner]			139.6	100	6.7	100	24.0	100	67	35.8	100
B. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]			792.0	567	9.3	140	5.3	22	100	5.0	14
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]			8.0	6	1.3	20	1.3	6	33	4.0	11
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]			116.0	83	5.3	80	2.7	11	67	4.0	11
E. (16 g Salsa + 1.0 l Butisan Top) 3) [DuPont]			4.0	3	6.7	100	4.0	17	67	5.7	16
F. 1.0 l Butisan Top 3) + (16 g Salsa + 0.2 l vätnedel) 4) [DuPont]			22.6	16	1.3	20	2.7	11	33	8.0	22
G. 1.0 l Butisan Top 3) + 25 g Salsa 5) [DuPont]			40.8	29	5.3	80	5.3	22	67	6.9	19
H. 1.0 l Butisan Top 3) + (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]			40.0	29	4.0	60	2.7	11	33	8.0	22
I. 1.5 l Butisan Top 3) + (165 g Matrigon 72 SG + 0.5 l Renol) 6) [Dow]			4.0	3	0.0	0	0.0	0	0		
J. (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]			96.0	69	0.0	0	0.0	0	0		
K. 25 g Salsa 5) [DuPont]			124.0	89	6.7	100	10.7	44	67	13.9	39
1) Senast 3 dygn efter sådd											
2) Vid grödans hjärtbladsstadium											
3) Vid grödans stadium DC 10-12											
4) Vid grödans stadium DC 12-13 (minst 2 örtblad)											
5) Vid gröd stadium DC 41 på våren när tillväxten börjat och lufttemp över +8°C											
6) På våren med lufttemp över +12°C och senast vid grödans stadium DC 55											
STDEV%			124.9							50.6	
PROB F1			.1509							.0531	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Block III kasserat, ojämnt p.g.a. sniglar.
Övriga ettåriga örtogräs bestod av svinmålla, lomme, trampört, dån, revormstörel.
OBS! Baldersbrå, snärjmåra och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2013
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8010-2013 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B181 LÅN-FNR: E-114-2012 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Mats Wiklund
ADRESS: Räfsjö säteri, Vadstena

SIDA 5
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

SORT: Festivo

SÅTT DEN: 2012-08-17 KG/HA: 3.5

FÖRFRUKT: Korn

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2012-08-12

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2012-08-15

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.5

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2012-09-01	200	54		
NPK 22-6-6	2013-04-04	450	97	27	26
NS 27-4 (Axan)	2013-05-03	225	61		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
5.0 kg SluXX	2012-08-19	2012-08-20	-
6.0 kg SluXX	2012-09-20	2012-09-04	DC 10
0.3 Biscaya + 2.5 Raps Super	2013-05-10	2012-09-12	DC 12
0.5 Acanto + 0.5 Sportak	2013-05-31	2012-09-19	DC 13
0.25 Mavrik	2013-05-31	2012-05-03	DC 41
R E S U L T A T:	UTSKRIFTSDATUM: 2013-10-04	2012-05-07	DC 41

F Ö R S Ö K S L E D:

	Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs
	fältv g/m2	Rel tal		WEADR g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		WEADT g/m2
	06-24			geom.		06-24		06-24			geom.
A. Obehandlat [Regioner]	57.3	100	100	30.4	100	264.0	100	1793.3	100	100	1707.7
B. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	6.7	12	100	5.8	19	326.7	124	973.3	54	100	816.5
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASf]	25.3	44	100	14.2	47	170.7	65	746.7	42	100	475.4
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASf]	38.7	67	100	35.0	115	142.7	54	465.3	26	100	362.6
E. (16 g Salsa + 1.0 l Butisan Top) 3) [DuPont]	14.7	26	67	19.6	64	189.3	72	668.0	37	100	466.0
F. 1.0 l Butisan Top 3) + (16 g Salsa + 0.2 l vätnedel) 4) [DuPont]	14.7	26	100	13.7	45	194.7	74	754.7	42	100	589.9
G. 1.0 l Butisan Top 3) + 25 g Salsa 5) [DuPont]	24.0	42	67	35.8	118	205.3	78	844.0	47	100	752.3
H. 1.0 l Butisan Top 3) + (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]	18.7	33	67	14.4	47	133.3	51	250.7	14	100	242.0
I. 1.5 l Butisan Top 3) + (165 g Matrigon 72 SG + 0.5 l Renol) 6) [Dow]	45.3	79	100	17.9	59	165.3	63	601.3	34	100	544.0
J. (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]	30.7	53	100	19.7	65	184.0	70	456.0	25	100	425.7
K. 25 g Salsa 5) [DuPont]	8.0	14	33	24.0	79	177.3	67	1096.0	61	100	1093.8
1) Senast 3 dygn efter sådd											
2) Vid grödans hjärtbladsstadium											
3) Vid grödans stadium DC 10-12											
4) Vid grödans stadium DC 12-13 (minst 2 örtblad)											
5) Vid gröd stadium DC 41 på våren när tillväxten börjat och lufttemp över +8°C											
6) På våren med lufttemp över +12°C och senast vid grödans stadium DC 55											
STDEV%				122.2							76.7
PROB F1				.8609							.2092

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block III kasserat, ojämnt p.g.a. sniglar.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av svinmålla, lomme, trampört, dån, revormstörel.

OBS! Baldersbrå, snärjmåra och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2013
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8010-2013 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B181 LÄN-FNR: E-114-2012 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Mats Wiklund
ADRESS: Räfsjö säteri, Vadstena

SIDA 6
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

SORT: Festivo

SÅTT DEN: 2012-08-17 KG/HA: 3.5

FÖRFRUKT: Korn

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2012-08-12

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2012-08-15

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.5

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2012-09-01	200	54		
NPK 22-6-6	2013-04-04	450	97	27	26
NS 27-4 (Axan)	2013-05-03	225	61		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
5.0 kg Sluxx	2012-08-19	2012-08-20	-
6.0 kg Sluxx	2012-09-20	2012-09-04	DC 10
0.3 Biscaya + 2.5 Raps Super	2013-05-10	2012-09-12	DC 12
0.5 Acanto + 0.5 Sportak	2013-05-31	2012-09-19	DC 13
0.25 Mavrik	2013-05-31	2012-05-03	DC 41
R E S U L T A T:	UTSKRIFTSDATUM: 2013-10-04	2012-05-07	DC 41

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]
E. (16 g Salsa + 1.0 l Butisan Top) 3) [DuPont]
F. 1.0 l Butisan Top 3) + (16 g Salsa + 0.2 l vätnedel) 4) [DuPont]
G. 1.0 l Butisan Top 3) + 25 g Salsa 5) [DuPont]
H. 1.0 l Butisan Top 3) + (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]
I. 1.5 l Butisan Top 3) + (165 g Matrigon 72 SG + 0.5 l Renol) 6) [Dow]
J. (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]
K. 25 g Salsa 5) [DuPont]

- 1) Senast 3 dygn efter sådd
- 2) Vid grödans hjärtbladsstadium
- 3) Vid grödans stadium DC 10-12
- 4) Vid grödans stadium DC 12-13 (minst 2 örtblad)
- 5) Vid gröd stadium DC 41 på våren när tillväxten börjat och lufttemp över +8°C
- 6) På våren med lufttemp över +12°C och senast vid grödans stadium DC 55

STDEV%
PROB F1

Rel tal											
100											
48											
28											
21											
27											
35											
44											
14											
32											
25											
64											

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block III kasserat, ojämnt p.g.a. sniglar.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av svinmålla, lomme, trampört, dån, revormstörel.

OBS! Baldersbrå, snärjmåra och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2013
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8010-2013 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B181 LÅN-FNR: E-114-2012 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Mats Wiklund
ADRESS: Räfsjö säteri, Vadstena

SIDA 7
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027
GRÖDA: Höstraps

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4 (Axan)	2012-09-01	200	54		
	NPK 22-6-6	2013-04-04	450	97	27	26
	NS 27-4 (Axan)	2013-05-03	225	61		

SORT: Festivo
SÅTT DEN: 2012-08-17 KG/HA: 3.5
FÖRFRUKT: Korn
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2012-08-12

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
5.0 kg Sluxx	2012-08-19	2012-08-20	-

MYOSS.GM2:F1 * A<>F A<>H A<>I
POLCO.GM2:F1 ** A<>B A<>C A<>D A<>E
POLCO.GM2:F1 * A<>F A<>G A<>H D<>K
STEME.GM2:F1 * A<>E A<>I B<>C B<>E B<>F B<>I E<>K I<>K
VIOSS.GM2:F1 * A<>H A<>J B<>H G<>H H<>K
WEADT.GM2:F1 ** A<>H
WEADT.GM2:F1 * A<>D A<>J H<>K



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2013
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8010-2013 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B181 LÅN-FNR: E-114-2012 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Mats Wiklund
ADRESS: Räfsjö säteri, Vadstena

SIDA 1
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K					
		NS 27-4 (Axan)	2012-09-01	200	54							
		NPK 22-6-6	2013-04-04	450	97	27	26					
		NS 27-4 (Axan)	2013-05-03	225	61							
SORT: Festivo												
SÅTT DEN: 2012-08-17 KG/HA: 3.5												
FÖRFRUKT: Korn		VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN			GRÖDANS UTV.STADIUM					
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2012-08-12		5.0 kg Sluxx	2012-08-19	2012-08-20			-					
PLÖJN EFTER SKÖRD: 2012-08-15		6.0 kg Sluxx	2012-09-20	2012-09-04			DC 10					
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA		0.3 Biscaya + 2.5 Raps Super	2013-05-10	2012-09-12			DC 12					
PH-VÄRDE: 6.5		0.5 Acanto + 0.5 Sportak	2013-05-31	2012-09-19			DC 13					
		0.25 Mavrik	2013-05-31	2012-05-03			DC 41					
R E S U L T A T:		UTSKRIFTSDATUM: 2013-10-04			2012-05-07			DC 41				
		Skörd renv kg/ha 08-16	Rel tal	Råfett skörd kg/ha 08-16	Rel tal	Råfett %	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Stjälk styrka vid skörd 08-16	Ogräs före komst grad 08-16		
F Ö R S Ö K S L E D:												
A. Obehandlat [Regioner]		3840	100	1684	100	48.2	3.4	12.0	100	78		
B. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]		3890	101	1703	101	48.0	1.7	11.4	100	40		
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]		4330	113	1927	114	48.9	1.5	11.0	100	43		
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]		4040	105	1811	108	49.2	2.7	11.1	100	52		
E. (16 g Salsa + 1.0 l Butisan Top) 3) [DuPont]		4500	117	2001	119	48.9	1.0	10.2	100	45		
F. 1.0 l Butisan Top 3) + (16 g Salsa + 0.2 l vätnedel) 4) [DuPont]		4200	109	1852	110	48.4	2.2	10.8	100	25		
G. 1.0 l Butisan Top 3) + 25 g Salsa 5) [DuPont]		3800	99	1687	100	48.8	1.8	11.5	100	48		
H. 1.0 l Butisan Top 3) + (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]		3880	101	1699	101	48.1	1.9	11.9	100	23		
I. 1.5 l Butisan Top 3) + (165 g Matrigon 72 SG + 0.5 l Renol) 6) [Dow]		3890	101	1711	102	48.3	1.9	11.9	100	18		
J. (17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N) 5) [DuPont]		3640	95	1567	93	47.3	2.9	13.9	100	40		
K. 25 g Salsa 5) [DuPont]		3790	99	1680	100	48.7	3.5	11.5	100	60		
1) Senast 3 dygn efter sådd												
2) Vid grödans hjärtbladsstadium												
3) Vid grödans stadium DC 10-12												
4) Vid grödans stadium DC 12-13 (minst 2 örtblad)												
5) Vid gröd stadium DC 41 på våren när tillväxten börjat och lufttemp över +8°C												
6) På våren med lufttemp över +12°C och senast vid grödans stadium DC 55												
-X-		3980		1756					100			
CV%		7.3		7.5					0.3			
OBS		33		33					33			
PROB F1		.0492		.0243					.4755			
LSD F1		500		224					0			

ANM: Block III kasserat, ojämnt p.g.a. sniglar.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2013
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8010-2013 Örtogräsbekämpning i höstraps.
ADB-NR: 05B181 LÅN-FNR: E-114-2012 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Wiklund
ADRESS: Räfsjö säteri, Vadstena

SORT: Festivo

SÅTT DEN: 2012-08-17 KG/HA: 3.5

FÖRFRUKT: Korn

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2012-08-12

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NPK 22-6-6

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2012-09-01

2013-04-04

2013-05-03

MÄNGD KG/HA

200

450

225

N P K

54

97 27 26

61

VÄXTSKYDD

5.0 kg Sluux

DATUM

2012-08-19

BEH ENL PLAN

2012-08-20

GRÖDANS UTV.STADIUM

-

Y.M09:F1 ** C<>J E<>G E<>J E<>K
Y.M09:F1 * A<>E B<>E C<>G C<>K E<>H E<>I F<>J
Y-FAT:F1 *** E<>J
Y-FAT:F1 ** A<>E C<>J E<>G E<>K
Y-FAT:F1 * A<>C B<>C B<>E C<>G C<>H C<>K D<>J E<>H E<>I F<>J

Jordanalys:

ADB-nr: 05B181
Serienr: L5-8010-2013
Län-fnr: E-114-2012

Jordart: mmh ML

Mullhalt %: 5.3

Lerhalt %: 27

Mjåla %: 40.5

Sand+grovmå %: 27.2

pH: 6.5

P-AL (mg/100g): 3.8

K-AL (mg/100g): 5.9

Mg-AL (mg/100g): 7.7

K/Mg (kvot): 0.8

Ca-AL (mg/100g): 297

Al-AL (mg/100g): 16.9

Fe-AL (mg/100g): 16.4

K-HCl (mg/100g): 111

P-HCl (mg/100g): 45

Cu-HCl (mg/kg): 11.2

KI: II

KI: II

KI: 3

KI: 3