



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Län-fnr: LA-19-2010

Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2011-04-11 428

PK 7-25

30 107

2011-04-11 259

NS 27-4 (Axan) (S1)

70

2011-04-11 296

NS 27-4 (Axan) (S2)

80

Sådatum : 2010-04-23

2011-06-01 222

NS 27-4 (Axan) (S1)

60

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insädd

2011-06-01 259

NS 27-4 (Axan) (S2)

70

För-förfrukt: Sockerbetor

2011-07-04 148

NS 27-4 (Axan) (S1)

40

Jordart: mmh mo LL

2011-07-12 185

NS 27-4 (Axan) (S2)

50

ph-värde: 5.0

2011-08-08 111

NS 27-4 (Axan) (S1)

30

Växtskydd

Försöksdesign: SP

F Ö R S Ö K S L E D:

1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong

2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong

A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver

1. 4 ggr per säsong (S1)

2. 3 ggr per säsong (S2)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Ts kg/ha Sk 1 S1 05-25	Ts kg/ha Sk 1 S2 05-31	Ts kg/ha Sk 2 S1 06-29	Ts kg/ha Sk 2 S2 07-11	Ts kg/ha Sk 3 S1 08-03	Ts kg/ha Sk 3 S2 09-07	Ts kg/ha Sk 4 S1 09-07	Ts kg/ha Sista skörd 09-07	Summa ts kg/ha
4390		3730		2800		1680	1680	12600
5200		4420		2750		1580	1580	13960
4420		3470		2810		1790	1790	12490
	5560		6170		4440		4440	16170
	6310		6560		3840		3840	16710
	5440		5830		4490		4490	15760
4390	5560	3730	6170	2800	4440	1680	3060	14380
5200	6310	4420	6560	2750	3840	1580	2710	15330
4420	5440	3470	5830	2810	4490	1790	3140	14120
4670		3870		2790		1690	1690	13010
	5770		6190		4260		4260	16210
4670	5770	3870	6190	2790	4260	1690	2970	14610
4.2	4.4	3.5	4.4	5	5.3	5.7	5.8	2.6
12	12	12	12	12	12	12	24	24
							.0006	.0002
.0017	.0056	.0001	.0248	.8037	.0115	.0570	.0007	.0001
							.0273	.1359
							540	490
340	440	230	470	240	390	170	190	410
340	440	230	470	240	390	170	370	590

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.

Några plantor har gått i ax i S2 09-07.

SIDA 1

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-945375

2012-05-14 13:07



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Län-fnr: LA-19-2010

Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2011-04-11 428

PK 7-25

30 107

2011-04-11 259

NS 27-4 (Axan) (S1)

70

2011-04-11 296

NS 27-4 (Axan) (S2)

80

Sådatum : 2010-04-23

2011-06-01 222

NS 27-4 (Axan) (S1)

60

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insådd

2011-06-01 259

NS 27-4 (Axan) (S2)

70

För-förfrukt: Sockerbetor

2011-07-04 148

NS 27-4 (Axan) (S1)

40

Jordart: mmh mo LL

2011-07-12 185

NS 27-4 (Axan) (S2)

50

ph-värde: 5.0

2011-08-08 111

NS 27-4 (Axan) (S1)

30

Växtskydd

Försöksdesign: SP

F Ö R S Ö K S L E D:

1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong

2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong

A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver

1. 4 ggr per säsong (S1)

2. 3 ggr per säsong (S2)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Svingel % bot Sk 1 S1 05-25	Svingel % bot Sk 1 S2 06-01	Eng. rajgräs % bot Sk 1, S1 05-25	Eng. rajgräs % bot Sk 1, S2 06-01	Ogräs % bot Sk 1 S1 05-25	Ogräs % bot Sk 1 S2 06-01	Stubb % bot Sk 1 S1 05-25	Stubb % bot Sk 1 S2 06-01	Insådd baljv % fält Sk 1, S1 05-25
20		41		0.1		1		24
87				0.0		2		25
15		38		0.0		2		25
	8		62		0.1		1	
	96				0.2		1	
	8		68		0.0		2	
20	8	41	62	0.1	0.1	1	1	24
87	96			0.0	0.2	2	1	25
15	8	38	68	0.0	0.0	2	2	25
41		40		0.0		2		25
	37		65		0.1		1	

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.

Några plantor har gått i ax i S2 09-07.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Län-fnr: LA-19-2010

Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2011-04-11 428

PK 7-25

30 107

2011-04-11 259

NS 27-4 (Axan) (S1)

70

2011-04-11 296

NS 27-4 (Axan) (S2)

80

2011-06-01 222

NS 27-4 (Axan) (S1)

60

2011-06-01 259

NS 27-4 (Axan) (S2)

70

2011-07-04 148

NS 27-4 (Axan) (S1)

40

2011-07-12 185

NS 27-4 (Axan) (S2)

50

2011-08-08 111

NS 27-4 (Axan) (S1)

30

Växtskydd

Skördeår:2011

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföransvarig: Andreas Nilsson 0708-945375

2012-05-14 13:07

Sådatum : 2010-04-23

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insädd

För-förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 5.0

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:

1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong

2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong

A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver

1. 4 ggr per säsong (S1)

2. 3 ggr per säsong (S2)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Insådd baljv % fält Sk 1,S2 05-31	Insådd baljv % fält Sk 2,S1 06-29	Insådd baljv % fält Sk 2,S2 07-11	Insådd baljv % fält Sk 3,S1 08-02	Insådd baljv % fält Sk 3,S2 09-07	Insådd baljv % fält Sk 4,S1 09-07	Insådd baljv % fält Sist sk 09-07	Insått gräs % fält Sk 1,S1 05-25	Insått gräs % fält Sk 1,S2 05-31
	24		24		48	48	75	
	19		20		46	46	74	
	25		19		40	40	74	
20		20		53		53		79
15		19		33		33		84
25		25		39		39		74
20	24	20	24	53	48	50	75	79
15	19	19	20	33	46	39	74	84
25	25	25	19	39	40	39	74	74
	23		21		45	45	74	
20		21		41		41		79

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.

Några plantor har gått i ax i S2 09-07.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Förs.v: Naturbruksgymnasiet

Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Län-fnr: LA-19-2010

Gödsling kg

Medel

N P K

2011-04-11 428 PK 7-25 30 107

2011-04-11 259 NS 27-4 (Axan) (S1) 70

2011-04-11 296 NS 27-4 (Axan) (S2) 80

2011-06-01 222 NS 27-4 (Axan) (S1) 60

2011-06-01 259 NS 27-4 (Axan) (S2) 70

2011-07-04 148 NS 27-4 (Axan) (S1) 40

2011-07-12 185 NS 27-4 (Axan) (S2) 50

2011-08-08 111 NS 27-4 (Axan) (S1) 30

Växtskydd

Sådatum : 2010-04-23

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insädd

För-förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 5.0

Försöksdesign:SP

SIDA 8

Skördeår:2011

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-945375

2012-05-14 13:07

F Ö R S Ö K S L E D:

1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong

1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong

1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong

2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong

2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong

2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong

A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver

B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver

C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver

1. 4 ggr per säsong (S1)

2. 3 ggr per säsong (S2)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Insått gräs % fält Sk 2,S1 06-29	Insått gräs % fält Sk 2,S2 07-11	Insått gräs % fält Sk 3,S1 08-02	Insått gräs % fält Sk 3,S2 09-07	Insått gräs % fält Sk 4,S1 09-07	Insått gräs % fält Sist sk 09-07	Timotej % fält Sk 1 S1 05-25	Timotej % fält Sk 1 S2 05-31	Timotej % fält Sk 2 S1 06-29
75		75		53	53	26		26
80		79		54	54	23		20
74		80		60	60	25		25
	79		48		48		30	
	80		68		68		20	
	74		61		61		25	
75	79	75	48	53	50	26	30	26
80	80	79	68	54	61	23	20	20
74	74	80	61	60	61	25	25	25
76		78		55	55	25		24
	78		59		59		25	

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.
Några plantor har gått i ax i S2 09-07.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Förs.v: Naturbruksgymnasiet

Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Gödsling kg

Medel

N P K

2011-04-11 428

2011-04-11 259

2011-04-11 296

2011-06-01 222

2011-06-01 259

2011-07-04 148

2011-07-12 185

2011-08-08 111

PK 7-25

NS 27-4 (Axan) (S1)

NS 27-4 (Axan) (S2)

NS 27-4 (Axan) (S1)

NS 27-4 (Axan) (S2)

NS 27-4 (Axan) (S1)

NS 27-4 (Axan) (S2)

NS 27-4 (Axan) (S1)

70

80

60

70

40

50

30

30 107

Sådatum : 2010-04-23

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insädd

För-förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 5.0

Växtskydd

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-945375

2012-05-14 13:07

Skördeår:2011

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:

1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong

1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong

1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong

2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong

2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong

2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong

A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver

B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver

C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver

1. 4 ggr per säsong (S1)

2. 3 ggr per säsong (S2)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Timotej

Timotej

Svingel

Svingel

Svingel

Svingel

Svingel

Eng. rajgräs

Eng. rajgräs

% fält

% fält

% fält

% fält

% fält

% fält

% fält

rajgräs

rajgräs

Sk 2

Sk 3

Sk 1

Sk 1

Sk 2

Sk 2

Sk 3

% fält

% fält

S2

S1

S1

S2

S1

S2

S1

Sk 1, S2

Sk 2, S1

07-11

08-02

05-25

05-31

06-29

07-11

08-02

05-31

06-29

28

34

34

33

15

13

39

50

50

10

29

34

34

35

15

30

34

34

15

20

40

50

24

25

34

34

15

30

28

34

34

34

34

33

15

15

20

13

39

40

50

50

50

24

10

25

29

34

34

34

34

35

15

15

23

36

39

39

13

25

36

39

18

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.
Några plantor har gått i ax i S2 09-07.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Län-fnr: LA-19-2010

Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2011-04-11 428

PK 7-25

30 107

2011-04-11 259

NS 27-4 (Axan) (S1)

70

2011-04-11 296

NS 27-4 (Axan) (S2)

80

Sådatum : 2010-04-23

2011-06-01 222

NS 27-4 (Axan) (S1)

60

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insådd

2011-06-01 259

NS 27-4 (Axan) (S2)

70

För-förfrukt: Sockerbetor

2011-07-04 148

NS 27-4 (Axan) (S1)

40

Jordart: mmh mo LL

2011-07-12 185

NS 27-4 (Axan) (S2)

50

ph-värde: 5.0

2011-08-08 111

NS 27-4 (Axan) (S1)

30

Växtskydd

Försöksdesign: SP

Eng. rajgräs % fält Sk 2, S2 07-11	Eng. rajgräs % fält Sk 3, S1 08-02	Ogräs % fält Sk 1 S1 05-25	Ogräs % fält Sk 1 S2 05-31	Ogräs % fält Sk 2 S1 06-29	Ogräs % fält Sk 2 S2 07-11	Ogräs % fält Sk 3 S1 08-02	Ogräs % fält Sk 3 S2 09-07	Ogräs % fält Sk 4 S1 09-07
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	15	1		1		1		0
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	17	1		1		1		0
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	16	1		1		1		0
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	15		1		1		0	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	10		1		1		0	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	15		1		1		0	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	15	15	1	1	1	1	0	0
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	10	17	1	1	1	1	0	0
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	15	16	1	1	1	1	0	0
1. 4 ggr per säsong (S1)		16	1		1		1	0
2. 3 ggr per säsong (S2)	13			1		1		0
-X-								
CV%								
OBS								
PROB F1								
PROB F2								
PROB F1*F2								
LSD F1								
LSD F2								
LSD F1*F2								

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.

Några plantor har gått i ax i S2 09-07.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Län-fnr: LA-19-2010

Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2011-04-11 428

PK 7-25

30 107

2011-04-11 259

NS 27-4 (Axan) (S1)

70

2011-04-11 296

NS 27-4 (Axan) (S2)

80

Sådatum : 2010-04-23

2011-06-01 222

NS 27-4 (Axan) (S1)

60

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insädd

2011-06-01 259

NS 27-4 (Axan) (S2)

70

För-förfrukt: Sockerbetor

2011-07-04 148

NS 27-4 (Axan) (S1)

40

Jordart: mmh mo LL

2011-07-12 185

NS 27-4 (Axan) (S2)

50

ph-värde: 5.0

2011-08-08 111

NS 27-4 (Axan) (S1)

30

Växtskydd

Försöksdesign: SP

Ogräs % fält Sista skörd 09-07	Buv Baljv. Sk 2 S1 06-29	Buv Baljv. Sk 2 S2 07-11	Buv Baljv. Sk 3 S1 08-02	Buv Baljv. Sk 3 S2 09-07	Buv Baljv. Sk 4 S1 09-07	Buv Baljv. Sista skörd 09-07	Buv Gräs Sk 1 S2 05-31	Buv Gräs Sk 3 S2 09-07
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	0	4	6		1	1		
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	0	4	6		1	1		
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	0	4	6		1	1		
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	0		6	6		6	5	1
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	0		6	6		6	5	1
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	0		6	6		6	5	1
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	0	4	6	6	1	4	5	1
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	0	4	6	6	1	4	5	1
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	0	4	6	6	1	4	5	1
1. 4 ggr per säsong (S1)	0	4	6		1	1		
2. 3 ggr per säsong (S2)	0		6	6		6	5	1
-X-								
CV%								
OBS								
PROB F1								
PROB F2								
PROB F1*F2								
LSD F1								
LSD F2								
LSD F1*F2								

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.

Några plantor har gått i ax i S2 09-07.

SIDA 11

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-945375

2012-05-14 13:07



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Län-fnr: LA-19-2010

Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2011-04-11 428

PK 7-25

30 107

2011-04-11 259

NS 27-4 (Axan) (S1)

70

2011-04-11 296

NS 27-4 (Axan) (S2)

80

Sådatum : 2010-04-23

2011-06-01 222

NS 27-4 (Axan) (S1)

60

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insådd

2011-06-01 259

NS 27-4 (Axan) (S2)

70

För-förfrukt: Sockerbetor

2011-07-04 148

NS 27-4 (Axan) (S1)

40

Jordart: mmh mo LL

2011-07-12 185

NS 27-4 (Axan) (S2)

50

ph-värde: 5.0

2011-08-08 111

NS 27-4 (Axan) (S1)

30

Växtskydd

Försöksdesign: SP

F Ö R S Ö K S L E D:

1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong

2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong

A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver

1. 4 ggr per säsong (S1)

2. 3 ggr per säsong (S2)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Buv Gräs Sk 4 S1 09-07	Buv Gräs Sista skörd 09-07	Buv Timotej Sk 2 S1 06-29	Buv Timotej Sk 2 S2 07-11	Buv Timotej Sk 3 S1 08-02	Buv Svingel Sk 2 S1 06-29	Buv Svingel Sk 2 S2 07-11	Buv Svingel Sk 3 S1 08-02	Buv Eng. rajgräs Sk 2,S1 06-29
1	1	5		5	5		5	5
1	1	5		5	5		5	5
1	1	5		5	5		5	5
	1		5			5		
	1		5			5		
	1		5			5		
1	1	5	5	5	5	5	5	5
1	1	5	5	5	5	5	5	5
1	1	5	5	5	5	5	5	5
1	1	5		5	5		5	5
	1		5			5		

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.

Några plantor har gått i ax i S2 09-07.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Län-fnr: LA-19-2010

Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2011-04-11	428	PK 7-25		30	107
2011-04-11	259	NS 27-4 (Axan) (S1)	70		
2011-04-11	296	NS 27-4 (Axan) (S2)	80		
2011-06-01	222	NS 27-4 (Axan) (S1)	60		
2011-06-01	259	NS 27-4 (Axan) (S2)	70		
2011-07-04	148	NS 27-4 (Axan) (S1)	40		
2011-07-12	185	NS 27-4 (Axan) (S2)	50		
2011-08-08	111	NS 27-4 (Axan) (S1)	30		
Växtskydd					

Sådatum : 2010-04-23

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insädd

För-förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 5.0

Försöksdesign: SP

SIDA 13

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-945375

2012-05-14 13:07

F Ö R S Ö K S L E D:

	Buv Eng. rajgräs Sk 2,S2 07-11	Buv Eng. rajgräs Sk 3,S1 08-02	Sluten het föreg höst % 10-22	Sluten het vår % 04-27	Sluten het innev höst % 10-17	Råpro- tein g/kg ts Sk 1,S1 05-25	Råpro- tein g/kg ts Sk 1,S2 06-01	Råpro- tein g/kg ts Sk 2,S1 06-29	Råpro- tein g/kg ts Sk 2,S2 07-12
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		5	100	100	100	115		128	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		5	100	100	100	107		103	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		5	100	100	100	117		127	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	5		100	100	100		113		115
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	5		100	100	100		98		92
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	5		100	100	100		106		97
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	5	5	100	100	100	115	113	128	115
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	5	5	100	100	100	107	98	103	92
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	5	5	100	100	100	117	106	127	97
1. 4 ggr per säsong (S1)		5	100	100	100	113		120	
2. 3 ggr per säsong (S2)	5		100	100	100		105		101
-X-						113	105	120	101
CV%						4.4	4.9	2.8	11.9
OBS						12	12	9	9
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2						.0790	.0231	.0013	.1625
LSD F1									
LSD F2						9	9	8	27
LSD F1*F2						9	9	8	27

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.

Några plantor har gått i ax i S2 09-07.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Län-fnr: LA-19-2010

Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2011-04-11 428

PK 7-25

30 107

2011-04-11 259

NS 27-4 (Axan) (S1)

70

2011-04-11 296

NS 27-4 (Axan) (S2)

80

Sådatum : 2010-04-23

2011-06-01 222

NS 27-4 (Axan) (S1)

60

Vallår: 1

2011-06-01 259

NS 27-4 (Axan) (S2)

70

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insådd

2011-07-04 148

NS 27-4 (Axan) (S1)

40

För-förfrukt: Sockerbetor

2011-07-12 185

NS 27-4 (Axan) (S2)

50

Jordart: mmh mo LL

2011-08-08 111

NS 27-4 (Axan) (S1)

30

ph-värde: 5.0

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 14

Skördeår:2011

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-945375

2012-05-14 13:07

F Ö R S Ö K S L E D:

1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong

2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong

A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver

1. 4 ggr per säsong (S1)

2. 3 ggr per säsong (S2)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Råpro- tein g/kg ts Sk 3,S1 08-03	Råpro- tein g/kg ts Sk 3,S2 09-07	Råpro- tein g/kg ts Sk 4,S1 09-07	Råpro- tein g/kg ts Sist sk 09-07	Aska g/kg ts Sk 1 S1 05-25	Aska g/kg ts Sk 1 S2 06-01	Aska g/kg ts Sk 2 S1 06-29	Aska g/kg ts Sk 2 S2 07-12	Aska g/kg ts Sk 3 S1 08-03
163		174	174	82		101		112
136		165	165	89		99		119
153		176	176	82		102		121
	149		149		85		104	
	152		152		86		103	
	146		146		83		99	
163	149	174	162	82	85	101	104	112
136	152	165	159	89	86	99	103	119
153	146	176	161	82	83	102	99	121
150		172	172	84		101		117
	149		149		84		102	
150	149	172	161	84	84	101	102	117
6.9	3.2	4.6	4.5	2.4	3.4	2.4	4.6	3.8
9	9	9	18	12	12	9	9	9
.0765	.4188	.3053	.7417 .1875	.0031	.3222	.3821	.4050	.1276
24	11	18	10	3	5	5	11	10
24	11	18	15	3	5	5	11	10

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.

Några plantor har gått i ax i S2 09-07.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Förs.v: Naturbruksgymnasiet

Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Gödsling kg

Medel

N P K

2011-04-11 428

2011-04-11 259

2011-04-11 296

2011-06-01 222

2011-06-01 259

2011-07-04 148

2011-07-12 185

2011-08-08 111

Växtskydd

PK 7-25

NS 27-4 (Axan) (S1)

NS 27-4 (Axan) (S2)

NS 27-4 (Axan) (S1)

NS 27-4 (Axan) (S2)

NS 27-4 (Axan) (S1)

NS 27-4 (Axan) (S2)

NS 27-4 (Axan) (S1)

30

70

80

60

70

40

50

30

Sådatum : 2010-04-23

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insädd

För-förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 5.0

Försöksdesign:SP

SIDA 15

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-945375

2012-05-14 13:07

Skördeår:2011

F Ö R S Ö K S L E D:	Aska g/kg ts Sk 3 S2 09-07	Aska g/kg ts Sk 4 S1 09-07	Aska g/kg ts Sista skörd 09-07	Energi MJ/kg ts Sk 1,S1 05-25	Energi MJ/kg ts Sk 1,S2 06-01	Energi MJ/kg ts Sk 2,S1 06-29	Energi MJ/kg ts Sk 2,S2 07-12	Energi MJ/kg ts NIR Sk 1,S1 05-25	Energi MJ/kg ts NIR Sk 1,S2 06-01
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		109	109	11.1		9.8		11.0	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		113	113	11.3		9.8		11.3	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver4 ggr per säsong		112	112	11.1		10.2		11.1	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	108		108		10.4		9.2		10.6
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	120		120		10.7		8.6		10.8
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver3 ggr per säsong	108		108		10.4		9.1		10.6
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	108	109	109	11.1	10.4	9.8	9.2	11.0	10.6
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	120	113	117	11.3	10.7	9.8	8.6	11.3	10.8
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	108	112	110	11.1	10.4	10.2	9.1	11.1	10.6
1. 4 ggr per säsong (S1)		112	112	11.2		10.0		11.1	
2. 3 ggr per säsong (S2)	112		112		10.5		9.0		10.7
-X-	112	112	112	11.2	10.5	10.0	9.0	11.1	10.7
CV%	2.6	2.4	2.5	1.5	1.3	5.6	2.4	0.8	0.9
OBS	9	9	18	12	12	9	9	12	12
PROB F1			.9239						
PROB F2	.0122	.2689	.0028	.3907	.0422	.6796	.0765	.0194	.0340
PROB F1*F2			.0269						
LSD F1			9						
LSD F2	7	6	4	0.3	0.2	1.3	0.5	0.2	0.2
LSD F1*F2	7	6	6	0.3	0.2	1.3	0.5	0.2	0.2

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.
Några plantor har gått i ax i S2 09-07.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Förs.v: Naturbruksgymnasiet

Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

SIDA 16

Skördeår:2011

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-945375

2012-05-14 13:07

Sådatum : 2010-04-23

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insädd

För-förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 5.0

Gödsling kg

2011-04-11 428

2011-04-11 259

2011-04-11 296

2011-06-01 222

2011-06-01 259

2011-07-04 148

2011-07-12 185

2011-08-08 111

Växtskydd

Medel

PK 7-25

NS 27-4 (Axan) (S1)

NS 27-4 (Axan) (S2)

NS 27-4 (Axan) (S1)

NS 27-4 (Axan) (S2)

NS 27-4 (Axan) (S1)

NS 27-4 (Axan) (S2)

NS 27-4 (Axan) (S1)

N

70

80

60

70

40

50

30

P

30

K

107

Försöksdesign:SP

	Energi MJ/kg ts NIR Sk 2,S1 06-29	Energi MJ/kg ts NIR Sk 2,S2 07-12	Energi MJ/kg ts NIR Sk 3,S1 08-03	MJ/kg baljv. ts Sk 3,S1 08-03	MJ/kg baljv. ts Sk 3,S2 09-07	MJ/kg baljv. ts Sk 4,S1 09-07	MJ/kg baljv. ts Sist sk 09-07	MJ/kg gräs ts Sk 3,S1 08-03	MJ/kg gräs ts Sk 3,S2 09-07
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	10.7		10.0	10.1		11.1	11.1	9.6	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	10.7		10.0	10.0		11.0	11.0	9.4	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	10.4		9.7	9.7		11.2	11.2	9.1	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		9.6			10.8		10.8		10.7
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		9.7			10.8		10.8		10.8
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		9.6			10.9		10.9		10.8
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	10.7	9.6	10.0	10.1	10.8	11.1	11.0	9.6	10.7
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	10.7	9.7	10.0	10.0	10.8	11.0	10.9	9.4	10.8
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	10.4	9.6	9.7	9.7	10.9	11.2	11.1	9.1	10.8
1. 4 ggr per säsong (S1)	10.6		9.9	9.9		11.1	11.1	9.4	
2. 3 ggr per säsong (S2)		9.6			10.8		10.8		10.8
-X-	10.6	9.6	9.9	9.9	10.8	11.1	11.0	9.4	10.8
CV%	0.9	2.3	2.2	1.2	1.9	1.5	1.8	2.1	2.9
OBS	9	9	9	9	8	9	17	9	8
PROB F1							.1595		
PROB F2							.5279		
PROB F1*F2	.0248	.9786	.3095	.0447	.8580	.4275	.8201	.0783	.8268
LSD F1							0.6		
LSD F2	0.2	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.9
LSD F1*F2	0.2	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.9

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.
Några plantor har gått i ax i S2 09-07.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Förs.v: Naturbruksgymnasiet

Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Gödsling kg

Medel

N P K

2011-04-11 428

PK 7-25

30 107

2011-04-11 259

NS 27-4 (Axan) (S1)

70

2011-04-11 296

NS 27-4 (Axan) (S2)

80

2011-06-01 222

NS 27-4 (Axan) (S1)

60

2011-06-01 259

NS 27-4 (Axan) (S2)

70

2011-07-04 148

NS 27-4 (Axan) (S1)

40

2011-07-12 185

NS 27-4 (Axan) (S2)

50

2011-08-08 111

NS 27-4 (Axan) (S1)

30

Växtskydd

SIDA 17

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-945375

2012-05-14 13:07

Skördeår:2011

Sådatum : 2010-04-23

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insädd

För-förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 5.0

Försöksdesign:SP

	MJ/kg gräs ts Sk 4, S1 09-07	MJ/kg gräs ts Sist sk 09-07	NDF g/kg ts Sk 1 S1 05-25	NDF g/kg ts Sk 1 S2 06-01	NDF g/kg ts Sk 2 S1 06-29	NDF g/kg ts Sk 2 S2 07-12	NDF g/kg ts Sk 3 S1 08-03	NDF g/kg ts Sk 3 S2 09-07	NDF g/kg ts Sk 4 S1 09-07
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	11.2	11.2	475		495		507		465
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	11.0	11.0	468		510		519		463
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	11.4	11.4	484		512		548		423
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		10.7		536		540		501	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		10.8		536		556		489	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		10.8		547		523		504	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	11.2	10.9	475	536	495	540	507	501	465
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	11.0	10.9	468	536	510	556	519	489	463
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	11.4	11.1	484	547	512	523	548	504	423
1. 4 ggr per säsong (S1)	11.2	11.2	476		505		525		450
2. 3 ggr per säsong (S2)		10.8		540		540		498	
-X-	11.2	11.0	476	540	505	540	525	498	450
CV%	2.0	2.8	2.2	3.5	3	3.6	7.9	1.4	4.4
OBS	9	17	12	12	9	9	9	9	9
PROB F1		.1428							
PROB F2	.2999	.4767	.1766	.6700	.4036	.2444	.5210	.1208	.0984
PROB F1*F2		.7073							
LSD F1		0.8							
LSD F2	0.5	0.4	18	33	34	44	94	16	44
LSD F1*F2	0.5	0.6	18	33	34	44	94	16	44

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.
Några plantor har gått i ax i S2 09-07.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITETET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Förs.v: Naturbruksgymnasiet

Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Län-fnr: LA-19-2010

Gödsling kg

Medel

N P K

2011-04-11 428 PK 7-25 30 107

2011-04-11 259 NS 27-4 (Axan) (S1) 70

2011-04-11 296 NS 27-4 (Axan) (S2) 80

2011-06-01 222 NS 27-4 (Axan) (S1) 60

2011-06-01 259 NS 27-4 (Axan) (S2) 70

2011-07-04 148 NS 27-4 (Axan) (S1) 40

2011-07-12 185 NS 27-4 (Axan) (S2) 50

2011-08-08 111 NS 27-4 (Axan) (S1) 30

Växtskydd

Sådatum : 2010-04-23

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insädd

För-förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 5.0

Försöksdesign:SP

SIDA 18

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-945375

2012-05-14 13:07

Skördeår:2011

	NDF g/kg ts Sista skörd 09-07	NDF g/kg ts NIR Sk 1,S1 05-25	NDF g/kg ts NIR Sk 1,S2 06-01	NDF g/kg ts NIR Sk 2,S1 06-29	NDF g/kg ts NIR Sk 2,S2 07-12	NDF g/kg ts NIR Sk 3,S1 08-03	iNDF g/kg NDF Sk 1,S1 05-25	iNDF g/kg NDF Sk 1,S2 06-01	iNDF g/kg NDF Sk 2,S1 06-29
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	465	492		512		496	114		108
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	463	481		529		531	91		96
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	423	477		530		530	96		99
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	501		534		559			122	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	489		541		567			104	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	504		550		536			118	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	483	492	534	512	559	496	114	122	108
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	476	481	541	529	567	531	91	104	96
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	463	477	550	530	536	530	96	118	99
1. 4 ggr per säsong (S1)	450	483		524		519	100		101
2. 3 ggr per säsong (S2)	498		541		554			115	
-X-	474	483	541	524	554	519	100	115	101
CV%	3.1	1.9	3	1.9	3.5	4.4	13.0	12.4	10.1
OBS	18	12	12	9	9	9	12	12	9
PROB F1	.0544								
PROB F2	.1255	.1523	.4241	.1510	.2322	.2204	.1006	.2491	.3825
PROB F1*F2	.0268								
LSD F1	50								
LSD F2	20	16	28	23	44	52	23	25	23
LSD F1*F2	32	16	28	23	44	52	23	25	23

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.
Några plantor har gått i ax i S2 09-07.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5010

Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 063192

Län-fnr: LA-19-2010

Förs.v: Naturbruksgymnasiet
Skolgatan 37, Önnestad

Jbr-omr: 4a B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2011-04-11 428

PK 7-25

30 107

2011-04-11 259

NS 27-4 (Axan) (S1)

70

2011-04-11 296

NS 27-4 (Axan) (S2)

80

2011-06-01 222

NS 27-4 (Axan) (S1)

60

2011-06-01 259

NS 27-4 (Axan) (S2)

70

2011-07-04 148

NS 27-4 (Axan) (S1)

40

2011-07-12 185

NS 27-4 (Axan) (S2)

50

2011-08-08 111

NS 27-4 (Axan) (S1)

30

Växtskydd

Sådatum : 2010-04-23

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Quench) + insådd

För-förfrukt: Sockerbetor

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 5.0

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLIED:

1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong

2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong

A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver

1. 4 ggr per säsong (S1)
2. 3 ggr per säsong (S2)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

iNDF g/kg NDF Sk 2,S2 07-12	iNDF g/kg NDF Sk 3,S1 08-03	iNDF g/kg NDF Sk 3,S2 09-07	iNDF g/kg NDF Sk 4,S1 09-07	iNDF g/kg NDF Sist sk 09-07				
	145		95	95				
	144		97	97				
	136		118	118				
180		89		89				
166		101		101				
193		118		118				
180	145	89	95	92				
166	144	101	97	99				
193	136	118	118	118				
	141		103	103				
179		102		102				
179	141	102	103	103				
10.4	19.5	15.5	10.3	13.2				
9	9	9	9	18				
				.9484				
.3064	.9106	.1960	.1036	.0270				
				.8056				
				46				
42	63	36	24	18				
42	63	36	24	30				

ANM: I led B var det omöjligt att skilja på rajsvingel och engelskt rajgräs i den botaniska analysen.

Några plantor har gått i ax i S2 09-07.

SIDA 19

Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Andreas Nilsson 0708-945375

2012-05-14 13:07

Jordanalys (matjord (0-30 cm)):

ADB-nr: 063192
Serienr: R6-5010
Län-fnr: LA-19-2010

Jordart: mmh mo LL

Mullhalt %: 4.5

Lerhalt %: 18

Mjåla %: 39.5

Sand+grovmå %: 38.0

pH: 5.0

P-AL (mg/100g): 1.8

K-AL (mg/100g): 9.4

Mg-AL (mg/100g): 13.2

K/Mg (mg/100g): 0.7

Ca-AL (mg/100g): 390

KI: I

KI: III

Jordanalys (alv (30-60 cm)):

ADB-nr: 063192
Serienr: R6-5010
Län-fnr: LA-19-2010

Jordart: mf mo LL

Mullhalt %: 1.6

Lerhalt %: 22

Mjåla %: 32.0

Sand+grovmå %: 44.4

pH: 5.1

P-AL (mg/100g): 7.1

K-AL (mg/100g): 9.9

Mg-AL (mg/100g): 9.8

K/Mg (mg/100g): 1.0

Ca-AL (mg/100g): 368

KI: III

KI: III