



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 820

ADB-nr: 063299

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnbygd VÄSTERÅS

Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs

Län-fnr: U-41-2009

Gödsling kg/ton
2009-04-30 650Medel
NPK 24-4-5

SIDA 1

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

2011-06-17

N P K S Mg
156 26 33

Magnus Halling, tel 018 671429

Anders Ericsson 070-5620271

Sådatum : 04 30, 05-26

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde: 5,9

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm:

Frö/m, st: 8

2009-07-08 Callisto 0,75

2009-07-08 Callisto 0,75

Mg-AL: 46,8 mg/100g

Ca-AL: 303 mg/100g

P-AL: 2,5 mg/100g II

K-AL: 14,8 mg/100g III

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

			Skörd Totalt TS kg/ha 10-19	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt rut- skörd %	Skörd Grön- massa kg/ha 10-19	Skörd Kolvar TS kg/ha 10-19	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt Kolvar %
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	8670	100	100	100	19,8	43870	3860	100	100	100	24,1
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	10030	100	100	116	21,4	46780	4730	100	100	120	26,8
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	11340	100	100	131	20,9	54160	3570	100	100	90	20,3
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	10590	100	122	100	23,9	44160	5540	100	140	100	31,1
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	11740	100	117	111	24,2	48290	5610	100	120	100	29,5
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	12230	100	108	116	22,2	54890	4640	100	130	80	23,0
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	9160	106	100	100	20,3	45020	3630	90	100	100	24,1
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	10700	107	100	117	19,7	54310	3490	70	100	100	19,3
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	10350	91	100	113	18,4	56390	2660	70	100	70	15,2
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	8580	81	94	100	21,2	40390	3520	60	100	100	24,7
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	11260	96	105	131	20,0	56340	4040	70	120	110	23,8
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	10110	83	98	118	18,9	53540	3350	70	130	100	18,3
När jordtemperaturen är 5°C			10770	100			22,1	48690	4660	100			25,8
När jordtemperaturen är 8°C			10030	93			19,8	51000	3450	70			20,9
Sårygg (kam)			10040		100		20,1	50090	3660		100		21,6
Plan mark utan sårygg			10750		107		21,8	49600	4450		120		25,1
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			9250			100	21,3	43360	4140			100	26,0
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			10930			118	21,3	51430	4470			110	24,8
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			11010			119	20,1	54740	3550			90	19,2
-X-			10400				20,9	49840	4050				23,4
CV%			12,5				5,5	9,0	22,1				13,4

ANM: Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: R6 - 820
ADB-nr: 063299
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnbygård VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-41-2009

SIDA 2
Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429
Utförar ansvarig: Anders Ericsson 070-5620271
2011-06-17
N P K S Mg
156 26 33

Gödsling kg/ton Medel
2009-04-30 650 NPK 24-4-5

Sådatum : 04 30, 05-26
Förfrukt: Höstvete
Jordart:
pH-värde: 5,9
Radavst, cm: 75
Sättavst, cm:
Frö/m, st: 8

Mg-AL: 46,8 mg/100g
Ca-AL: 303 mg/100g
P-AL: 2,5 mg/100g II
K-AL: 14,8 mg/100g III

2009-07-08 Callisto 0,75
2009-07-08 Callisto 0,75

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

	Skörd Totalt TS kg/ha 10-19	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt rut- skörd %	Skörd Grön- massa kg/ha 10-19	Skörd Kolvar TS kg/ha 10-19	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt Kolvar %
OBS	36				36	36	36				36
PROB F1	.1002				.0001	.1365	.0005				.0001
PROB F2	.1136				.0002	.7492	.0140				.0032
PROB F1*F2	.0788				.0095	.3843	.1753				.5096
PROB F3	.0040				.0219	.0001	.0583				.0001
PROB F1*F3	.3162				.0919	.0481	.9022				.4446
PROB F2*F3	.7467				.2489	.5504	.9755				.9257
LSD F1	890				0,8	3100	620				2,2
LSD F2	890				0,8	3100	620				2,2
LSD F1*F2	1260				1,1	4380	870				3,1
LSD F3	1090				1,0	3790	760				2,6
LSD F1*F3	1550				1,4	5360	1070				3,7
LSD F2*F3	1550				1,4	5360	1070				3,7

ANM: Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 820

ADB-nr: 063299

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnbygård VÄSTERÅS

Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-41-2009

Gödsling kg/ton
2009-04-30 650

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 3

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

2011-06-17

N P K S Mg
156 26 33

Magnus Halling, tel 018 671429

Anders Ericsson 070-5620271

Sådatum : 04 30, 05-26

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde: 5,9

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm:

Frö/m, st: 8

2009-07-08 Callisto 0,75

2009-07-08 Callisto 0,75

Mg-AL: 46,8 mg/100g

Ca-AL: 303 mg/100g

P-AL: 2,5 mg/100g II

K-AL: 14,8 mg/100g III

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

			TShalt Kolvar prov %	Kolvar andel vikt-% av TS 10-15	Skörd Stjälk TS kg/ha 10-19	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt Stjälk %	TShalt Stjälk prov %	Stjälk andel vikt-% av TS 10-15	Stärk- elsehalt kolv % av TS	Stärk- else i kolvar TSkg/ha 10-19
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	24,1	44,9	4810	100	100	100	23,7	23,7	55,1	29,6	1147
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	26,8	47,0	5300	100	100	110	25,0	25,0	53,0	29,6	1404
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	20,3	32,1	7780	100	100	162	26,6	26,6	67,9	13,7	572
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	31,1	52,3	5050	100	105	100	23,8	23,8	47,7	40,5	2293
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	29,5	47,4	6130	100	116	121	27,2	27,2	52,6	34,6	2018
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	23,0	37,1	7590	100	98	150	27,8	27,8	62,9	21,7	1040
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	24,1	39,1	5540	115	100	100	24,4	24,4	60,9	21,9	896
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	19,3	32,2	7200	136	100	130	25,7	25,7	67,8	16,8	664
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	15,2	25,6	7690	99	100	139	23,1	23,1	74,4	4,7	123
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	24,7	41,0	5070	100	91	100	25,1	25,1	59,0	28,9	1025
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	23,8	36,0	7220	118	100	142	25,8	25,8	64,0	25,0	1029
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	18,3	33,0	6770	89	88	134	24,9	24,9	67,0	11,9	407
När jordtemperaturen är 5°C			25,8	43,5	6110	100			25,7	25,7	56,5	28,3	1412
När jordtemperaturen är 8°C			20,9	34,5	6580	108			24,8	24,8	65,5	18,2	691
Sårygg (kam)			21,6	36,8	6380		100		24,8	24,8	63,2	19,4	801
Plan mark utan sårygg			25,1	41,1	6300		99		25,8	25,8	58,9	27,1	1302
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			26,0	44,3	5110			100	24,3	24,3	55,7	30,2	1340
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			24,8	40,6	6460			126	25,9	25,9	59,4	26,5	1279
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			19,2	31,9	7460			146	25,6	25,6	68,1	13,0	535
-X-			23,4	39,0	6340				25,3	25,3	61,0	23,2	1051
CV%			13,4	14,2	13,7				6	6	9,1	37,3	48,7

ANM: Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 820

ADB-nr: 063299

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnbygård VÄSTERÅS

Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-41-2009

Gödsling kg/ton
2009-04-30 650

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 4
Skördeår:

2009

Ansvarig vid SLU:
Utförar ansvarig:
2011-06-17

Magnus Halling, tel 018 671429
Anders Ericsson 070-5620271

N P K S Mg
156 26 33

Sådatum : 04 30, 05-26

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde: 5,9

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm:

Frö/m, st: 8

2009-07-08 Callisto 0,75
2009-07-08 Callisto 0,75

Mg-AL: 46,8 mg/100g
Ca-AL: 303 mg/100g
P-AL: 2,5 mg/100g II
K-AL: 14,8 mg/100g III

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

	TShalt Kolvar prov %	Kolvar andel vikt-% av TS 10-15	Skörd Stjälk TS kg/ha 10-19	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt Stjälk %	TShalt Stjälk prov %	Stjälk andel vikt-% av TS 10-15	Stärk- elsehalt kolv % av TS	Stärk- else i kolvar kg/ha 10-19
OBS	36	36	36				36	36	36	36	36
PROB F1	.0001	.0001	.1167				.1032	.1032	.0001	.0019	.0003
PROB F2	.0032	.0281	.7812				.0567	.0567	.0281	.0134	.0073
PROB F1*F2	.5096	.9827	.2045				.7773	.7773	.9827	.9378	.1695
PROB F3	.0001	.0001	.0001				.0350	.0350	.0001	.0001	.0011
PROB F1*F3	.4446	.2395	.0365				.0071	.0071	.2395	.9626	.7348
PROB F2*F3	.9257	.6569	.4016				.6777	.6777	.6569	.9502	.8228
LSD F1	2,2	3,8	600				1,0	1,0	3,8	6,0	353
LSD F2	2,2	3,8	600				1,0	1,0	3,8	6,0	353
LSD F1*F2	3,1	5,4	840				1,5	1,5	5,4	8,4	499
LSD F3	2,6	4,7	730				1,3	1,3	4,7	7,3	432
LSD F1*F3	3,7	6,6	1030				1,8	1,8	6,6	10,3	611
LSD F2*F3	3,7	6,6	1030				1,8	1,8	6,6	10,3	611

ANM: Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 820

ADB-nr: 063299

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnbygård VÄSTERÅS

Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs

Län-fnr: U-41-2009

Gödsling kg/ton
2009-04-30 650

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 5

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

2011-06-17

N P K S Mg
156 26 33

Magnus Halling, tel 018 671429

Anders Ericsson 070-5620271

Sådatum : 04 30, 05-26

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde: 5,9

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm:

Frö/m, st: 8

2009-07-08 Callisto 0,75

2009-07-08 Callisto 0,75

Mg-AL: 46,8 mg/100g

Ca-AL: 303 mg/100g

P-AL: 2,5 mg/100g II

K-AL: 14,8 mg/100g III

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

			Stärk- else i allt kg/ha 10-19	Socket halt kolv % av TS kg/ha 10-19	Socket i kolvar kg/ha 10-19	Socket i allt kg/ha 10-19	Stärk- elsehalt allt % av ts	Socket halt % %	Plant- antal / m2 st. 85 10-14	Bestånd- höjd cm. st. 85 10-14	Ogräs- grad. % st. 85 10-14	Råpro- tein % ts	NDF % ts
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	806	8,0	309	809	9,1	9,3	6	237	9	9,1	54,3
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	1193	8,7	413	831	11,7	8,3	6	270	8	8,1	53,5
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	755	13,3	443	1135	6,5	10,1	10	260	8	7,7	51,8
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	2492	5,2	279	478	23,1	4,6	7	247	12	9,5	47,6
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	2034	7,6	410	765	17,2	6,5	7	272	11	9,0	48,3
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	1288	10,7	450	1129	10,5	9,3	11	265	8	8,4	52,0
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	684	9,3	305	844	7,4	9,3	7	255	4	8,9	54,2
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	686	13,7	450	1139	6,4	10,7	8	283	4	7,5	56,7
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	302	20,3	520	1210	2,9	11,7	10	252	4	8,0	57,3
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	1116	8,0	280	611	12,6	7,2	8	258	5	8,8	51,1
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	972	11,6	462	1005	8,6	8,9	8	287	6	8,0	54,2
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	487	12,9	433	1131	4,7	11,1	10	263	4	8,1	57,5
När jordtemperaturen är 5°C			1428	8,9	384	858	13,0	8,0	8	258	9	8,6	51,3
När jordtemperaturen är 8°C			708	12,6	408	990	7,1	9,8	9	266	5	8,2	55,2
Sårygg (kam)			738	12,2	407	995	7,3	9,9	8	259	6	8,2	54,6
Plan mark utan sårygg			1398	9,4	386	853	12,8	7,9	9	265	8	8,6	51,8
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			1275	7,7	293	686	13,1	7,6	7	249	7	9,1	51,8
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			1221	10,4	434	935	11,0	8,6	7	278	7	8,1	53,2
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			708	14,3	462	1151	6,2	10,5	10	260	6	8,0	54,6
-X-			1068	10,8	396	924	10,1	8,9	8			8,4	53,2
CV%			39,0	25,7	19,9	12,9	30,2	10,7	12,2			10,2	5,2

ANM: Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: R6- 820
ADB-nr: 063299
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnbygård VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-41-2009

Gödsling kg/ton Medel N P K S Mg
2009-04-30 650 NPK 24-4-5 156 26 33

SIDA 6
Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429
Utförar ansvarig: Anders Ericsson 070-5620271
2011-06-17

Sådatum : 04 30, 05-26
Förfrukt: Höstvete
Jordart:
pH-värde: 5,9
Radavst, cm: 75
Sättavst, cm:
Frö/m, st: 8

Mg-AL: 46,8 mg/100g
Ca-AL: 303 mg/100g
P-AL: 2,5 mg/100g II
K-AL: 14,8 mg/100g III

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

	Stärk- else i allt kg/ha 10-19	Socket halt kolv % av TS kg/ha 10-19	Socket i kolvar kg/ha 10-19	Socket i allt kg/ha 10-19	Stärk- elsehalt allt % av ts	Socket halt % %	Plant- antal / m2 st. 85 10-14	Bestånd höjd cm. st. 85 10-14	Ogräs- grad. % st. 85 10-14	Råpro- tein % ts	NDF % ts
OBS	36	36	36	36	36	36	36			36	36
PROB F1	.0001	.0005	.3671	.0029	.0001	.0001	.0093			.1898	.0003
PROB F2	.0001	.0048	.4334	.0016	.0001	.0001	.0513			.1496	.0050
PROB F1*F2	.0161	.4455	.6388	.8578	.0293	.1412	.3553			.3875	.2689
PROB F3	.0046	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001			.0114	.0626
PROB F1*F3	.8902	.4712	.7700	.0537	.6571	.3974	.1441			.5441	.2462
PROB F2*F3	.1282	.2850	.7816	.0536	.0267	.0079	.3431			.7503	.0820
LSD F1	287	1,9	54	82	2,1	0,7	1			0,6	1,9
LSD F2	287	1,9	54	82	2,1	0,7	1			0,6	1,9
LSD F1*F2	405	2,7	77	116	3,0	0,9	1			0,8	2,7
LSD F3	351	2,3	66	100	2,6	0,8	1			0,7	2,3
LSD F1*F3	496	3,3	94	142	3,6	1,1	1			1,0	3,3
LSD F2*F3	496	3,3	94	142	3,6	1,1	1			1,0	3,3

ANM: Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 820

ADB-nr: 063299

Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnbygård VÄSTERÅS

Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs

Län-fnr: U-41-2009

Gödsling kg/ton
2009-04-30 650

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 7

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

2011-06-17

N P K S Mg
156 26 33

Magnus Halling, tel 018 671429

Anders Ericsson 070-5620271

Sådatum : 04 30, 05-26

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde: 5,9

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm:

Frö/m, st: 8

2009-07-08 Callisto 0,75

2009-07-08 Callisto 0,75

Mg-AL: 46,8 mg/100g

Ca-AL: 303 mg/100g

P-AL: 2,5 mg/100g II

K-AL: 14,8 mg/100g III

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	20,8
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	21,1
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	15,7
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	19,4
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	19,2
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	18,6
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	21,1
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	21,6
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	20,0
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	20,5
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	21,7
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	20,1
När jordtemperaturen är 5°C			19,1
När jordtemperaturen är 8°C			20,8
Sårygg (kam)			20,0
Plan mark utan sårygg			19,9
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			20,4
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			20,9
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			18,6
-X-			20,0
CV%			10,3

ANM: Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: R6 - 820
ADB-nr: 063299
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnbygård VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-41-2009

Gödsling kg/ton Medel
2009-04-30 650 NPK 24-4-5

SIDA 8
Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429
Utförar ansvarig: Anders Ericsson 070-5620271
2011-06-17
N P K S Mg
156 26 33

Sådatum : 04 30, 05-26
Förfrukt: Höstvete
Jordart:
pH-värde: 5,9
Radavst, cm: 75
Sättavst, cm:
Frö/m, st: 8

2009-07-08 Callisto 0,75
2009-07-08 Callisto 0,75

Mg-AL: 46,8 mg/100g
Ca-AL: 303 mg/100g
P-AL: 2,5 mg/100g II
K-AL: 14,8 mg/100g III

Försöksdesign: SSP

Bevattning:

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
PROB F3
PROB F1*F3
PROB F2*F3
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
LSD F3
LSD F1*F3
LSD F2*F3

INDF % NDF										
36										
.0197										
.8423										
.9962										
.0284										
.4413										
.2478										
1,4										
1,4										
2,0										
1,7										
2,4										
2,4										

ANM: Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008