



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 820

ADB-nr: 063300

Förs.v: Karsholms lantbruk AB

Karsholmsvägen 110, KRISTIANSTAD

Jbr-omr: 4 B

Sårygg och sorter i ensilagemajs

Län-fnr: LA-35-2009

SIDA 1

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel 018 671429

Utförar ansvarig:

Arne Ljungars 0708-945352

2011-06-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S	Mg
2009-04-20	100	Map	12	23			
2009-04-29	100	Map	12	23			
2009-04-20	19	NS 27-3 (Axan)	5		1		
2009-04-23	16	Flytgödsel, To					

Sådatum : 04-20, 04-29

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh I Sa

pH-värde: 6,6

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm: 17,5

Frö/m, st: 5,7

Mg-AL: 8,1 mg/100g

Ca-AL: 150 mg/100g

P-AL: 24 mg/100g V

K-AL: 17 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Montrac 1,0l. 0520, 0601

2009-05-20 Callisto 0,75

2009-06-01 Callisto 0,30

2009-05-20 Sumi-Alpha 0,4

Bevattning:

25 mm 0621, 0631

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

			Skörd Totalt TS kg/ha 10-05	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt rut- skörd %	Skörd Grön- massa kg/ha 10-05	Skörd Kolvar TS kg/ha 10-05	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt Kolvar %
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	18450	100	100	100	42,9	43000	10180	100	100	100	55,2
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	18800	100	100	102	41,2	45800	10260	100	100	100	55,2
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	19710	100	100	107	35,3	55930	7150	100	100	70	47,4
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	18330	100	99	100	45,1	40700	9680	100	100	100	58,3
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	18650	100	99	102	45,4	41100	8780	100	90	90	56,1
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	18760	100	95	102	35,1	53410	7990	100	110	80	50,4
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	18690	101	100	100	40,9	45820	9590	90	100	100	52,7
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	18850	100	100	101	40,0	47220	8990	90	100	90	52,7
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	19830	101	100	106	31,4	63380	7090	100	100	70	46,4
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	19900	109	106	100	41,8	47690	11240	120	120	100	56,8
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	18710	100	99	94	40,1	46620	9590	110	110	90	53,6
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	20380	109	103	102	33,9	60040	6700	80	90	60	46,2
När jordtemperaturen är 5°C			18780	100			40,9	46660	9000	100			53,8
När jordtemperaturen är 8°C			19390	103			38,0	51790	8870	100			51,4
Sårygg (kam)			19060		100		38,6	50190	8880		100		51,6
Plan mark utan sårygg			19120		100		40,3	48260	8990		100		53,6
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			18840			100	42,7	44300	10170			100	55,7
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			18750			100	41,7	45180	9400			90	54,4
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			19670			104	33,9	58190	7230			70	47,6
-X-			19090				39,4	49230	8940				52,6
CV%			4,4				4,8	5,6	8,3				3,6

ANM: Inga synliga skador eller sjukdomar.

Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 820

ADB-nr: 063300

Förs.v: Karsholms lantbruk AB

Karsholmsvägen 110, KRISTIANSTAD

Jbr-omr: 4 B

Sårygg och sorter i ensilagemajs

Län-fnr: LA-35-2009

SIDA 2

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel 018 671429

Utförar ansvarig:

Arne Ljungars 0708-945352

2011-06-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S	Mg
2009-04-20	100	Map	12	23			
2009-04-29	100	Map	12	23			
2009-04-20	19	NS 27-3 (Axa)	5		1		
2009-04-23	16	Flytgödsel, To					

Sådatum : 04-20, 04-29

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh I Sa

pH-värde: 6,6

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm: 17,5

Frö/m, st: 5,7

Montrac 1,0l. 0520, 0601

2009-05-20 Callisto 0,75

2009-06-01 Callisto 0,30

2009-05-20 Sumi-Alpha 0,4

Mg-AL: 8,1 mg/100g

Ca-AL: 150 mg/100g

P-AL: 24 mg/100g V

K-AL: 17 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

25 mm 0621, 0631

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

	Skörd Totalt TS kg/ha 10-05	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt rut- skörd %	Skörd Grön- massa kg/ha 10-05	Skörd Kolvar TS kg/ha 10-05	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt Kolvar %
OBS	36				36	36	36				36
PROB F1	.0376				.0002	.0001	.5779				.0010
PROB F2	.8184				.0159	.0464	.6345				.0043
PROB F1*F2	.1016				.4977	.1889	.0560				.5410
PROB F3	.0223				.0001	.0001	.0001				.0001
PROB F1*F3	.3810				.8901	.2979	.1750				.9337
PROB F2*F3	.4823				.8247	.4266	.2510				.1940
LSD F1	570				1,3	1900	510				1,3
LSD F2	570				1,3	1900	510				1,3
LSD F1*F2	810				1,8	2680	720				1,8
LSD F3	700				1,6	2320	620				1,6
LSD F1*F3	990				2,2	3280	880				2,2
LSD F2*F3	990				2,2	3280	880				2,2

ANM: Inga synliga skador eller sjukdomar.

Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 820

ADB-nr: 063300

Förs.v: Karsholms lantbruk AB

Karsholmsvägen 110, KRISTIANSTAD

Jbr-omr: 4 B

Sårygg och sorter i ensilagemajs

Län-fnr: LA-35-2009

SIDA 3

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel 018 671429

Utförar ansvarig:

Arne Ljungars 0708-945352

2011-06-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S	Mg
2009-04-20	100	Map	12	23			
2009-04-29	100	Map	12	23			
2009-04-20	19	NS 27-3 (Axa)	5		1		
2009-04-23	16	Flytgödsel, To					

Sådatum : 04-20, 04-29

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh I Sa

pH-värde: 6,6

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm: 17,5

Frö/m, st: 5,7

Mg-AL: 8,1 mg/100g

Ca-AL: 150 mg/100g

P-AL: 24 mg/100g V

K-AL: 17 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

2009-05-20 Montrac 1,0l. 0520, 0601

2009-06-01 Callisto 0,75

2009-05-20 Callisto 0,30

Sumi-Alpha 0,4

Bevattnings:

25 mm 0621, 0631

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

			TShalt Kolvar prov %	Kolvar andel vikt-% av TS 10-04	Skörd Stjälk TS kg/ha 10-05	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt Stjälk %	TShalt Stjälk prov %	Stjälk andel vikt-% av TS 10-04	Stärk- elsehalt kolv % av TSkg/ha 10-05	Stärk- else i kolvar 10-05
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	55,2	55,1	8270	100	100	100	30,1	30,1	44,9	49,7	5048
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	55,2	54,7	8550	100	100	103	31,0	31,0	45,3	51,2	5238
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	47,4	36,4	12570	100	100	152	27,7	27,7	63,6	43,3	3086
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	58,3	52,8	8650	100	105	100	30,5	30,5	47,2	56,3	5450
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	56,1	47,0	9870	100	116	114	35,3	35,3	53,0	55,7	4885
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	50,4	42,6	10770	100	86	125	27,9	27,9	57,4	45,8	3655
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	52,7	51,4	9100	110	100	100	25,6	25,6	48,6	46,1	4415
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	52,7	47,6	9860	115	100	108	29,7	29,7	52,4	51,3	4621
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	46,4	35,8	12740	101	100	140	27,9	27,9	64,2	44,1	3119
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	56,8	56,5	8660	100	95	100	27,9	27,9	43,5	46,9	5239
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	53,6	51,2	9120	92	93	105	30,2	30,2	48,8	44,8	4299
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	46,2	32,9	13690	127	107	158	28,7	28,7	67,1	38,6	2577
När jordtemperaturen är 5°C			53,8	48,1	9780	100			30,4	30,4	51,9	50,3	4560
När jordtemperaturen är 8°C			51,4	45,9	10530	108			28,3	28,3	54,1	45,3	4045
Sårygg (kam)			51,6	46,8	10180		100		28,7	28,7	53,2	47,6	4254
Plan mark utan sårygg			53,6	47,2	10130		99		30,1	30,1	52,8	48,0	4351
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			55,7	54,0	8670			100	28,5	28,5	46,0	49,7	5038
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			54,4	50,1	9350			108	31,5	31,5	49,9	50,7	4761
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			47,6	36,9	12440			144	28,1	28,1	63,1	43,0	3109
-X-			52,6	47,0	10150				29,4	29,4	53,0	47,8	4303
CV%			3,6	7,3	8,4				7,3	7,3	6,5	12,1	12,4

ANM: Inga synliga skador eller sjukdomar.

Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 820

ADB-nr: 063300

Förs.v: Karsholms lantbruk AB

Karsholmsvägen 110, KRISTIANSTAD

Jbr-omr: 4 B

Sårygg och sorter i ensilagemajs

Län-fnr: LA-35-2009

SIDA 4

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel 018 671429

Utförar ansvarig:

Arne Ljungars 0708-945352

2011-06-17

Sådatum : 04-20, 04-29

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh I Sa

pH-värde: 6,6

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm: 17,5

Frö/m, st: 5,7

Gödsling

kg/ton

Medel

N P K S Mg

2009-04-20

100

Map

12 23

2009-04-29

100

Map

12 23

2009-04-20

19

NS 27-3 (Axan)

5 1

2009-04-23

16

Flytgödsel, To

Mg-AL: 8,1 mg/100g

Ca-AL: 150 mg/100g

P-AL: 24 mg/100g V

K-AL: 17 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

2009-05-20

Montrac 1,0l. 0520, 0601

2009-06-01

Callisto 0,75

2009-05-20

Callisto 0,30

Sumi-Alpha 0,4

Bevattning:

25 mm 0621, 0631

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

	TShalt Kolvar prov %	Kolvar andel vikt-% av TS 10-04	Skörd Stjälk TS kg/ha 10-05	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt Stjälk %	TShalt Stjälk prov %	Stjälk andel vikt-% av TS 10-04	Stärk- elsehalt kolv % av TS	Stärk- else i kolvar kg/ha 10-05
OBS	36	36	36				36	36	36	36	36
PROB F1	.0010	.0646	.0149				.0078	.0078	.0646	.0150	.0078
PROB F2	.0043	.7828	.8501				.0619	.0619	.7828	.8352	.5915
PROB F1*F2	.5410	.1775	.9332				.7537	.7537	.1775	.0417	.5423
PROB F3	.0001	.0001	.0001				.0011	.0011	.0001	.0057	.0001
PROB F1*F3	.9337	.1894	.1630				.0580	.0580	.1894	.7795	.9182
PROB F2*F3	.1940	.3590	.5931				.5486	.5486	.3590	.4894	.1077
LSD F1	1,3	2,4	590				1,5	1,5	2,4	4,0	366
LSD F2	1,3	2,4	590				1,5	1,5	2,4	4,0	366
LSD F1*F2	1,8	3,3	830				2,1	2,1	3,3	5,6	518
LSD F3	1,6	2,9	720				1,8	1,8	2,9	4,9	449
LSD F1*F3	2,2	4,1	1020				2,6	2,6	4,1	6,9	634
LSD F2*F3	2,2	4,1	1020				2,6	2,6	4,1	6,9	634

ANM: Inga synliga skador eller sjukdomar.

Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 820

ADB-nr: 063300

Förs.v: Karsholms lantbruk AB

Karsholmsvägen 110, KRISTIANSTAD

Jbr-omr: 4 B

Sårygg och sorter i ensilagemajs

Län-fnr: LA-35-2009

SIDA 5

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel 018 671429

Utförar ansvarig:

Arne Ljungars 0708-945352

2011-06-17

Sådatum : 04-20, 04-29

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh I Sa

pH-värde: 6,6

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm: 17,5

Frö/m, st: 5,7

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S	Mg
2009-04-20	100	Map	12	23			
2009-04-29	100	Map	12	23			
2009-04-20	19	NS 27-3 (Axan)	5		1		
2009-04-23	16	Flytgödsel, To					

Montrac 1,0l. 0520, 0601

2009-05-20 Callisto 0,75

2009-06-01 Callisto 0,30

2009-05-20 Sumi-Alpha 0,4

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

25 mm 0621, 0631

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

			Stärk- else i allt kg/ha 10-05	Socket halt kolv % av TS	Socket i kolvar kg/ha 10-05	Socket i allt kg/ha 10-05	Stärk- elsehalt allt % av ts	Socket halt %					
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	4444	2,2	226	697	24,4	3,8					
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	4859	2,8	288	527	25,7	2,8					
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	3895	2,8	201	1105	19,8	5,6					
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	5634	2,0	192	534	31,0	2,9					
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	3319	2,0	176	309	17,8	1,6					
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	4064	2,8	221	833	21,7	4,5					
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	3821	3,1	295	583	20,6	3,1					
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	5046	2,9	261	607	27,0	3,2					
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	3518	3,8	266	1333	17,7	6,7					
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	5113	2,9	323	721	25,6	3,6					
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	3914	3,0	285	548	20,9	2,9					
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	3666	3,8	255	1170	18,1	5,7					
När jordtemperaturen är 5°C			4369	2,4	217	668	23,4	3,5					
När jordtemperaturen är 8°C			4180	3,2	281	827	21,6	4,2					
Sårygg (kam)			4264	2,9	256	809	22,5	4,2					
Plan mark utan sårygg			4285	2,7	242	686	22,5	3,6					
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			4753	2,5	259	634	25,4	3,4					
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			4284	2,7	252	498	22,8	2,6					
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			3786	3,3	236	1110	19,4	5,6					
-X-			4274	2,8	249	747	22,5	3,9					
CV%			26,8	18,8	23,4	17,3	27,3	16,1					

ANM: Inga synliga skador eller sjukdomar.

Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 820

ADB-nr: 063300

Förs.v: Karsholms lantbruk AB

Karsholmsvägen 110, KRISTIANSTAD

Jbr-omr: 4 B

Sårygg och sorter i ensilagemajs

Län-fnr: LA-35-2009

SIDA 6

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel 018 671429

Utförar ansvarig:

Arne Ljungars 0708-945352

2011-06-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S	Mg
2009-04-20	100	Map	12	23			
2009-04-29	100	Map	12	23			
2009-04-20	19	NS 27-3 (Axan)	5		1		
2009-04-23	16	Flytgödsel, To					

Sådatum : 04-20, 04-29

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh I Sa

pH-värde: 6,6

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm: 17,5

Frö/m, st: 5,7

Montrac 1,0l. 0520, 0601

2009-05-20 Callisto 0,75

2009-06-01 Callisto 0,30

2009-05-20 Sumi-Alpha 0,4

Försöksdesign: SSP

Bevattning:

25 mm 0621, 0631

Mg-AL: 8,1 mg/100g

Ca-AL: 150 mg/100g

P-AL: 24 mg/100g V

K-AL: 17 mg/100g IV

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

PROB F3

PROB F1*F3

PROB F2*F3

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

LSD F3

LSD F1*F3

LSD F2*F3

Stärk- else i allt kg/ha 10-05	Socket halt kolv % av TS	Socket i kolvar kg/ha 10-05	Socket i allt kg/ha 10-05	Stärk- elsehalt allt % av ts	Socket halt %					
36	36	36	36	36	36					
.6240	.0002	.0032	.0011	.3977	.0025					
.9569	.3049	.4747	.0089	.9953	.0044					
.8325	.3431	.1646	.0380	.9172	.0684					
.1392	.0045	.6087	.0001	.0726	.0001					
.5576	.5407	.4104	.0870	.3883	.0839					
.0359	.7628	.5619	.1707	.0527	.2398					
787	0,4	40	89	4,2	0,4					
787	0,4	40	89	4,2	0,4					
1114	0,5	57	126	6,0	0,6					
964	0,4	49	109	5,2	0,5					
1364	0,6	69	154	7,3	0,7					
1364	0,6	69	154	7,3	0,7					

ANM: Inga synliga skador eller sjukdomar.

Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 820

ADB-nr: 063300

Förs.v: Karsholms lantbruk AB

Karsholmsvägen 110, KRISTIANSTAD

Jbr-omr: 4 B

Sårygg och sorter i ensilagemajs

Län-fnr: LA-35-2009

SIDA 7

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel 018 671429

Utförar ansvarig:

Arne Ljungars 0708-945352

2011-06-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S	Mg
2009-04-20	100	Map	12	23			
2009-04-29	100	Map	12	23			
2009-04-20	19	NS 27-3 (Axan)	5		1		
2009-04-23	16	Flytgödsel, To					

Sådatum : 04-20, 04-29

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh I Sa

pH-värde: 6,6

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm: 17,5

Frö/m, st: 5,7

Mg-AL: 8,1 mg/100g

Ca-AL: 150 mg/100g

P-AL: 24 mg/100g V

K-AL: 17 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

2009-05-20 Montrac 1,0l. 0520, 0601

2009-06-01 Callisto 0,75

2009-05-20 Callisto 0,30

Sumi-Alpha 0,4

Bevattnings:

25 mm 0621, 0631

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

			Utveck- lings- stad. st.15-16 05-28	Plant- antal / m2 st.15-16 05-28	Utveck- lings- stad. st. 61 07-24	Plant- antal / m2 st. 85 09-22	Kolvar antal / m2 st. 85 09-22	Kolvar antal prov st. 85 10-04	Strå- styrka %	Bestånd- höjd cm. st. 85 10-01	Ogräs- grad. % st. 85 10-05		
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	16	7	63	7	22,3	7,6	100	263	1		
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	15	7	61	7	24,7	7,3	100	282	1		
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	14	7	50	7	25,3	7,6	100	308	1		
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	16	7	63	7	24,7	6,7	100	265	1		
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	15	7	61	7	22,3	7,3	100	280	1		
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	15	8	50	8	27,7	7,6	100	297	1		
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	14	7	62	7	21,7	7,1	100	270	1		
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	14	7	51	7	23,0	6,7	100	283	1		
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	14	8	50	8	27,3	8,4	100	312	1		
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	15	8	62	8	23,3	8,0	100	285	1		
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	14	8	50	8	23,7	7,6	100	282	1		
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	14	8	50	8	25,0	8,0	100	315	1		
När jordtemperaturen är 5°C			15	7	58	7	24,5	7,3	100	283	1		
När jordtemperaturen är 8°C			14	8	54	8	24,0	7,6	100	291	1		
Sårygg (kam)			14	7	56	7	24,1	7,4	100	286	1		
Plan mark utan sårygg			15	8	56	8	24,4	7,5	100	287	1		
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			15	7	63	7	23,0	7,3	100	271	1		
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			14	7	56	7	23,4	7,2	100	282	1		
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			14	8	50	7	26,3	7,9	100	308	1		
-X-						7							
CV%						5,1							

ANM: Inga synliga skador eller sjukdomar.

Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 820

ADB-nr: 063300

Förs.v: Karsholms lantbruk AB

Karsholmsvägen 110, KRISTIANSTAD

Jbr-omr: 4 B

Sårygg och sorter i ensilagemajs

Län-fnr: LA-35-2009

SIDA 8

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, tel 018 671429

Utförar ansvarig:

Arne Ljungars 0708-945352

2011-06-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S	Mg
2009-04-20	100	Map	12	23			
2009-04-29	100	Map	12	23			
2009-04-20	19	NS 27-3 (Axan)	5		1		
2009-04-23	16	Flytgödsel, To					

Sådatum : 04-20, 04-29

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: nmh I Sa

pH-värde: 6,6

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm: 17,5

Frö/m, st: 5,7

2009-05-20 Montrac 1,0l. 0520, 0601

2009-06-01 Callisto 0,75

2009-05-20 Callisto 0,30

Sumi-Alpha 0,4

Mg-AL: 8,1 mg/100g

Ca-AL: 150 mg/100g

P-AL: 24 mg/100g V

K-AL: 17 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Bevattning:

25 mm 0621, 0631

MajAN K

FÖRSÖKSLED:

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

PROB F3

PROB F1*F3

PROB F2*F3

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

LSD F3

LSD F1*F3

LSD F2*F3

Utveck- lings- stad. st.15-16 05-28	Plant- antal / m2 st.15-16 05-28	Utveck- lings- stad. st. 61 07-24	Plant- antal / m2 st. 85 09-22	Kolvar antal / m2 st. 85 09-22	Kolvar antal prov st. 85 10-04	Strå- styrka %	Bestånd- höjd cm. st. 85 10-01	Ogräs- grad. % st. 85 10-05		
			36							
			.0920							
			.0517							
			.0000							
			.9380							
			.9380							
			.2897							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							
			0							

ANM: Inga synliga skador eller sjukdomar.

Ändrat tillfälligt från R6- 820-903 till plan R6- 820-803 från 2008