

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITETET

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 063907

Förs.v:

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

Vallfröblandning för breddat skördefenster

Län-fnr: PS-107-2006

SIDA 1

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:12

Skördeår:2007

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

	Skörde-datum	Skörde-datum	Skörde-datum	Grönm kg/ha	Grönm kg/ha	Grönm kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Summa ts kg/ha	Rel-tal	
	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3		Sk 1	Sk 2	Sk 3		Sk 1	
F Ö R S Ö K S L E D:												Fak 1	
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	S1	05-29	07-09	09-03	28500	21070	20360	69920	5250	3940	3180	12370	100
Tidig blandning med baljväxter	S1	05-29	07-09	09-03	28080	19850	22140	70060	4990	3610	3580	12190	100
Sen blandning med baljväxter	S1	05-29	07-09	09-03	23460	24750	18920	67130	4130	4570	3100	11800	100
Tidig blandning utan baljväxter	S1	05-29	07-09	09-03	35090	27740	18120	80960	5920	4620	3130	13680	100
Sen blandning utan baljväxter	S1	05-29	07-09	09-03	31690	35640	16290	83630	5000	5350	2790	13140	100
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	S2	06-04	07-16	09-11	34320	21610	20660	76590	6320	3850	3450	13620	120
Tidig blandning med baljväxter	S2	06-04	07-16	09-11	33370	20460	20460	74290	6430	3590	3800	13820	129
Sen blandning med baljväxter	S2	06-04	07-16	09-11	30170	24020	19010	73200	5490	4210	3500	13210	133
Tidig blandning utan baljväxter	S2	06-04	07-16	09-11	39860	23270	15620	78750	7350	4240	3500	15080	124
Sen blandning utan baljväxter	S2	06-04	07-16	09-11	40320	28600	15310	84230	6670	4570	3490	14730	133
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)					31410	21340	20510	73260	5790	3900	3310	13000	
Tidig blandning med baljväxter					30720	20150	21300	72180	5710	3600	3690	13000	
Sen blandning med baljväxter					26820	24380	18970	70170	4810	4390	3300	12500	
Tidig blandning utan baljväxter					37470	25500	16870	79850	6630	4430	3320	14380	
Sen blandning utan baljväxter					36000	32120	15800	83930	5840	4960	3140	13940	
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B					29360	25810	19170	74340	5060	4420	3160	12630	100
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1					35610	23590	18210	77410	6450	4090	3550	14090	128
-X-									5760	4250	3350	13360	
CV%									4.0	5.3	5.9	3.1	
OBS									40	40	40	40	
PROB F1									.0008	.0394	.0483	.0089	
PROB F2									.0001	.0001	.0002	.0001	
PROB F1*F2									.1752	.0238	.1575	.8780	
LSD F1									320	300	390	760	
LSD F2									240	230	210	420	
LSD F1*F2									350	340	330	670	

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).
Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.
Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönnare i färgen 2006-11-06.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITETET

RE S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 063907

Förs.v:

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

SIDA 2

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:12

Skördeår:2007

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Insådd baljv. kg/ha Sk 1	Insådd baljv. kg/ha Sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:												
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	100	100	100	100	100	100	100	18.5	18.7	15.7	130	320
Tidig blandning med baljväxter	95	100	92	100	113	100	98	17.8	18.2	16.2	220	790
Sen blandning med baljväxter	79	100	116	100	97	100	95	17.6	18.5	16.5	30	240
Tidig blandning utan baljväxter	113	100	117	100	99	100	111	16.9	16.7	17.3		
Sen blandning utan baljväxter	95	100	136	100	88	100	106	15.8	15.0	17.1		
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	100	98	100	108	100	110	100	18.5	17.8	16.7	470	730
Tidig blandning med baljväxter	102	99	93	106	110	113	101	19.3	17.5	18.6	740	1240
Sen blandning med baljväxter	87	92	109	113	102	112	97	18.2	17.5	18.6	310	920
Tidig blandning utan baljväxter	116	92	110	112	101	110	111	18.4	18.2	22.4		
Sen blandning utan baljväxter	106	85	119	125	101	112	108	16.6	16.0	22.8		
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	100		100		100		100	18.5	18.3	16.2	300	520
Tidig blandning med baljväxter	99		92		111		100	18.5	17.9	17.4	480	1010
Sen blandning med baljväxter	83		113		100		96	17.9	18.0	17.5	170	580
Tidig blandning utan baljväxter	115		114		100		111	17.6	17.4	19.8		
Sen blandning utan baljväxter	101		127		95		107	16.2	15.5	20.0		
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B		100		100		100		17.3	17.4	16.6	130	450
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1		93		112		112		18.2	17.4	19.8	500	960
-X-											320	710
CV%											3.9	7.6
OBS											24	24
PROB F1											.0001	.0002
PROB F2											.0001	.0001
PROB F1*F2											.0001	.0005
LSD F1											20	70
LSD F2											10	60
LSD F1*F2											20	80

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).
Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.
Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönare i färgen 2006-11-06.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITETET

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 063907

Förs.v:

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

SIDA 3

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:12

Skördeår:2007

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

	Insådd baljv. kg/ha Sk 3	Summa insådd baljv kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:												
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	S1	1190	1640	100	100	100	100	100	100	100	5090	3610
Tidig blandning med baljväxter	S1	1760	2760	100	162	100	245	100	148	100	4760	2810
Sen blandning med baljväxter	S1	560	830	100	21	100	75	100	47	100	4090	4330
Tidig blandning utan baljväxter	S1										5900	4610
Sen blandning utan baljväxter	S1										4980	5340
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	S2	1260	2450	352	100	226	100	106	100	149	5820	3120
Tidig blandning med baljväxter	S2	1550	3520	339	156	157	170	88	124	127	5670	2340
Sen blandning med baljväxter	S2	1570	2790	1059	65	382	126	280	125	336	5160	3290
Tidig blandning utan baljväxter	S2										7310	4230
Sen blandning utan baljväxter	S2										6650	4570
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)		1220	2050		100		100		100		5460	3370
Tidig blandning med baljväxter		1660	3140		157		193		136		5210	2580
Sen blandning med baljväxter		1060	1810		55		110		87		4620	3810
Tidig blandning utan baljväxter											6600	4420
Sen blandning utan baljväxter											5810	4960
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B		1170	1750	100		100		100		100	4960	4140
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1		1460	2920	398		213		125		167	6120	3510
-X-		1310	2330								5540	3820
CV%		5.7	3.6								4.1	5.4
OBS		24	24								40	40
PROB F1		.0110	.0001								.0013	.0052
PROB F2		.0001	.0001								.0001	.0001
PROB F1*F2		.0001	.0001								.0026	.0222
LSD F1		160	140								310	270
LSD F2		80	90								230	210
LSD F1*F2		130	140								350	310

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).
Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.
Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönare i färgen 2006-11-06.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANDBRUKSUNIVERSITETET

RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 063907

Förs.v:

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

SIDA 4

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:12

Skördeår:2007

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Gräs kg/ha Sk 3	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Insådd baljv % bot Sk 1	Insådd baljv % bot Sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:												
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	1990	10680	100	100	100	100	100	100	100	100	3	8
Tidig blandning med baljväxter S1	1810	9380	100	93	100	78	100	91	100	88	4	22
Sen blandning med baljväxter S1	2510	10920	100	80	100	120	100	126	100	102	1	5
Tidig blandning utan baljväxter S1	3090	13600	100	116	100	128	100	156	100	127		
Sen blandning utan baljväxter S1	2790	13110	100	98	100	148	100	140	100	123		
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	2170	11120	114	100	86	100	109	100	104	100	7	19
Tidig blandning med baljväxter S2	2240	10240	119	97	83	75	124	103	109	92	11	34
Sen blandning med baljväxter S2	1940	10390	126	89	76	105	77	89	95	93	6	22
Tidig blandning utan baljväxter S2	3500	15030	124	125	92	135	113	161	111	135		
Sen blandning utan baljväxter S2	3490	14710	134	114	86	146	125	161	112	132		
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	2080	10900		100		100		100		100	5	14
Tidig blandning med baljväxter	2020	9810		96		77		97		90	8	28
Sen blandning med baljväxter	2220	10650		85		113		107		98	3	14
Tidig blandning utan baljväxter	3290	14310		121		131		159		131		
Sen blandning utan baljväxter	3140	13910		107		147		151		128		
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B	2440	11540	100		100		100		100		3	12
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1	2670	12300	123		85		109		107		8	25
-X-	2550	11920										
CV%	6.3	3.3										
OBS	40	40										
PROB F1	.0858	.0418										
PROB F2	.0001	.0001										
PROB F1*F2	.0001	.0001										
LSD F1	290	710										
LSD F2	170	410										
LSD F1*F2	260	640										

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).
Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.
Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönnare i färgen 2006-11-06.

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITET

SLU

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 063907

Förs.v:

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

SIDA 5

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:12

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:12

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Insådd baljv % bot Sk 3	Röd klöver % bot Sk 1	Röd klöver % bot Sk 2	Röd klöver % bot Sk 3	Vit klöver % bot Sk 1	Vit klöver % bot Sk 2	Vit klöver % bot Sk 3	Övriga baljv % bot Sk 1	Gräs %, bot analys Sk 1	Gräs %, bot analys Sk 2	Gräs %, bot analys Sk 3	Timotej %, bot analys Sk 1
F Ö R S Ö K S L E D:												
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	37	2	8	32	0	0	5	0	97	92	62	20
Tidig blandning med baljväxter	49	4	21	46	0	1	3	0	95	78	51	29
Sen blandning med baljväxter	18	1	5	16	0	1	2	0	99	95	81	13
Tidig blandning utan baljväxter								0	100	100	99	32
Sen blandning utan baljväxter								0	99	100	100	8
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	36	7	18	36	0	1	0	0	92	81	63	26
Tidig blandning med baljväxter	41	11	33	40	0	1	1	0	88	65	59	29
Sen blandning med baljväxter	45	5	21	42	0	1	3	0	94	78	55	14
Tidig blandning utan baljväxter								0	99	100	100	28
Sen blandning utan baljväxter								0	100	100	100	20
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	37	5	13	34	0	0	3	0	95	86	63	23
Tidig blandning med baljväxter	45	8	27	43	0	1	2	0	92	72	55	29
Sen blandning med baljväxter	31	3	13	29	0	1	2	0	96	86	68	14
Tidig blandning utan baljväxter								0	100	100	99	30
Sen blandning utan baljväxter								0	100	100	100	14
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B	35	2	11	32	0	1	3	0	98	93	79	21
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1	41	8	24	39	0	1	1	0	95	85	75	24
-X-												
CV%												
OBS												
PROB F1												
PROB F2												
PROB F1*F2												
LSD F1												
LSD F2												
LSD F1*F2												

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).
Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.
Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönnare i färgen 2006-11-06.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVENSKES

LANTRUKSUNIVERSITETET

RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 063907

Förs.v:

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

SIDA 6

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:12

Skördeår:2007

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthegea) + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Timotej %, bot analys Sk 2	Timotej %, bot analys Sk 3	Ängssv. %, bot analys Sk 1	Ängssv. %, bot analys Sk 2	Ängssv. %, bot analys Sk 3	Gräs ogräs % bot Sk 1	Gräs ogräs % bot Sk 2	Gräs ogräs % bot Sk 3	Ört ogräs % bot Sk 1	Ört ogräs % bot Sk 2	Ört ogräs % bot Sk 3	Stubb %, bot analys Sk 1
F Ö R S Ö K S L E D:												
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	4	6	3	5	19	0	0	0	0	0	0	0
Tidig blandning med baljväxter S1	19	6	11	9	37	0	0	0	0	0	0	0
Sen blandning med baljväxter S1	3	3				0	0	0	0	0	0	0
Tidig blandning utan baljväxter S1	8	13	27	8	34	0	0	1	0	0	1	0
Sen blandning utan baljväxter S1	1	1				0	0	0	0	0	0	0
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	10	6	5	6	11	0	0	0	0	0	0	0
Tidig blandning med baljväxter S2	16	11	11	10	17	0	0	0	0	0	0	0
Sen blandning med baljväxter S2	2	3				0	0	0	0	0	0	0
Tidig blandning utan baljväxter S2	21	22	12	21	35	0	0	0	0	0	0	0
Sen blandning utan baljväxter S2	5	5				0	0	0	0	0	0	0
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	7	6	4	5	15	0	0	0	0	0	0	0
Tidig blandning med baljväxter S1	17	8	11	10	27	0	0	0	0	0	0	0
Sen blandning med baljväxter S1	2	3				0	0	0	0	0	0	0
Tidig blandning utan baljväxter S1	15	18	19	15	35	0	0	0	0	0	0	0
Sen blandning utan baljväxter S1	3	3				0	0	0	0	0	0	0
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B	7	6	13	7	30	0	0	0	0	0	0	0
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1	11	9	9	13	21	0	0	0	0	0	0	0
-X-												
CV%												
OBS												
PROB F1												
PROB F2												
PROB F1*F2												
LSD F1												
LSD F2												
LSD F1*F2												

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).
Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.
Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönare i färgen 2006-11-06.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 063907

Förs.v:

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

SIDA 7

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:12

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Insådd baljv % fält Sk 1	Insådd baljv % fält Sk 2	Insådd baljv % fält Sk 3	Röd klöver % fält Sk 1	Röd klöver % fält Sk 2	Röd klöver % fält Sk 3	Vit klöver % fält Sk 1	Vit klöver % fält Sk 2	Vit klöver % fält Sk 3	Insått gräs % fält Sk 1	Insått gräs % fält Sk 2	Insått gräs % fält Sk 3
F Ö R S Ö K S L E D:												
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	10	16	34	8	13	29	2	4	5	90	84	66
Tidig blandning med baljväxter	14	21	36	12	16	31	2	4	5	86	82	64
Sen blandning med baljväxter	10	12	29	8	9	24	2	3	5	91	88	71
Tidig blandning utan baljväxter										100	100	100
Sen blandning utan baljväxter										100	100	100
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	12	18	41	10	13	36	2	5	5	88	83	59
Tidig blandning med baljväxter	15	24	44	12	20	39	3	4	5	85	76	56
Sen blandning med baljväxter	10	11	33	8	8	28	2	3	5	90	89	68
Tidig blandning utan baljväxter										100	100	100
Sen blandning utan baljväxter										100	100	100
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	11	17	38	9	13	33	2	4	5	89	83	63
Tidig blandning med baljväxter	15	22	40	12	18	35	3	4	5	86	79	60
Sen blandning med baljväxter	10	12	31	8	9	26	2	3	5	90	89	69
Tidig blandning utan baljväxter										100	100	100
Sen blandning utan baljväxter										100	100	100
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B	11	16	33	9	13	28	2	3	5	93	91	80
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1	12	18	39	10	14	34	2	4	5	93	89	77
-X-												
CV%												
OBS												
PROB F1												
PROB F2												
PROB F1*F2												
LSD F1												
LSD F2												
LSD F1*F2												

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).
Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.
Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönnare i färgen 2006-11-06.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITETET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 063907

Förs.v:

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

SIDA 8

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:13

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:13

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Gräs ogräs % fält Sk 1	Gräs ogräs % fält Sk 2	Gräs ogräs % fält Sk 3	Ört ogräs % fält Sk 1	Ört ogräs % fält Sk 2	Ört ogräs % fält Sk 3	Vit- Klöver %, fält Sk 1	Vit- Klöver %, fält Sk 2	Vit- Klöver %, fält Sk 3	Timo- tej %, fält Sk 1	Timo- tej %, fält Sk 2	Timo- tej %, fält Sk 3
F Ö R S Ö K S L E D:												
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	S1	0	0	0	0	0	2	4	5	31	23	13
Tidig blandning med baljväxter	S1	0	0	0	0	0	2	4	5	30	26	15
Sen blandning med baljväxter	S1	0	0	0	0	0	2	3	5	33	15	5
Tidig blandning utan baljväxter	S1	0	0	0	0	0				35	34	23
Sen blandning utan baljväxter	S1	0	0	0	0	0				34	20	8
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	S2	0	0	0	0	0	2	5	5	31	25	11
Tidig blandning med baljväxter	S2	0	0	0	0	0	3	4	5	30	26	11
Sen blandning med baljväxter	S2	0	0	0	0	0	2	3	5	37	16	5
Tidig blandning utan baljväxter	S2	0	0	0	0	0				38	35	19
Sen blandning utan baljväxter	S2	0	0	0	0	0				36	20	6
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)		0	0	0	0	0	2	4	5	31	24	12
Tidig blandning med baljväxter		0	0	0	0	0	3	4	5	30	26	13
Sen blandning med baljväxter		0	0	0	0	0	2	3	5	35	15	5
Tidig blandning utan baljväxter		0	0	0	0	0				36	34	21
Sen blandning utan baljväxter		0	0	0	0	0				35	20	7
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B		0	0	0	0	0	2	3	5	33	24	13
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1		0	0	0	0	0	2	4	5	34	24	11
-X-												
CV%												
OBS												
PROB F1												
PROB F2												
PROB F1*F2												
LSD F1												
LSD F2												
LSD F1*F2												

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).
Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.
Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönare i färgen 2006-11-06.

				R E S U L T A T B L A N K E T T Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering Plan: L6-4562 Vallfröblandning för breddat skördefönster ADB-nr: 063907 Län-fnr: PS-107-2006 Förs.v:				SIDA 9 Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941 2007-12-17 15:13				Skördeår:2007			
Jbr-omr: 10 C				Gödsling kg				Medel N P K				Enl bilaga			
Sådatum : 2006-05-11				Vallår: 1				Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd				För-förfrukt:			
Jordart:				ph-värde:				Växtskydd				Försöksdesign:SP			
F Ö R S Ö K S L E D:				Ängs-svingel %, fält Sk 1	Ängs-svingel %, fält Sk 2	Ängs-svingel %, fält Sk 3	Eng. rajgräs fält, %fält, Sk 1	Eng. rajgräs fält, %fält, Sk 2	Eng. rajgräs fält, %fält, Sk 3	Buv Timo-tej %tej Sk 1	Buv Timo-tej Sk 2	Buv Timo-tej Sk 3	Buv Ängs-svingel Sk 1	Buv Ängs-svingel Sk 2	Buv Ängs-svingel Sk 3
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)				24	13	15	35	49	39	2	3	3	4	1	1
Tidig blandning med baljväxter				23	14	15	33	42	34	2	3	3	4	1	1
Sen blandning med baljväxter				S1			58	73	66	2	3	2			
Tidig blandning utan baljväxter				S1	24	16	20	41	50	2	3	3	4	1	1
Sen blandning utan baljväxter				S1			66	80	93	2	3	2			
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)				S2	23	14	19	35	44	2	2	3	5	1	1
Tidig blandning med baljväxter				S2	23	11	19	33	39	2	2	3	5	1	1
Sen blandning med baljväxter				S2			53	73	63	2	2	3			
Tidig blandning utan baljväxter				S2	21	16	29	41	49	2	2	3	5	1	1
Sen blandning utan baljväxter				S2			64	80	94	2	2	3			
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)					23	13	17	35	46	2	3	3	5	1	1
Tidig blandning med baljväxter					23	13	17	33	40	2	3	3	5	1	1
Sen blandning med baljväxter							56	73	64	2	3	3			
Tidig blandning utan baljväxter					23	16	24	41	49	2	3	3	5	1	1
Sen blandning utan baljväxter							65	80	93	2	3	3			
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B					24	14	17	47	59	2	3	3	4	1	1
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1					22	14	22	45	57	2	2	3	5	1	1
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
PROB F2															
PROB F1*F2															
LSD F1															
LSD F2															
LSD F1*F2															

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).
Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.
Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönnare i färgen 2006-11-06.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 063907

Förs.v:

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

SIDA 10

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:13

Skördeår:2007

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

	Buv Röd- klöver Sk 1	Buv Röd- klöver Sk 2	Buv Röd- klöver Sk 3	Buv Vit- klöver Sk 1	Buv Vit- klöver Sk 2	Buv Vit- klöver Sk 3	Buv Eng. rajgräs Sk 1	Buv Eng. rajgräs Sk 2	Buv Eng. rajgräs Sk 3	Skador % Sk 1	Skador % Sk 2	Skador % Sk 3
F Ö R S Ö K S L E D:												
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	2	3	5	2	6	7	3	4	3	0	0	0
Tidig blandning med baljväxter S1	2	4	6	2	6	7	4	4	3	0	0	0
Sen blandning med baljväxter S1	2	3	5	2	6	7	2	4	3	0	0	0
Tidig blandning utan baljväxter S1							4	4	3	0	0	0
Sen blandning utan baljväxter S1							2	4	2	0	0	0
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	2	2	5	2	5	7	4	4	3	0	0	0
Tidig blandning med baljväxter S2	3	4	6	2	5	7	4	4	3	0	0	0
Sen blandning med baljväxter S2	2	3	5	2	5	7	3	4	3	0	0	0
Tidig blandning utan baljväxter S2							4	4	3	0	0	0
Sen blandning utan baljväxter S2							3	4	3	0	0	0
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	2	3	5	2	6	7	4	4	3	0	0	0
Tidig blandning med baljväxter S1	3	4	6	2	6	7	4	4	3	0	0	0
Sen blandning med baljväxter S1	2	3	5	2	6	7	3	4	3	0	0	0
Tidig blandning utan baljväxter S1							4	4	3	0	0	0
Sen blandning utan baljväxter S1							3	4	3	0	0	0
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B	2	3	5	2	6	7	3	4	3	0	0	0
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1	2	3	5	2	5	7	4	4	3	0	0	0
-X-												
CV%												
OBS												
PROB F1												
PROB F2												
PROB F1*F2												
LSD F1												
LSD F2												
LSD F1*F2												

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).
Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.
Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönnare i färgen 2006-11-06.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANDBRUKSUNIVERSITETET

RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 063907

Förs.v:

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

SIDA 11

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:13

Skördeår:2007

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Sluten het föreg höst % 11-06	Sluten het vår % 04-21	Marktäc ins bv föreg höst % 11-06	Mark täckn ins bv vår % 04-21	Mark täckn gräs vår % 04-21	Råpro- tein g/kg ts Sk 1	Råpro- tein g/kg ts Sk 2	Råpro- tein g/kg ts Sk 3	Aska g/kg ts Sk 1	Aska g/kg ts Sk 2	Aska g/kg ts Sk 3	Smb. in vitro Sk 1
F Ö R S Ö K S L E D:												
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	100	100	5	5	95	113	101	141	78.7	81.3	103.0	91
Tidig blandning med baljväxter S1	100	100	7	8	93	107	107	133	76.7	84.7	96.7	89
Sen blandning med baljväxter S1	100	99	3	3	97	128	98	125	86.0	80.0	99.3	92
Tidig blandning utan baljväxter S1	100	100	0	0	100	127	120	118	84.0	79.0	88.3	86
Sen blandning utan baljväxter S1	100	99	0	0	100	143	109	121	88.0	79.3	96.7	90
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	100	100	7	6	94	87	112	152	75.0	85.7	103.7	87
Tidig blandning med baljväxter S2	100	100	8	9	91	85	126	133	73.7	90.3	92.7	83
Sen blandning med baljväxter S2	100	100	5	5	95	96	98	132	75.7	84.7	95.0	89
Tidig blandning utan baljväxter S2	100	100	0	0	100	102	124	108	76.0	80.3	79.3	81
Sen blandning utan baljväxter S2	100	100	0	0	100	115	127	107	83.3	87.3	85.3	86
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	100	100	6	5	95	100	107	147	76.8	83.5	103.3	89
Tidig blandning med baljväxter S1	100	100	7	8	92	96	116	133	75.2	87.5	94.7	86
Sen blandning med baljväxter S1	100	99	4	4	96	112	98	128	80.8	82.3	97.2	91
Tidig blandning utan baljväxter S1	100	100	0	0	100	114	122	113	80.0	79.7	83.8	83
Sen blandning utan baljväxter S1	100	99	0	0	100	129	118	114	85.7	83.3	91.0	88
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B	100	100	3	3	97	124	107	128	82.7	80.9	96.8	90
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1	100	100	4	4	96	97	118	126	76.7	85.7	91.2	85
-X-						110	112	127	79.7	83.3	94.0	87
CV%						6.6	8.9	6.6	4.2	3.1	4.1	2.1
OBS						30	30	30	30	30	30	30
PROB F1						.0111	.1976	.6671	.0392	.1924	.1022	.0243
PROB F2						.0001	.0049	.0001	.0005	.0017	.0001	.0001
PROB F1*F2						.8405	.4146	.0845	.3017	.3109	.1181	.7776
LSD F1						12	24	13	5.2	10.7	8.4	3
LSD F2						9	12	10	4.1	3.2	4.8	2
LSD F1*F2						13	18	15	5.7	5.7	7.0	3

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).
Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.
Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönare i färgen 2006-11-06.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

Vallfröblandning för breddat skördefönster

ADB-nr: 063907

Län-fnr: PS-107-2006

Förs.v:

SIDA 12

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:13

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

		Smb. in vitro	Smb. in vitro	Energi MJ/kg ts	Energi MJ/kg ts	Energi MJ/kg ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	NDF g/kg ts
F Ö R S Ö K S L E D:		Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	S1	82	82	11.3	10.5	10.8	11.6	10.7	10.6	11.7	10.4	10.2	544
Tidig blandning med baljväxter	S1	83	80	11.2	10.7	10.6	11.5	10.8	10.4	11.4	10.5	9.9	580
Sen blandning med baljväxter	S1	83	88	11.6	10.7	10.9	11.7	10.9	11.1	11.8	10.6	11.0	517
Tidig blandning utan baljväxter	S1	81	84	11.2	10.5	10.9	11.1	10.7	10.9	10.9	10.3	10.7	595
Sen blandning utan baljväxter	S1	80	89	11.6	10.2	11.3	11.5	10.6	11.3	11.5	10.0	11.3	540
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	S2	83	78	10.7	11.0	10.3	11.4	10.8	10.2	11.3	10.5	9.6	604
Tidig blandning med baljväxter	S2	82	80	10.4	10.9	10.4	11.0	10.6	10.5	10.7	10.3	9.9	643
Sen blandning med baljväxter	S2	87	83	11.1	11.0	10.7	11.6	11.2	10.6	11.6	11.0	10.3	570
Tidig blandning utan baljväxter	S2	83	86	10.6	11.1	10.8	10.7	10.8	11.2	10.3	10.5	10.9	636
Sen blandning utan baljväxter	S2	82	89	10.9	11.1	10.9	11.1	10.7	11.4	10.9	10.3	11.4	592
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)		83	80	11.0	10.7	10.6	11.5	10.8	10.4	11.5	10.5	9.9	574
Tidig blandning med baljväxter		83	80	10.8	10.8	10.5	11.2	10.7	10.4	11.1	10.4	9.9	612
Sen blandning med baljväxter		85	85	11.3	10.9	10.8	11.7	11.1	10.9	11.7	10.8	10.6	543
Tidig blandning utan baljväxter		82	85	10.9	10.8	10.9	10.9	10.7	11.0	10.6	10.4	10.8	616
Sen blandning utan baljväxter		81	89	11.2	10.7	11.1	11.3	10.6	11.4	11.2	10.2	11.4	566
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B		82	85	11.4	10.5	10.9	11.5	10.7	10.9	11.5	10.4	10.6	555
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1		83	83	10.7	11.0	10.6	11.2	10.8	10.8	10.9	10.5	10.4	609
-X-		83	84	11.0	10.8	10.8	11.3	10.8	10.8	11.2	10.4	10.5	582
CV%		2	2.2	2	2.1	1.2	1.7	1.7	2	2.6	2.6	2.9	2.4
OBS		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PROB F1		.1341	.2123	.0150	.0340	.0611	.0438	.3021	.4866	.0378	.2461	.2740	.0089
PROB F2		.0066	.0001	.0028	.7403	.0001	.0001	.0150	.0001	.0001	.0174	.0001	.0001
PROB F1*F2		.1432	.0423	.8585	.1328	.2641	.7126	.2668	.0337	.6454	.2423	.0429	.6919
LSD F1		3	3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	22
LSD F2		2	2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	17
LSD F1*F2		3	3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	24

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.

Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).

Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.

Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönare i färgen 2006-11-06.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

Vallfröblandning för breddat skördefönster

ADB-nr: 063907

Län-fnr: PS-107-2006

Förs.v:

SIDA 13

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2007-12-17 15:13

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	NDF g/kg ts Sk 2	NDF g/kg ts Sk 3	NDF g/kg ts NIR Sk 1	NDF g/kg ts NIR Sk 2	NDF g/kg ts NIR Sk 3	iNDF g/kg ts Sk 1	iNDF g/kg ts Sk 2	iNDF g/kg ts Sk 3				
F Ö R S Ö K S L E D:												
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	582	496	524	578	504	80	113	107				
Tidig blandning med baljväxter S1	578	530	552	575	528	78	108	122				
Sen blandning med baljväxter S1	581	506	498	564	485	49	108	97				
Tidig blandning utan baljväxter S1	605	549	573	602	547	62	103	81				
Sen blandning utan baljväxter S1	621	490	519	620	486	35	116	59				
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	547	533	589	533	520	110	89	109				
Tidig blandning med baljväxter S2	570	545	622	542	522	123	87	118				
Sen blandning med baljväxter S2	549	506	544	531	491	87	84	110				
Tidig blandning utan baljväxter S2	577	560	618	565	547	99	77	110				
Sen blandning utan baljväxter S2	566	502	579	550	499	81	68	92				
Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	565	515	556	556	512	95	101	108				
Tidig blandning med baljväxter S1	574	537	587	559	525	100	98	120				
Sen blandning med baljväxter S1	565	506	521	548	488	68	96	104				
Tidig blandning utan baljväxter S1	591	554	595	584	547	81	90	96				
Sen blandning utan baljväxter S1	594	496	549	585	493	58	92	75				
S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning B	593	514	533	588	510	61	110	93				
S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning C alt. 10-12 dagar efter 1	562	529	590	544	516	100	81	108				
-X-	578	522	562	566	513	80	95	100				
CV%	2.6	2.9	3.2	3.4	1.9	13.5	13.0	13.8				
OBS	30	30	30	30	30	30	30	30				
PROB F1	.0286	.1136	.0127	.0245	.2372	.0191	.0262	.1023				
PROB F2	.0065	.0001	.0001	.0088	.0001	.0001	.5612	.0007				
PROB F1*F2	.1531	.3449	.6660	.4122	.3161	.6879	.3674	.1360				
LSD F1	23	24	28	30	15	24	20	22				
LSD F2	18	18	22	23	12	13	15	17				
LSD F1*F2	26	26	31	33	17	20	22	24				

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.

Tunna glesa bestånd i led 1A, 1B & 1C jämfört med led 1D & 1E vid skörd 07-09 p.g.a. lägre N-giva (stråst 100 resp 60).

Datum för gradering av botanisk fältuppskattning led S2, skörd 2: 07-15.

Bra insådd, ev något högt bestånd, måttlig klöverandel (5-10 %) (led A-C), dominans av engelskt rajgräs samt 10 % ängs-svingel och 5 % timotej 2006-11-06. Led A grönare i färgen 2006-11-06.

R6/L6-4562. Vallfröblandningar för breddat skördefönster

Fröblandningarnas innehåll (kg/ha)

Art/sort	Anm.	A	B tidig	C sen	D tidig	E sen
Timotej						
Grindstad	tidigare än Ragnar	3	5		6	
Ragnar		6		4		5
Comtal	sen			4		5
Ängssvingel						
Sigmund		2	4		4,5	
Tyko		2	4		4,5	
Eng. rajgräs						
Helmer	medelsen 4 n	4				
Gunne	tidig 2 n		2		2,5	
Baristra	tidig 4 n		2		2,5	
Herbie	sen 2n			4,5		5
Tivoli	sen 4n			4,5		5
Rödklöver						
Titus			2			
Sara		2				
Vivi	senast			2		
Vitklöver						
Ramona		1	1	1		

Utförda gödslingar

ADB-nr: 063907
Serienr: L6-4562
Län-fnr: PS-107-2006

<u>Datum</u>	<u>Medel</u>	<u>kg/ha</u>				<u>N</u>	<u>P</u>	<u>K</u>
		<u>S1 ABC</u>	<u>S1 DE</u>	<u>S2 ABC</u>	<u>S2 DE</u>			
2007-04-17	PK 7-25	300	300	300	300		20	75
2007-04-24	NS 27-3 (Axan)	204		204		55		
2007-04-24	NS 27-3 (Axan)		370		370	100		
2007-05-30	NS 27-3 (Axan)	167				45		
2007-05-30	NS 27-3 (Axan)		296			80		
2007-06-07	NS 27-3 (Axan)			167		45		
2007-06-07	NS 27-3 (Axan)				296	80		
2007-07-10	NS 27-3 (Axan)	148				40		
2007-07-10	NS 27-3 (Axan)		222			60		
2007-07-10	Kalisalt 50	120	120					60
2007-07-16	NS 27-3 (Axan)			148		40		
2007-07-16	NS 27-3 (Axan)				222	60		
2007-07-16	Kalisalt 50			120	120			60

Skördeprognoser (körda med NIR)

ADB-nr: 063907

Serienr: L6-4562

Län-fnr: PS-107-2006

<u>Datum</u>	<u>Led</u>	<u>Råprotein g/kg ts</u>	<u>Energi för nöt- kreatur MJ/kg ts</u>	<u>NDF g/kg ts</u>
2007-05-22	S1 D	139	11,8	449
2007-05-29	S2 D	140	11,1	552
2007-05-29	S2 E	138	11,4	524
2007-07-02	S1 D	152	11,6	506
2007-08-22	S1 D	138	11,4	518
2007-09-05	S2 E	114	11,3	498