

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITETET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

Enl bilaga

SIDA 1

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2009-02-06 11:00

Skördeår:2008

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

<

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel Enl bilaga

Vallfröblandning för breddat skördefenster

Län-fnr: PS-107-2006

SIDA 2

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2009-02-06 11:00

Skördeår:2008

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3
F Ö R S Ö K S L E D:											
1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	100	100	100	100	100	100	100	100	19.2	14.1	11.7
1B. Tidig blandning med baljväxter S1	100	113	100	103	100	106	100	108	19.4	15.3	13.6
1C. Sen blandning med baljväxter S1	100	85	100	111	100	102	100	98	19.3	15.0	12.3
1D. Tidig blandning utan baljväxter S1	100	104	100	89	100	96	100	97	22.3	18.1	16.3
1E. Sen blandning utan baljväxter S1	100	79	100	118	100	78	100	90	23.2	18.2	15.6
2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	169	100	70	100	91	100	116	100	19.3	14.8	11.0
2B. Tidig blandning med baljväxter S2	158	105	73	108	92	107	114	106	22.4	15.1	12.8
2C. Sen blandning med baljväxter S2	170	85	66	105	95	107	111	94	18.1	14.8	12.7
2D. Tidig blandning utan baljväxter S2	163	101	87	112	87	93	120	101	26.0	18.8	16.4
2E. Sen blandning utan baljväxter S2	171	80	71	120	112	96	117	91	23.5	17.3	16.7
A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)		100		100		100		100	19.3	14.4	11.4
B. Tidig blandning med baljväxter		108		105		107		107	20.9	15.2	13.2
C. Sen blandning med baljväxter		85		109		105		96	18.7	14.9	12.5
D. Tidig blandning utan baljväxter		102		99		94		99	24.2	18.4	16.3
E. Sen blandning utan baljväxter		80		119		86		91	23.4	17.7	16.1
1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D	100		100		100		100		20.7	16.1	13.9
2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1	166		73		95		116		21.9	16.2	13.9
-X-											
CV%											
OBS											
PROB F1											
PROB F2											
PROB F1*F2											
LSD F1											
LSD F2											
LSD F1*F2											

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

SIDA 3

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2009-02-06 11:00

Skördeår:2008

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Insådd baljv. kg/ha Sk 1	Insådd baljv. kg/ha Sk 2	Insådd baljv. kg/ha Sk 3	Summa insådd baljv kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:											
1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	1450	2150	2270	5860	100	100	100	100	100	100	100
1B. Tidig blandning med baljväxter S1	1480	1710	2420	5600	100	102	100	79	100	107	100
1C. Sen blandning med baljväxter S1	920	1470	1470	3860	100	63	100	68	100	65	100
1D. Tidig blandning utan baljväxter S1											
1E. Sen blandning utan baljväxter S1											
2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	2460	1110	1690	5260	170	100	51	100	75	100	90
2B. Tidig blandning med baljväxter S2	3170	1180	2070	6420	214	129	69	107	86	122	115
2C. Sen blandning med baljväxter S2	3250	1130	1870	6260	354	132	77	103	127	111	162
2D. Tidig blandning utan baljväxter S2											
2E. Sen blandning utan baljväxter S2											
A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	1950	1630	1980	5560		100		100		100	
B. Tidig blandning med baljväxter	2320	1440	2250	6010		119		89		114	
C. Sen blandning med baljväxter	2080	1300	1670	5060		107		80		85	
D. Tidig blandning utan baljväxter											
E. Sen blandning utan baljväxter											
1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D	1280	1780	2050	5110	100		100		100		100
2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1	2960	1140	1880	5980	231		64		92		117
-X-	2120	1460	1970	5540							
CV%	6.1	7.2	3.9	4.3							
OBS	24	24	24	24							
PROB F1	.0001	.0007	.0570	.0059							
PROB F2	.0003	.0002	.0001	.0001							
PROB F1*F2	.0001	.0001	.0001	.0001							
LSD F1	190	140	180	390							
LSD F2	140	110	80	260							
LSD F1*F2	200	160	140	390							

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANDBRUKSUNIVERSITETET

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel Enl bilaga

SIDA 4

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2009-02-06 11:00

Skördeår:2008

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Rel-tal Summa Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Summa gräs kg/ha	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:											
1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	100	2850	1010	980	4850	100	100	100	100	100	100
1B. Tidig blandning med baljväxter S1	96	3360	1550	1020	5930	100	118	100	154	100	103
1C. Sen blandning med baljväxter S1	66	2730	2050	1850	6620	100	96	100	203	100	188
1D. Tidig blandning utan baljväxter S1		4460	2750	3080	10290	100	156	100	272	100	313
1E. Sen blandning utan baljväxter S1		3400	3740	2480	9620	100	119	100	370	100	252
2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	100	4810	1100	1250	7160	168	100	109	100	127	100
2B. Tidig blandning med baljväxter S2	122	4430	1190	1070	6690	132	92	77	108	105	85
2C. Sen blandning med baljväxter S2	119	2940	1190	1280	5420	108	61	58	108	69	102
2D. Tidig blandning utan baljväxter S2		7260	2420	2710	12400	163	151	88	220	88	216
2E. Sen blandning utan baljväxter S2		5690	2650	2830	11170	167	118	71	241	114	226
A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	100	3830	1050	1120	6000		100		100		100
B. Tidig blandning med baljväxter	108	3900	1370	1040	6310		102		130		93
C. Sen blandning med baljväxter	91	2840	1620	1570	6020		74		154		140
D. Tidig blandning utan baljväxter		5860	2590	2890	11340		153		245		259
E. Sen blandning utan baljväxter		4550	3190	2660	10400		119		303		237
1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D		3360	2220	1880	7460	100		100		100	
2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1		5030	1710	1830	8570	150		77		97	
-X-		4190	1970	1860	8010						
CV%		4.3	6.9	5.1	4						
OBS		40	40	40	40						
PROB F1		.0003	.0019	.3209	.0060						
PROB F2		.0001	.0001	.0001	.0001						
PROB F1*F2		.0001	.0001	.0001	.0001						
LSD F1		280	160	140	500						
LSD F2		190	140	100	330						
LSD F1*F2		280	200	150	500						

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel Enl bilaga

SIDA 5

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2009-02-06 11:00

Skördeår:2008

Vallfröblandning för breddat skördefenster

Län-fnr: PS-107-2006

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Insådd baljv % bot Sk 1	Insådd baljv % bot Sk 2	Insådd baljv % bot Sk 3	Röd klöver % bot Sk 1	Röd klöver % bot Sk 2	Röd klöver % bot Sk 3	Vit klöver % bot Sk 1	Vit klöver % bot Sk 2	Vit klöver % bot Sk 3
F Ö R S Ö K S L E D:											
1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	100	100	34	68	70	28	53	56	6	15	13
1B. Tidig blandning med baljväxter S1	100	122	31	52	70	28	42	63	3	10	7
1C. Sen blandning med baljväxter S1	100	137	25	42	44	17	27	30	8	14	14
1D. Tidig blandning utan baljväxter S1	100	212									
1E. Sen blandning utan baljväxter S1	100	198									
2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	148	100	34	50	57	31	45	51	3	6	7
2B. Tidig blandning med baljväxter S2	113	93	42	50	65	39	39	56	3	11	10
2C. Sen blandning med baljväxter S2	82	76	52	49	59	49	42	53	3	7	6
2D. Tidig blandning utan baljväxter S2	121	173									
2E. Sen blandning utan baljväxter S2	116	156									
A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)		100	34	59	64	29	49	54	4	10	10
B. Tidig blandning med baljväxter		105	36	51	68	33	40	60	3	11	8
C. Sen blandning med baljväxter		100	39	45	52	33	35	42	6	11	10
D. Tidig blandning utan baljväxter		189									
E. Sen blandning utan baljväxter		173									
1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D	100		30	54	61	24	41	50	6	13	11
2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1	115		43	50	61	40	42	53	3	8	8
-X-											
CV%											
OBS											
PROB F1											
PROB F2											
PROB F1*F2											
LSD F1											
LSD F2											
LSD F1*F2											

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

Gödsling kg

Medel Enl bilaga

SIDA 6

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2009-02-06 11:00

Skördeår:2008

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Övriga baljv % bot Sk 1	Övriga baljv % bot Sk 2	Övriga baljv % bot Sk 3	Gräs %, bot analys Sk 1	Gräs %, bot analys Sk 2	Gräs %, bot analys Sk 3	Timotej %, bot analys Sk 1	Timotej %, bot analys Sk 2	Timotej %, bot analys Sk 3	Ängssv. %, bot analys Sk 1	Ängssv. %, bot analys Sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:											
1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	0	0	0	66	32	30	17	12	6	10	8
1B. Tidig blandning med baljväxter S1	0	0	0	69	48	30	19	15	8	29	23
1C. Sen blandning med baljväxter S1	0	0	0	75	58	56	4	0	0		0
1D. Tidig blandning utan baljväxter S1	1	3	2	99	97	99	18	30	32	59	42
1E. Sen blandning utan baljväxter S1	0	0	1	100	100	99	6	7	3		0
2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	0	0	0	66	50	43	23	30	11	28	7
2B. Tidig blandning med baljväxter S2	0	0	0	58	50	34	19	32	12	26	12
2C. Sen blandning med baljväxter S2	0	0	0	48	51	41	3	1	2		0
2D. Tidig blandning utan baljväxter S2	1	0	1	99	98	99	34	67	35	50	21
2E. Sen blandning utan baljväxter S2	2	0	1	98	100	100	6	5	6		0
A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	0	0	0	66	41	36	20	21	9	19	8
B. Tidig blandning med baljväxter	0	0	0	64	49	32	19	24	10	27	17
C. Sen blandning med baljväxter	0	0	0	61	55	48	3	1	1		0
D. Tidig blandning utan baljväxter	1	1	1	99	98	99	26	49	33	54	32
E. Sen blandning utan baljväxter	1	0	1	99	100	99	6	6	4		0
1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D	0	1	1	82	67	63	13	13	10	33	15
2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1	0	0	0	74	70	63	17	27	13	35	8
-X-											
CV%											
OBS											
PROB F1											
PROB F2											
PROB F1*F2											
LSD F1											
LSD F2											
LSD F1*F2											

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

Vallfröblandning för breddat skördefönster

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel Enl bilaga

SIDA 7

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2009-02-06 11:00

Skördeår:2008

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Ångssv. %, bot analys Sk 3	Eng. rajgräs % bot Sk 1	Eng. rajgräs % bot Sk 2	Eng. rajgräs % bot Sk 3	Gräs ogräs % bot Sk 1	Gräs ogräs % bot Sk 2	Gräs ogräs % bot Sk 3	Ört ogräs % bot Sk 1	Ört ogräs % bot Sk 2	Ört ogräs % bot Sk 3	Insådd baljv % fält Sk 1
F Ö R S Ö K S L E D:											
1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	13	39	12	11	0	0	0	0	0	0	34
1B. Tidig blandning med baljväxter S1	18	22	9	3	0	0	0	0	0	0	30
1C. Sen blandning med baljväxter S1		71	58	55	0	0	0	0	0	0	36
1D. Tidig blandning utan baljväxter S1	60	22	25	7	0	0	0	0	0	0	
1E. Sen blandning utan baljväxter S1		94	93	96	0	0	0	0	0	0	
2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	21	15	13	10	0	0	0	0	0	0	39
2B. Tidig blandning med baljväxter S2	10	13	7	11	0	0	1	0	0	0	36
2C. Sen blandning med baljväxter S2		44	50	38	0	0	0	0	0	0	40
2D. Tidig blandning utan baljväxter S2	51	16	10	13	0	0	0	0	2	0	
2E. Sen blandning utan baljväxter S2		92	95	94	1	0	0	0	0	0	
A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	17	27	13	11	0	0	0	0	0	0	36
B. Tidig blandning med baljväxter	14	17	8	7	0	0	0	0	0	0	33
C. Sen blandning med baljväxter		58	54	47	0	0	0	0	0	0	38
D. Tidig blandning utan baljväxter	56	19	17	10	0	0	0	0	1	0	
E. Sen blandning utan baljväxter		93	94	95	0	0	0	0	0	0	
1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D	30	50	39	35	0	0	0	0	0	0	33
2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1	27	36	35	34	0	0	0	0	0	0	38
-X-											
CV%											
OBS											
PROB F1											
PROB F2											
PROB F1*F2											
LSD F1											
LSD F2											
LSD F1*F2											

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel Enl bilaga

SIDA 8

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2009-02-06 11:00

Skördeår:2008

Vallfröblandning för breddat skördefenster

Län-fnr: PS-107-2006

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Insådd baljv % fält Sk 2	Insådd baljv % fält Sk 3	Röd klöver % fält Sk 1	Röd klöver % fält Sk 2	Röd klöver % fält Sk 3	Vit klöver % fält Sk 1	Vit klöver % fält Sk 2	Vit klöver % fält Sk 3	Övriga baljv % fält Sk 2	Insått gräs % fält Sk 1	Insått gräs % fält Sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:											
1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	39	49	29	31	43	5	8	6		66	61
1B. Tidig blandning med baljväxter S1	30	46	25	24	40	5	7	6		70	70
1C. Sen blandning med baljväxter S1	27	49	31	20	43	5	7	6		64	74
1D. Tidig blandning utan baljväxter S1									4	100	97
1E. Sen blandning utan baljväxter S1									2	100	98
2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	36	59	34	31	54	5	5	5		61	64
2B. Tidig blandning med baljväxter S2	41	44	31	36	39	5	5	5		64	59
2C. Sen blandning med baljväxter S2	31	45	35	25	40	5	6	5		60	69
2D. Tidig blandning utan baljväxter S2									1	100	99
2E. Sen blandning utan baljväxter S2									1	100	99
A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	38	54	31	31	48	5	7	6		64	63
B. Tidig blandning med baljväxter	36	45	28	30	39	5	6	6		67	64
C. Sen blandning med baljväxter	29	47	33	22	42	5	7	6		62	71
D. Tidig blandning utan baljväxter									2	100	98
E. Sen blandning utan baljväxter									2	100	99
1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D	32	48	28	25	42	5	7	6	3	80	80
2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1	36	49	33	31	44	5	5	5	1	77	78
-X-											
CV%											
OBS											
PROB F1											
PROB F2											
PROB F1*F2											
LSD F1											
LSD F2											
LSD F1*F2											

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVENSKES

LAN

RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

Gödsling kg

Medel Enl bilaga

SIDA 9

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2009-02-06 11:00

Skördeår:2008

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Insått gräs % fält Sk 3	Vit-Klöver %, fält Sk 1	Vit-Klöver %, fält Sk 2	Vit-Klöver %, fält Sk 3	Timo-tej %, fält Sk 1	Timo-tej %, fält Sk 2	Timo-tej %, fält Sk 3	Ängs-svingel %, fält Sk 1	Ängs-svingel %, fält Sk 2	Ängs-svingel %, fält Sk 3	Eng.rajgräs fält, % Sk 1
F Ö R S Ö K S L E D:											
1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	51	5	8	6	10	14	14	28	31	18	29
1B. Tidig blandning med baljväxter S1	54	5	7	6	13	25	19	28	32	19	29
1C. Sen blandning med baljväxter S1	51	5	7	6	5	4	4				59
1D. Tidig blandning utan baljväxter S1	98				20	35	44	40	40	30	40
1E. Sen blandning utan baljväxter S1	99				4	5	8				96
2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	41	5	5	5	13	20	12	24	25	14	25
2B. Tidig blandning med baljväxter S2	56	5	5	5	15	21	19	26	24	20	23
2C. Sen blandning med baljväxter S2	55	5	6	5	10	3	4				50
2D. Tidig blandning utan baljväxter S2	100				20	39	39	40	38	31	40
2E. Sen blandning utan baljväxter S2	99				9	5	5				91
A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	46	5	7	6	11	17	13	26	28	16	27
B. Tidig blandning med baljväxter	55	5	6	6	14	23	19	27	28	19	26
C. Sen blandning med baljväxter	53	5	7	6	7	3	4				55
D. Tidig blandning utan baljväxter	99				20	37	41	40	39	30	40
E. Sen blandning utan baljväxter	99				6	5	6				94
1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D	70	5	7	6	10	17	18	32	34	22	51
2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1	70	5	5	5	13	17	16	30	29	22	46
-X-											
CV%											
OBS											
PROB F1											
PROB F2											
PROB F1*F2											
LSD F1											
LSD F2											
LSD F1*F2											

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
 Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
 Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
 Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde Gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

Eng. rajgräs fält, % Sk 2

Eng. rajgräs fält, % Sk 3

Gräs ogräs % fält Sk 1

Gräs ogräs % fält Sk 2

Gräs ogräs % fält Sk 3

Ört ogräs % fält Sk 1

Ört ogräs % fält Sk 2

Ört ogräs % fält Sk 3

Buv Timo-tej Sk 1

Buv Timo-tej Sk 2

Buv Timo-tej Sk 3

F Ö R S Ö K S L E D:

1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1

1B. Tidig blandning med baljväxter S1

1C. Sen blandning med baljväxter S1

1D. Tidig blandning utan baljväxter S1

1E. Sen blandning utan baljväxter S1

2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2

2B. Tidig blandning med baljväxter S2

2C. Sen blandning med baljväxter S2

2D. Tidig blandning utan baljväxter S2

2E. Sen blandning utan baljväxter S2

A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)

B. Tidig blandning med baljväxter

C. Sen blandning med baljväxter

D. Tidig blandning utan baljväxter

E. Sen blandning utan baljväxter

1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D

2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANDBRUKSUNIVERSITETET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel Enl bilaga

SIDA 12

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2009-02-06 11:00

Skördeår:2008

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Buv Eng. rajgräs Sk 3	Skador % Sk 1	Skador % Sk 2	Skador % Sk 3	Avg.fr-ekv, E. rajgr,% Sk 2	Sluten het föreg höst % 11-19	Sluten het vår % 05-05	Baljv fält föreg höst % 11-19	Rödkl fält föreg höst % 11-19	Vitkl fält föreg höst % 11-19	övr bv fält föreg höst % 11-19
F Ö R S Ö K S L E D:											
1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	3	0	0	0	15	100	97	20	15	5	0
1B. Tidig blandning med baljväxter S1	3	0	0	0	7	100	98	28	20	8	0
1C. Sen blandning med baljväxter S1	3	0	0	0	40	100	93	12	9	3	0
1D. Tidig blandning utan baljväxter S1	3	0	0	0	20	100	98				0
1E. Sen blandning utan baljväxter S1	3	0	0	0	60	100	92				0
2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	3	0	0	0	5	100	98	21	17	5	0
2B. Tidig blandning med baljväxter S2	3	0	0	0	0	100	98	23	18	5	0
2C. Sen blandning med baljväxter S2	3	0	0	0	15	100	95	13	10	4	0
2D. Tidig blandning utan baljväxter S2	3	0	0	0	3	100	98				0
2E. Sen blandning utan baljväxter S2	3	0	0	0	10	99	94				0
A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	3	0	0	0	10	100	98	21	16	5	0
B. Tidig blandning med baljväxter	3	0	0	0	4	100	98	25	19	6	0
C. Sen blandning med baljväxter	3	0	0	0	28	100	94	13	9	3	0
D. Tidig blandning utan baljväxter	3	0	0	0	12	100	98				0
E. Sen blandning utan baljväxter	3	0	0	0	35	99	93				0
1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D	3	0	0	0	28	100	96	20	15	5	0
2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1	3	0	0	0	7	100	96	19	15	4	0
-X-											
CV%											
OBS											
PROB F1											
PROB F2											
PROB F1*F2											
LSD F1											
LSD F2											
LSD F1*F2											

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITET

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

Medel Enl bilaga

SIDA 14

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2009-02-06 11:00

Skördeår:2008

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Mark täckn ängssv vår % 05-05	Marktäc eng. rajgr. vår % 05-05	Mark täckn gräsog vår % 05-05	Mark täckn örtog vår % 05-05	Råpro- tein g/kg ts Sk 1	Råpro- tein g/kg ts Sk 2	Råpro- tein g/kg ts Sk 3	Aska g/kg ts Sk 1	Aska g/kg ts Sk 2	Aska g/kg ts Sk 3	Smb. in vitro Sk 1
1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	36	35	0	0	147	177	185	76.0	90.3	104.0	89
1B. Tidig blandning med baljväxter S1	33	33	0	0	131	166	167	74.0	85.7	94.0	86
1C. Sen blandning med baljväxter S1		79	0	0	149	151	176	75.3	88.0	107.7	93
1D. Tidig blandning utan baljväxter S1	44	43	0	0	123	156	135	62.7	79.7	81.0	91
1E. Sen blandning utan baljväxter S1		97	0	0	125	135	136	66.3	77.0	90.7	99
2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	32	32	0	0	127	179	199	66.0	94.0	109.0	75
2B. Tidig blandning med baljväxter S2	32	32	0	0	103	162	180	63.0	89.0	98.7	73
2C. Sen blandning med baljväxter S2		79	0	0	128	150	186	73.7	94.3	112.7	78
2D. Tidig blandning utan baljväxter S2	42	42	0	0	77	139	144	51.3	75.7	80.3	75
2E. Sen blandning utan baljväxter S2		96	0	0	97	131	144	56.7	85.0	94.3	86
A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	34	33	0	0	137	178	192	71.0	92.2	106.5	82
B. Tidig blandning med baljväxter	33	33	0	0	117	164	174	68.5	87.3	96.3	79
C. Sen blandning med baljväxter		79	0	0	139	151	181	74.5	91.2	110.2	86
D. Tidig blandning utan baljväxter	43	43	0	0	100	147	140	57.0	77.7	80.7	83
E. Sen blandning utan baljväxter		97	0	0	111	133	140	61.5	81.0	92.5	93
1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D	37	57	0	0	135	157	160	70.9	84.1	95.5	92
2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1	35	56	0	0	107	152	171	62.1	87.6	99.0	77
-X-					121	155	165	66.5	85.9	97.2	84
CV%					6.0	4.4	4.3	5.3	3.5	4.3	2.9
OBS					30	30	30	30	30	30	30
PROB F1					.0086	.1941	.1062	.0207	.1412	.2194	.0115
PROB F2					.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
PROB F1*F2					.0520	.1886	.9125	.1467	.0320	.7298	.5201
LSD F1					11	11	16	5.5	6.3	8.6	7
LSD F2					9	8	9	4.3	3.7	5.1	3
LSD F1*F2					13	12	13	6.0	5.4	7.5	5

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

Vallfröblandning för breddat skördefönster

ADB-nr: 065687

Län-fnr: PS-107-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel
Enl bilaga

SIDA 15

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941
2009-02-06 11:00

Sådatum : 2006-05-11
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)
För-förfrukt:
Jordart: mmh Må Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Smb. in vitro	Smb. in vitro	Energi MJ/kg ts	Energi MJ/kg ts	Energi MJ/kg ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts
F Ö R S Ö K S L E D:	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3
1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	78	78	11.7	10.3	9.9	11.4	10.2	10.0	11.4	9.6	9.5
1B. Tidig blandning med baljväxter S1	79	78	11.4	10.3	10.0	11.1	10.4	10.1	10.9	9.9	9.6
1C. Sen blandning med baljväxter S1	79	80	11.8	10.4	10.1	11.8	10.4	10.2	12.0	9.9	9.7
1D. Tidig blandning utan baljväxter S1	87	85	11.5	10.9	10.5	11.8	11.2	11.0	11.9	11.1	10.8
1E. Sen blandning utan baljväxter S1	82	89	12.2	10.6	10.6	12.6	10.8	11.3	13.0	10.4	11.2
2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	81	79	10.3	10.3	9.3	10.2	10.4	10.1	9.4	10.0	9.6
2B. Tidig blandning med baljväxter S2	77	81	10.1	10.1	9.7	10.0	10.2	10.3	9.2	9.6	9.9
2C. Sen blandning med baljväxter S2	83	84	10.6	10.3	10.1	10.3	10.6	10.5	9.8	10.3	10.2
2D. Tidig blandning utan baljväxter S2	87	87	9.9	11.0	10.5	10.3	11.3	11.2	9.5	11.1	11.1
2E. Sen blandning utan baljväxter S2	90	90	11.3	11.2	10.6	11.4	11.3	11.3	11.2	11.4	11.3
A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	79	78	11.0	10.3	9.6	10.8	10.3	10.1	10.4	9.8	9.5
B. Tidig blandning med baljväxter	78	79	10.8	10.2	9.9	10.6	10.3	10.2	10.1	9.7	9.7
C. Sen blandning med baljväxter	81	82	11.2	10.4	10.1	11.1	10.5	10.3	10.9	10.1	10.0
D. Tidig blandning utan baljväxter	87	86	10.7	10.9	10.5	11.0	11.2	11.1	10.7	11.1	10.9
E. Sen blandning utan baljväxter	86	90	11.8	10.9	10.6	12.0	11.1	11.3	12.1	10.9	11.3
1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D	81	82	11.7	10.5	10.2	11.8	10.6	10.5	11.8	10.2	10.2
2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1	83	84	10.5	10.6	10.0	10.4	10.7	10.7	9.8	10.5	10.4
-X-	82	83	11.1	10.6	10.1	11.1	10.7	10.6	10.8	10.3	10.3
CV%	3.3	2.8	2	2.0	1.8	2.1	2.3	2.3	3.4	3.8	3.4
OBS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PROB F1	.4160	.1939	.0066	.3523	.0972	.0110	.4459	.3157	.0100	.3852	.2703
PROB F2	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
PROB F1*F2	.0735	.8579	.1389	.0385	.0401	.4743	.1570	.8203	.5141	.1359	.8613
LSD F1	10	5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.8	0.5	0.9	1.2	0.7
LSD F2	3	3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4
LSD F1*F2	6	4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.8	0.6

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.

SLU

LANTRUKSUNIVERSITETEN

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITETEN

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4562

ADB-nr: 065687

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel N P K

Enl bilaga

SIDA 16

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0325-40354, 0708-290941

2009-02-06 11:00

Skördeår:2008

Vallfröblandning för breddat skördefönster

Län-fnr: PS-107-2006

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	NDF g/kg ts Sk 1	NDF g/kg ts Sk 2	NDF g/kg ts Sk 3	NDF g/kg ts NIR Sk 1	NDF g/kg ts NIR Sk 2	NDF g/kg ts NIR Sk 3	iNDF g/kg NDF Sk 1	iNDF g/kg NDF Sk 2	iNDF g/kg NDF Sk 3		
F Ö R S Ö K S L E D:											
1A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S1	375	482	529	389	478	531	80	142	137		
1B. Tidig blandning med baljväxter S1	454	503	558	457	493	548	80	148	131		
1C. Sen blandning med baljväxter S1	349	514	537	357	504	541	82	156	106		
1D. Tidig blandning utan baljväxter S1	498	567	594	480	541	590	43	92	109		
1E. Sen blandning utan baljväxter S1	358	562	553	351	540	554	28	103	88		
2A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006) S2	499	515	541	529	491	571	178	117	144		
2B. Tidig blandning med baljväxter S2	571	501	512	567	503	567	173	159	156		
2C. Sen blandning med baljväxter S2	469	492	537	489	489	544	152	124	118		
2D. Tidig blandning utan baljväxter S2	644	555	592	648	533	584	139	114	113		
2E. Sen blandning utan baljväxter S2	500	506	540	496	487	540	91	86	83		
A. Standardblandning SW 944 (sort enligt 2006)	437	498	535	459	485	551	129	129	141		
B. Tidig blandning med baljväxter	513	502	535	512	498	557	126	154	144		
C. Sen blandning med baljväxter	409	503	537	423	496	542	117	140	112		
D. Tidig blandning utan baljväxter	571	561	593	564	537	587	91	103	111		
E. Sen blandning utan baljväxter	429	534	547	424	513	547	59	95	85		
1. S1 = skörd vid ca 11 MJ för blandning D	407	526	554	407	511	553	62	128	114		
2. S2 = skörd vid ca 11 MJ för blandning E alt. 10-12 dagar efter 1	537	514	544	546	500	561	147	120	123		
-X-	472	520	549	476	506	557	104	124	119		
CV%	4.2	2.7	5.5	4.2	2.5	2.4	11.3	12.4	10		
OBS	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
PROB F1	.0032	.1492	.4689	.0028	.1429	.2436	.0040	.3501	.1872		
PROB F2	.0001	.0001	.0200	.0001	.0001	.0003	.0001	.0001	.0001		
PROB F1*F2	.6113	.0010	.5692	.2172	.0025	.0223	.0614	.0321	.3036		
LSD F1	31	22	48	32	20	21	23	30	19		
LSD F2	24	17	37	25	15	17	14	19	14		
LSD F1*F2	35	24	53	35	22	24	21	27	21		

ANM: Sorter och utsädesmängder enl bilaga. Skördeprognoser enl bilaga.
Led C och E hög andel av engelskt rajgräs i ax samt ganska svagt bestånd i S1 07-09.
Mycket bra bestånd med relativt små skillnader mellan leden 08-28.
Övriga baljväxter i led D och E: Vitklöver.

R6/L6-4562. Vallfröblandningar för breddat skördefönster

Fröblandningarnas innehåll (kg/ha)

Art/sort	Anm.	A	B tidig	C sen	D tidig	E sen
Timotej						
Grindstad	tidigare än Ragnar	3	5		6	
Ragnar		6		4		5
Comtal	sen			4		5
Ängssvingel						
Sigmund		2	4		4,5	
Tyko		2	4		4,5	
Eng. rajgräs						
Helmer	medelsen 4 n	4				
Gunne	tidig 2 n		2		2,5	
Baristra	tidig 4 n		2		2,5	
Herbie	sen 2n			4,5		5
Tivoli	sen 4n			4,5		5
Rödklöver						
Titus			2			
Sara		2				
Vivi	senast			2		
Vitklöver						
Ramona		1	1	1		

Utförda gödslingar

ADB-nr: 065687
Serienr: L6-4562
Län-fnr: PS-107-2006

<u>Datum</u>	<u>Medel</u>	<u>kg/ha</u>				<u>N</u>	<u>P</u>	<u>K</u>
		<u>S1 ABC</u>	<u>S1 DE</u>	<u>S2 ABC</u>	<u>S2 DE</u>			
2008-04-21	PK 7-25	400	400	400	400		26	100
2008-04-23	NS 27-3 (Axan)	204		204		55		
2008-04-23	NS 27-3 (Axan)		370		370	100		
2008-06-03	NS 27-3 (Axan)	167				45		
2008-06-03	NS 27-3 (Axan)		296			80		
2008-06-13	NS 27-3 (Axan)			167		45		
2008-06-13	NS 27-3 (Axan)				296	80		
2008-07-10	NS 27-3 (Axan)	148				40		
2008-07-10	NS 27-3 (Axan)		222			60		
2008-07-10	Kalisalt 50	140	140					70
2008-07-22	NS 27-3 (Axan)			148		40		
2008-07-22	NS 27-3 (Axan)				222	60		
2008-07-22	Kalisalt 50			140	140			70

Skördeprognoser (körda med NIR)

ADB-nr: 065687

Serienr: L6-4562

Län-fnr: PS-107-2006

<u>Datum</u>	<u>Led</u>	<u>Råprotein g/kg ts</u>	<u>Energi för nöt- kreatur MJ/kg ts</u>	<u>NDF g/kg ts</u>
2008-05-22	S1 D	146	11,9	416
2008-05-27	S2 D	135	11,8	444
2008-05-27	S2 E	127	12,1	380
2008-07-04	S1 D	165	11,0	523
2008-07-11	S2 E	180	11,8	455
2008-08-20	S1 D	134	10,2	549
2008-09-02	S2 E	144	11,3	506