



RESULTAT

FÄLTFÖRSÖK

Försök i Väst

2010

L13-7161-09

PS-122-2010

F30601

1

Skördeteknikförsök i slåttervall, snigel i ensilage

Bengt Johansson

Skogåkra gård, Horred

GRÖDA: Slåttervall

SÅDATUM:

SORT:

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

FÖRFRUKT:

JORDART:

pH-värde:

K/mg-kvot:

P-AL:

Mullhalt:

K-AL:

Lerhalt:

Mg-AL:

Sand/Grovmo:

Ca-AL:

T:

P-HCl:

S:

K-HCl:

Cu-HCl:

Avräkning innan slåtter blockvis på 2 ställen per m²

I Dero sp: 4 st/0,2 g Ario sp: 2 st/0,1 g Ario lus: 4 st/16,2 g

II Dero sp: 28 st/4,0 g Ario sp: 16 st/3,4 g Ario lus: 6 st/34,63 g

III Dero sp: 36 st/3,1 g Ario sp: 12 st/1,6 g Ario lus: 2 st/8,8 g

IV Dero sp: 36 st/4,6 g Ario sp: 2 st/0,84 g Ario lus: 6 st/23,4 g

F Ö R S Ö K S L E D:	2:a Skörd ts kg/ha 08-09	Relativ Skörd total F1	Arionlus synliga under sträng per m ²	Dero- ceras sp antal per m ²	Dero- ceras sp antal per m ²	Dero- ceras sp vikt g per m ²	Dero- ceras sp vikt g per m ²	Arion sp antal per m ²	Arion sp antal per m ²	Arion sp vikt g per m ²	Arion sp vikt g per m ²
A Normal slåtter - enkel sträng, förtorkning ca 1 dag	3520	100	0,6	2,0	0,5	0,5	0,1	0,5	0,1	0,2	0,1
B Normal slåtter - enkel sträng, förtorkning ca 2 dagar	3460	98	0,5	3,0	1,4	0,5	0,3	2,0	0,3	0,7	0,1
C Slåtter med sammanslagning av sträng, (dubbelsträng) förtorkning 3 dagar	3360	96	0,2	8,0	0,7	1,8	0,1	2,5	0,2	0,5	0,0
D Slåtter med sammanslagn. av sträng, strängluftn, (luftad dubbelsträng)*	4090	116	0,2	5,5	0,6	1,4	0,2	1,0	0,0	0,3	0,0
E Bredspredning vid slåtter, förtorkning 1 dag, strängning	3860	110	0,2	3,0	0,1	0,8	0,0	1,0	0,1	0,2	0,0
* Led D Förtorkning 2 dagar	3890		0,4	2,0	0,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
-X-	3660										
CV%	20,6										
OBS	20										
Prob. BLOCK	-										
Prob. F1	-										
LSD F1	1160										

ANSVARIG: Jordbruksverket, Eva Mellkvist

Vall I 2:a. 08-09 slåtter 13.30-14.15, 0810 E Räfsning 12.00-12.15, 08-10 D Luftning 12.20-12.35

08-10 A.E avräkning 14.00-17.00, 08-11 B. D Avräkning 9.00-12.00, 08-12 C Avräkning 14.00-16.00

Botanisk analys 08-09: Gräs 90%, klöver 9 %, örtogräs 1 %.

Ruta 1, 6, 8, 14 Arion lus döda ingår i räkningen.



RESULTAT

FÄLTFÖRSÖK

Försök i Väst

2010

L13-7161-09

PS-122-2010

F30601

2

Skördeteknikförsök i slättervall, snigel i ensilage

Bengt Johansson

Skogåkra gård, Horred

GRÖDA: Slättervall

SÅDATUM:

SORT:

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

FÖRFRUKT:

JORDART:

pH-värde:

K/mg-kvot:

P-AL:

Mullhalt:

K-AL:

Lerhalt:

Mg-AL:

Sand/Grovmo:

Ca-AL:

T:

P-HCl:

S:

K-HCl:

Cu-HCl:

Avräkning innan slätter blockvis på 2 ställen per m²

I Dero sp: 4 st/0,2 g Arion sp: 2 st/0,1 g Arion lus: 4 st/16,2 g

II Dero sp: 28 st/4,0 g Arion sp: 16 st/3,4 g Arion lus: 6 st/34,63 g

III Dero sp: 36 st/3,1 g Arion sp: 12 st/1,6 g Arion lus: 2 st/8,8 g

IV Dero sp: 36 st/4,6 g Arion sp: 2 st/0,84 g Arion lus: 6 st/23,4 g

F Ö R S Ö K S L E D:

A Normal slätter - enkel sträng, förtorkning ca 1 dag
B Normal slätter - enkel sträng, förtorkning ca 2 dagar
C Slätter med sammanslagning av sträng, (dubbelsträng) förtorkning 3 dagar
D Slätter med sammanslagning av sträng, strängluftn, (luftad dubbelsträng)*
E Bredspredning vid slätter, förtorkning 1 dag, strängning
* Led D Förtorkning 2 dagar

-X-

CV%

OBS

Prob. BLOCK

Prob. F1

LSD F1

Arion lus antal per m ²	Arion lus antal per m ²	Arion lus vikt g per m ²	Arion lus vikt g per m ²	I mark Dero. sp antal per m ²	I mark Dero. sp vikt g per m ²	I mark Arion sp antal per m ²	I mark Arion sp vikt g per m ²	I mark Arion lu antal per m ²	I mark Arion lu vikt g per m ²	I sträng Dero. sp antal per m ²
3,5	0,1	23,7	0,5	2,0	0,5	0,5	0,2	3,5	23,7	0,5
2,0	0,4	13,4	2,4	3,0	0,5	2,0	0,7	2,0	13,4	1,4
1,5	0,1	10,3	0,3	8,0	1,8	2,5	0,5	1,5	10,3	0,7
3,5	0,1	22,9	0,9	5,5	1,4	1,0	0,3	3,5	22,9	0,6
3,0	0,0	6,7	0,2	3,0	0,8	1,0	0,2	3,0	6,7	0,1
4,0	0,2	24,8	0,7	2,0	0,6	0,0	0,0	4,0	24,8	0,1

ANSVARIG: Jordbruksverket, Eva Mellkvist

Vall I 2:a. 08-09 slätter 13.30-14.15, 0810 E Räfsning 12.00-12.15, 08-10 D Luftning 12.20-12.35

08-10 A.E avräkning 14.00-17.00, 08-11 B. D Avräkning 9.00-12.00, 08-12 C Avräkning 14.00-16.00

Botanisk analys 08-09: Gräs 90%, klöver 9 %, örtogräs 1 %.

Ruta 1, 6, 8, 14 Arion lus döda ingår i räkningen.



RESULTAT
FÄLTFÖRSÖK
Försök i Väst

2010

L13-7161-09

PS-122-2010

F30601

3

Skördeteknikförsök i slåttervall, snigel i ensilage

Bengt Johansson

Skogåkra gård, Horred

GRÖDA: Slåttervall

SÅDATUM:

SORT:

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

FÖRFRUKT:

JORDART:

pH-värde:

K/mg-kvot:

P-AL:

Mullhalt:

K-AL:

Lerhalt:

Mg-AL:

Sand/Grovmo:

Ca-AL:

T:

P-HCl:

S:

K-HCl:

Cu-HCl:

Avräkning innan slåtter blockvis på 2 ställen per m²

I Dero sp: 4 st/0,2 g Arion sp: 2 st/0,1 g Arion lus: 4 st/16,2 g

II Dero sp: 28 st/4,0 g Arion sp: 16 st/3,4 g Arion lus: 6 st/34,63 g

III Dero sp: 36 st/3,1 g Arion sp: 12 st/1,6 g Arion lus: 2 st/8,8 g

IV Dero sp: 36 st/4,6 g Arion sp: 2 st/0,84 g Arion lus: 6 st/23,4 g

F Ö R S Ö K S L E D:

A Normal slåtter - enkel sträng, förtorkning ca 1 dag
B Normal slåtter - enkel sträng, förtorkning ca 2 dagar
C Slåtter med sammanslagning av sträng, (dubbelsträng) förtorkning 3 dagar
D Slåtter med sammanslagning av sträng, strängluftning, (luftad dubbelsträng)*
E Bredspredning vid slåtter, förtorkning 1 dag, strängning
* Led D Förtorkning 2 dagar

-X-

CV%

OBS

Prob. BLOCK

Prob. F1

LSD F1

I sträng	I sträng	I sträng	I sträng	I sträng	Ts-halt					
Dero. sp	Arion sp	Arion sp	Arion sp	Arion lu	Arion lu					
vikt g	antal	vikt g	antal	vikt g	%					
per m ²	per m ²	per m ²	per m ²	per m ²	per m ²					
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	39,4				
0,3	0,3	0,1	0,4	2,4	24,5					
0,1	0,2	0,0	0,1	0,3	24,9					
0,2	0,0	0,0	0,1	0,9	26,6					
0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	40,9					
0,1	0,0	0,0	0,2	0,7	26,1					

ANSVARIG: Jordbruksverket, Eva Mellkvist

Vall I 2:a. 08-09 slåtter 13.30-14.15, 0810 E Räfsning 12.00-12.15, 08-10 D Luftning 12.20-12.35

08-10 A.E avräkning 14.00-17.00, 08-11 B. D Avräkning 9.00-12.00, 08-12 C Avräkning 14.00-16.00

Botanisk analys 08-09: Gräs 90%, klöver 9 %, örtogräs 1 %.

Ruta 1, 6, 8, 14 Arion lus döda ingår i räkningen.