

Ogräsbekämpning vid fånggrödeinsådd i höstvet, 2001



F35121 Badene, Kvänum

Normal-sen

Tidig

0 - 100 okulär bedömning
relativtal A6=99 g/m²

	Monitor 18,75 g + vätm	Monitor 25 g + vätm	Starane 0,6 l	Express 1,5 t.+ Starane 0,5 l+ vätm	Express 2,0 t. + Platform 40 g	Ariane 2,5 l	Duplosan Super 2,5 l	Ally Class 50 g	Primus 0,1 l	Monitor 18,75 g + vätm	medel
Tidig sådd, före tidig behandling	1	2	5	6	7	8	9	3	4	10	
Engelsk rajgräs, Helmer	53	59	59	100	71	82	65	41	76	59	66
Engelsk rajgräs, Condesa	41	41	53	65	53	53	53	47	47	41	49
Italienskt rajgräs	53	41	65	76	59	88	59	41	41	76	60
Ängssvingel	82	47	88	76	76	106	82	53	94	59	76
Eng. raj. Helmer , utan myllning	47	47	71	65	71	65	65	41	59	71	60
medel	55	47	67	76	66	79	65	45	64	61	
Sen sådd, efter tidig behandling											
Engelsk rajgräs, Helmer	53	24	41	35	53	29	29	29	41	35	37
Italienskt rajgräs	35	41	76	65	53	65	53	47	59	53	55
medel	44	32	59	50	53	47	41	38	50	44	