

Ogräsbekämpning vid fånggrödeinsådd i höstvet, 2001

F35131 Nygård, Vargön

Normal-sen



0 - 100 okulär bedömning relativtal A6=170 g/m ²	Normal-sen							Tidig			
	Monitor 18,75 g + vätm	Monitor 25 g + vätm	Starane 0,6 l	Express 1,5 t.+ Starane 0,5 l+ vätm	Express 2,0 t. + Platform 40 g	Ariane 2,5 l	Duplosan Super 2,5 l	Ally Class 50 g	Primus 0,1 l	Monitor 18,75 g + vätm	
Tidig sådd, före tidig behandling	1	2	5	6	7	8	9	3	4	10	medel
Engelsk rajgräs, Helmer	105	95	140	100	135	120	120	125	115	110	117
Engelsk rajgräs, Condesa	90	80	125	115	105	135	140	110	130	110	114
Italienskt rajgräs	110	100	145	125	145	135	135	145	140	155	134
Ängssvingel	105	80	125	110	120	130	120	115	150	135	119
Eng. raj. Helmer , utan myllning	110	85	115	135	125	145	120	135	145	135	125
medel	104	88	130	117	126	133	127	126	136	129	
Sen sådd, efter tidig behandling											
Engelsk rajgräs, Helmer	115	85	115	120	130	145	125	130	140	130	124
Italienskt rajgräs	130	100	135	120	145	150	150	150	140	155	138
medel	123	93	125	120	138	148	138	140	140	143	