

# Ogräsbekämpning vid fånggrödeinsådd i höstvete, 2001



F35141 Hökatorp, Götene

Normal-sen

0 - 100 okulär bedömning  
relativtal    A6=242 g/m<sup>2</sup>

	Normal-sen								Tidig			medel
	1 Monitor 18,75 g + vätm	2 Monitor 25 g + vätm	5 Starane 0,6 l	6 Express 1,5 t.+ Starane 0,5 l+ vätm	7 Express 2,0 t. + Platform 40 g	8 Ariane 2,5 l	9 Duplosan Super 2,5 l	3 Ally Class 50 g	4 Primus 0,1 l	10 Monitor 18,75 g + vätm		
Tidig sådd, före tidig behandling	1	2	5	6	7	8	9	3	4	10		
Engelsk rajgräs, Helmer	120	40	75	100	50	90	70	50	80	40	72	
Engelsk rajgräs, Condesa	50	35	40	45	45	75	40	50	50	35	47	
Italienskt rajgräs	130	70	90	95	105	115	90	80	125	50	95	
Ängssvingel	50	25	35	65	35	65	45	45	55	60	48	
Eng. raj. Helmer , utan myllning	70	65	70	65	70	65	60	50	65	75	66	
medel	84	47	62	74	61	82	61	55	75	52		
Sen sådd, efter tidig behandling												
Engelsk rajgräs, Helmer	40	25	35	25	25	35	35	30	45	35	33	
Italienskt rajgräs	40	40	65	70	60	55	45	60	60	70	57	
medel	40	33	50	48	43	45	40	45	53	53		