

Ogräsbekämpning vid fånggrödeinsådd i höstvetete, 2003

F35202 Badene egendom,Kvänum		Höst 30/10				Normal-sen 17/5		Tidig 22/4				
0-100 okulär bedömning relativtal A1=350 kg ts/ha		0,75 l Cougar	20 g Lexus 50 WG + 0,1 l vätnedel	0,75 l Bacara	1,25 l Bacara	1,5 tab. Express + 0,5 l Starane + vätnedel	18,75 g Monitor + vätnedel	0,5 l Cougar + 15 g Gratil + 0,1 l vätnedel	1,0 l Event Super + 0,1 l vätnedel	50 g Ally Class		
Tidig sådd, före tidig behandling		2	3	7	8	1	9	5	4	6	medel	
Engelsk rajgräs, Helmer		100	156	106	94	100	75	106	50	94	98	
Rödsvingel vid höstvetesådd		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Italienskt rajgräs		69	119	94	69	100	75	81	88	113	90	
Ängssvingel		25	66	19	31	38	25	25	22	50	33	
Eng. raj. Helmer , med myllning		78	103	94	56	100	88	100	88	100	90	
Eng. raj. Helmer + rödklöver		88	138	119	100	113	88	106	56	119	103	
Eng. raj. Helmer + vitklöver		56	106	94	69	81	66	106	50	75	78	
medel		59	98	75	60	76	59	75	51	79		
Sen sådd, efter tidig behandling												
Engelsk rajgräs, Helmer		47	113	88	41	131	75	81	33	103	79	
Italienskt rajgräs		81	100	100	81	144	81	113	88	131	102	
medel		64	106,25	94	61	138	78	97	60	117,19		
0 - 100 okulär bedömning av klöver												
Eng. raj. Helmer + rödklöver		60	60	80	40	30	100	40	50	120	64	
Eng. raj. Helmer + vitklöver		130	250	100	90	100	260	30	130	120	134	