

Ogräsbekämpning vid fånggrödeinsådd i höstvetete, 2003

F35212 Hökatorp, Götene					Höst 30/10					Normal-sen 18/5		Tidig 7/4				Försök i Väst  ÖFRS LÄN
0-100 okulär bedömning relativtal A1=613 kg ts/ha					0,75 l Cougar	20 g Lexus 50 WG + 0,1 l vätmedel	0,75 l Bacara	1,25 l Bacara	1,5 tab. Express + 0,5 l Starane + vätmedel	18,75 g Monitor + vätmedel	0,5 l Cougar + 15 g Gratil + 0,1 l vätmedel	1,0 l Event Super + 0,1 l vätmedel	50 g Ally Class			
Tidig sådd, före tidig behandling					2	3	7	8	1	9	5	4	6	medel		
Engelsk rajgräs, Helmer					71	76	90	100	100	71	105	67	133	90		
Rödsvingel vid höstvetesådd					29	26	21	21	26	10	10	21	24	21		
Italienskt rajgräs					138	138	133	138	143	143	129	143	157	140		
Ängssvingel					52	36	52	62	50	26	62	43	86	52		
Eng. raj. Helmer , med myllning					69	64	67	83	86	67	81	57	105	75		
Eng. raj. Helmer + rödklöver					74	81	67	67	95	81	83	62	119	81		
Eng. raj. Helmer + vitklöver					95	95	64	105	95	95	110	86	124	97		
medel					76	74	71	82	85	70	83	68	107			
Sen sådd, efter tidig behandling																
Engelsk rajgräs, Helmer					50	40	52	62	81	62	86	52	110	66		
Italienskt rajgräs					86	105	71	81	110	105	110	86	143	99		
medel					68	73	62	71	95	83	98	69	126			
0 - 100 okulär bedömning av klöver																
Eng. raj. Helmer + rödklöver					51	38	54	74	22	100	5	46	35	47		
Eng. raj. Helmer + vitklöver					28	31	38	46	18	54	2	28	31	31		