

Ogräsbekämpning vid fånggrödeinsådd i höstvetete, 2003

F352122 Kampetorp1, Grästorp					Höst 2/10					Normal-sen 18/5		Tidig 23/4				
0 - 100 okulär bedömning A1=286 g/m² grönmassa					0,75 l Cougar	20 g Lexus 50 WG + 0,1 l vätmedel	0,75 l Bacara	1,25 l Bacara	1,5 tab. Express + 0,5 l Starane + vätmedel	18,75 g Monitor + vätmedel	0,5 l Cougar + 15 g Gratil + 0,1 l vätmedel	1,0 l Event Super + 0,1 l vätmedel	50 g Ally Class			
Tidig sådd, före tidig behandling					2	3	7	8	1	9	5	4	6	medel		
Engelsk rajgräs, Helmer					100	118	124	88	100	76	88	100	65	95		
Rödsvingel vid höstvetesådd					29	29	24	29	41	24	24	29	24	28		
Italienskt rajgräs					176	182	194	176	224	176	165	188	171	184		
Ängssvingel					71	76	76	71	71	59	53	53	41	63		
Eng. raj. Helmer , med myllning					118	124	124	100	106	106	100	129	88	110		
Eng. raj. Helmer + rödklöver					100	106	106	88	100	82	82	106	82	95		
Eng. raj. Helmer + vitklöver					124	135	124	106	97	106	82	100	106	109		
medel					103	110	110	94	105	90	85	101	82			
Sen sådd, efter tidig behandling																
Engelsk rajgräs, Helmer					47	76	59	59	59	35	47	53	59	55		
Italienskt rajgräs					112	112	147	129	118	118	141	124	124	125		
medel					79	94	103	94	88	76	94	88	91			
0 - 100 okulär bedömning av klöver																
Eng. raj. Helmer + rödklöver					143	114	86	86	71	100	29	114	107	94		
Eng. raj. Helmer + vitklöver					79	214	36	43	43	229	14	157	229	116		