

R E S U L T A T		2001	L5-3200-1999	PN-11-1999	F35611	1								
Försök i Väst		LÅNGSIKTIG STRATEGI FÖR KVICKROTSBEKÄMPNING I HÖSTVETEDO												
		Bengt-Olof Hansson År 3												
		Berg Frändefors												
GRÖDA: Höstvete	SÅDATUM:													
SORT: Tarso		DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA										
FÖRFRUKT:Havre		2001-05-15	Svinflyt 30 ton/ha											
		2001-06-01	KSS	400										
		2001-06-20	KSS mangan 20/5	200										
JORDART: Mj ML														
pH-värde:	K/Mg-kvot:													
P-Al:	Mullhalt:	BEHANDLINGAR												
K-Al:	Lerhalt:	2000-05-24	Behandling enl. plan											
Mg-Al:	Sand/Grovmo:	2001-06-15	0,4 l/ha Amistar											
Ca-Al:	T:													
P-HCl:	S:													
K-HCl:	Volymvikt:													
Cu-HCl:	Basmättnadsgrad:													
			Tusen-korn-vikt g	Vatt.-halt %	Rymd-vikt g/l	Av-reus %	Skörd 15 % kg/ha 08-25	Rel. skörd	Skörde-ökning kg/ha 08-25	Kvick-rot antal st/m2 07-25				
F Ö R S Ö K S L E D:														
OBEHANDLAD			35,0	22,2	713	2,2	4431	100	0	163				
LED A.C.F ÖRTOGRÄSBEHANDLAS VÅR ÅR 1, SE PM!			37,4	21,4	766	0,8	6100	138	1669	57				
18,75 G/HA MONITOR+ 0,2 L/HA VÄTMEDEL, VÅR ÅR 1			39,3	20,8	776	0,4	7007	158	2576	44				
3,0 L/HA ROUNDUP+ 0,5 L/HA VÄTMEDEL EFTER SKÖRD ÅR 1 *			38,3	20,5	790	0,3	7802	176	3371	19				
BEHANDLING=LED B OCH C			38,2	20,8	771	0,3	6317	143	1886	17				
18,75 G/HA MONITOR+ 0,2 L/HA VÄTMEDEL, VÅR ÅR 1 OCH ÅR 3			37,7	21,0	772	0,5	6689	151	2258	48				
3,0 L/HA ROUNDUP+ 0,5 L/HA VÄTMEDEL EFTER SKÖRD ÅR 1 OCH ÅR 3 *			39,6	20,7	790	0,2	7852	177	3421	5				
BEHANDLING=LED E OCH F														
-X-							6600							
CV%							8,4							
OBS							21							
Prob. BLOCK							-							
Prob. F1							*							

Behandling 24/5: Sol, 15° C, 57 % luftfuktighet, 0 m/s.

ANSVARIG:FÖRSÖK I VÄST INGEMAR GRUVAEUS 0511-248 31