

OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttilfällige anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
05A778 L5-307 H-30-05							
Spruttilfälle - nr, datum (år, mån, dag)		1: 051013	2: 060425	3:	4:	5:	6:
Sprutning utförd av (signatur)		KE MN	KE MN				
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		B,C	B-H				
Typ av spruta		Spruno släpduk	Spruno släpduk				
Spridare: typ, tryck		flard i L 0110	015 18 h				
Tid på dagen		16 ¹⁰ -16 ²⁰	18 ³⁰ -19 ⁰⁰				
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		11-12	22				
Grödans täthet (gles, normal, tät)		normal	normal				
Ogräsens utveckling		St. 10-20	32-38 *				
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)		normal	tät				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		hög	normal				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		14					
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		94					
Markfuktighet (våt, normal, torr)		Våt, fuktig					
Mojnighet, %		0	95				
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		0,5-2,5	0,5-3,0				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonal)		längs	längs				
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		ingen	måttlig				
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		Ingen frost. Dagg torka	nej				
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 t)		> 20 tim	> 20 tim				
Övrigt (avvikelser och problem)		2002/ha	I vissa fall 500 g Försättsmjöl. Vemodla: vissa i 5-40 Balderne: 32-38 vid: 32-34 Lerne 30-39 2002/ha				

) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder