

Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kall och torr väder

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr			Sprut- journal					
05A843 L5-307 H-32-06			1: 061016	2: 070427	3:	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag)								
Sprutning utförd av (signatur)			Xt	JS MN				
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)			B, C	B-F				
Typ av spruta			Spruta med släpdk	Spruta + släpdk				
Spridare: typ, tryck			Hardi LD 110 015	110 015				
Tid på dagen			14 ⁰⁰ -14 ²⁰	1630-1145				
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)			13	31				
Grödans täthet (gles, normal, tät)			normal	normal				
Ogräsens utveckling			se nedan	se nedan				
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt)			tätt	tätt				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *			normal-hög	hög				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)			15°	22°				
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)			95	65				
Markfuktighet (våt, normal, torr)			våt-normal	normal-torr				
Molnighet, %			90	10				
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)			0,6-2,2	0-1,0				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)			diagonal-tvärs	diagonal				
Dagg (mycket, måttlig, ingen)			måttlig	ingen				
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)			nej	nej				
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 t)			>20 tim					
Övrigt (avvikelser och problem)			200 l/ha. Snärjmäta hjärtblad - 2 knappar - 20-32 Baldersnäs } 20-32 Vävarv } Övriga i allmänhet st. 20	Snärjmäta tom 7 grenar lokaler plaster, veronica i blom Vävarv i knopp mälla 2 hjärtblad hjärtblad- baldersnäs 20-32				

OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna.
Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.