

Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr			Sprut- journal					
05A916 L5-400 H-24-08								
Spruttilfälle - nr: datum (år,mån,dag)			1:080514	2:	3:	4:	5:	6:
Sprutning utförd av (signatur)			22					
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)			B-H					
Typ av spruta			Sprumo + släpduk					
Spridare: typ, tryck			Hardi LD 40 -015 1,8					
Tid på dagen			12,30-1330					
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)			20-21					
Grödans täthet (gles, normal, tät)			normal-gles					
Ogräsens utveckling			Flesta arter Hjärtblad - 4 ortblad					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt)			tätt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *			normal					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)			16					
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)			76					
Markfuktighet (våt, normal, torr)			normal					
Molnighet, %			30					
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)			15-45 med 130					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)			längs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen)			ingen					
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)			nej					
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 t			> 20					
Övrigt (avvikelser och problem)			Flesta arter Hjärtblad - 4 ortblad. Baldersbär: Hjärtblad - 6 ortblad.					

OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttilfälle anges.