

Sprutjournal

ADB-nr:	05A995
Plan-nr:	L5-6080
Försöksnr:	
Närmaste väderstn:	Fägerhult

Kord:RF 90 X= 6392328
Y= 1353114
Plats Finnekumla Sjuhärad FiV

Spruttillfälle

	1	OBServationer
Behandlade försöksled:	B-F	2009-05-05 kl 08. JJ
Typ av spruta:	Luft-traktormont. 4 l behållare	Synbar god effekt av led E (StaraneXL)
Spridare, typ:	Hardi spalt 4110-12	
Arbetsstryck, MPa:	2,0	2009-05-20
Datum:	2009-05-04	Led E Timotej dom skräppa nedvissnande
Tid på dagen:	kl 08.00-10.00	Led F Rel stark gulfärgning av skräppan och timotejen
Grödans utveckling (decimalskalan):	Timotej st 30-31 klöver st 1-2	Avstannad tillväxt Skräppan svagt nedvissnande
Grödans täthet (gles, normal, tät):	gles	Led BCD-skräppan avstannad i tillväxt.
Ogräsens utveckling:	rosettstadie 5-8 blad	Svagt nedvissnande
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	tätt för att vara skräppa	Led D rel svag påverkan på klövern JJ
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normalt	
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	7-9	OBS 2009-07-02
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	88-81	Led A bl IV skräppan ca 10-15 cm hög. Öv bl angrip.av larver.
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr	Led B (Exp) skräppan växer om spec i bl IV.Klöver finns
Molnighet, %:	60%	Led D (Grat). Skräppa åter i bl IV övriga bl ingen skräppa
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0-2	klöver finns
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	längs	Led C (Harm) Inga skräppor än Klöver finns
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig på skräppan	Led F (Star) o led E (Ally) Inga skräppor eller klöver
Förekomst av frost eller torka:	torkperiod före	Maskros och groblad finns. Tim.dom. Glest bestånd. JJ
Regnfri tid efter behandling:	16 tim (regn kl 02 den 5 maj)	
Övrigt:	ca 2 mm regn under tidig natt före behand. regn natten efter behandl. Temp efter behandl 10-13 ⁰ C mitt på beh.dagen Tomtskräppa dominerar	
Skörd 1 datum	2009-06-18	
Gödsling inför sk 2	NK 20:15 300 kg/ha 09-06-22	