

26 C Sprutjournal OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut- journal						
151094 L15-10x08 87/03		1: 30526	2: 30612	3: 030618	4: 03-07-04	5:	6:	
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag)		FL / SÅR	AT / KHL	SÅR / AT	AE / FL			
Sprutning utförd av (signatur)		B-H	M	F-L	M			
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		Sprut	→	→	→			
Typ av spruta		Sprut	→	→	→			
Spridare: typ, tryck		Hordli F11003	→	→	→			
Tid på dagen		1300-1400	900-930	900-1000	10.30-11.30			
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		31	39	49	65			
Grödans täthet (gles, normal, tät)		Normal	normal	→	Normal			
Ogräsens utveckling		I			—			
Ogräsbestånd (gles, normalt, tät)		—			—			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		Normal-hög	→	Hög	Normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		19,0	16,4	24,2	19,8			
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		52,0	62,0	52,7	65,3			
Markfuktighet (våt, normal, torr)		Våt	vät	Normal	vät			
Molnighet, %		25	6	22-30	80			
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		2,7	3,1	0,2	1,8			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)		diagonal	tvärs	tvärs	diagonalt			
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		ingen	måttlig	ingen	mycket			
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		nej	nej	nej	nej			
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 ti								
Övrigt (avvikelser och problem)			Comet 0,18 + Företag 0,18		Comet 0,11 opus 0,1			

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder