

26 C Sprutjournal OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspeppenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal							
151095 LIS 1040C 85/03		1:030526	2:030528	3:030617	4:03-06-22	5:	6:		
Spruttillfälle - nr: datum (år, mån, dag)		MW HE	MW HE	FL/AE	AE/FL				
Sprutning utförd av (signatur)		B-H N	M	F-M	M				
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		Västerås	Västerås	→	Ströby				
Typ av spruta		2,2	2,2	→	→				
Spridare: typ, tryck		1030-12,00	11,00-11,30	1400-1530	15,00-16,00				
Tid på dagen		31	31	51	61				
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		Normal	Normal	Normal	Normal				
Grödans täthet (gles, normal, tät)		-	-	-	-				
Ogräsens utveckling		-	-	-	-				
Ogräsbestånd (gles, normalt, tät)		-	-	-	-				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		Hög	Hög	Normal	Normal				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		18,5	17,5	19,2	27,8				
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		68,3	45,3	39,1	32,8				
Markfuktighet (våt, normal, torr)		Normal	Normal	Normal	Normal				
Molnighet, %		25 %	10 %	40	40				
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		2,5	2,1	1,3	1,5				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)		diagonalt	diagonalt	tvärs	diagonalt				
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		ingen	ingen	ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		Nej	Nej	Nej	Nej				
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 ti									
Övrigt (avvikelser och problem)									
		M	M	M	M				
		Spårte 0,5	Spårte 0,5	Spårte 0,18	Spårte 0,18				

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder