

Sprut-journal

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr
151880 C5-840 H-25-08

Sprutillfälle - nr: datum (år,mån,dag)	1: 080530	2: 080609	3:	4:	5:	6:
Sprutning utförd av (signatur)	XL	XL				
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)	B, F, G, H	B-H				
Typ av spruta	Sprumo+släpduk	→ Dito				
Spridare: typ, tryck	Hardi LP 110-015 1,8	110-015 1,8 bar				
Tid på dagen	07:15-0830	17:15-1845				
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalen)	1 blad	5 blad				
Grödans täthet (gles, normal, tät)	normal	normal				
Ogräsens utveckling	Hjärtblad - 2 ortblad	Hjärtblad - knoppst.				
Ogräsbestånd (gles, normalt, tätt)	normalt - tätt	tätt				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *	normal	hög				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)	14	19				
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)	87	50				
Markfuktighet (våt, normal, torr)	torr	torr				
Molnighet, %	10	0				
Vindhastighet i sprutans ramphöjd	1,8-3,2	1,5-3,5				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)	längs	längs				
Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)	nej	ja, i omrätt				
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 tim)	>20	>20				
Övrigt (avvikelser och problem)	Ogräs: Enstaka muller 4 ortblad. Nattskatta hjärtblad.	Ogräs i tidigare beh. led: hjärtblad - 2 ortblad. Övriga led: Hjärtblad - knoppstade. Muller: Knoppar Nattskatta: 4 ortblad Bindu: 6-8 ortblad Hirs: upp till 5 blad.				
		Tistel: upp till 8 ortblad. Jordvek: 6-8 ortblad. Trumpst: upp till 5-gener				

Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kall och torr väder