

26 C Sprutjournal OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
		1: 2003 10 07	2: 2003 10 16	3: 2004 04 19	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år, mån, dag)		HB, AG	HB, AG	DC PH			
Sprutning utförd av (signatur)		B, C, D, E, J	1	E-H			
Behandlade försöksled (ex. A, C, E etc.)		Spruno	spruno	spruno			
Typ av spruta		Spalt, 2ben	sprutt typus	sprutt typus			
Spridare: typ, tryck		1400-1500	1016-1645	1300-14			
Tid på dagen		DC 12	DC 21	2 ⁰⁰			
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		Normal	Normal	normal			
Grödans täthet (gles, normal, tät)		Örtages - 14-16 bl. st. ven → 2-3 bl. st.		normal			
Ogräsens utveckling		Tät	Tät	tät			
Ogräsbestånd (gles, normalt, tät)		Normal	12g	normal			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		11,2°C	5,4	17,5			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		88%	82%	55			
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		Vät	Vät	normal			
Markfuktighet (våt, normal, torr)		50%	90%	10%			
Molnighet, %		0	0	3-5			
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		-	-	trass			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonal)		mittlig	mycket	ingen			
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		nej	ja, (tost)	nej			
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)							
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 t)							
Övrigt (avvikelser och problem)		Jordtemp + 8,6°C					

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder