

Datum .....

Signering .....

P.M.

**Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår**

1. **Syfte med försöket.** Att visa de provade preparatens verkan mot åkerven och örtogräs.
2. **Preparaten.** Anskaffas och utvägs via HS Skåne, Jonas Schön, Borgeby Slottsväg 4B.
3. **Försöksplats.** Välj en plats med jämn och riklig förekomst av åkerven och örtogräs, obs ! fri från kvickrot. Försöket skall skyltas, ha hörnpålar och gränsas. Bra karta för snabb lokalisering på fältkortet. Bruttoruta: minst 30 m<sup>2</sup> / försöksruta.
4. **Jordprov.** Uttas och insänds med tydliga beteckningar till Agrilab AB, Ärnevi 63, 755 97 Uppsala eller eget lab med analysparametrar enligt fältkortet.
5. **Munstycken** i led 3 och 4:

|               |      |                |       |
|---------------|------|----------------|-------|
| Körhastighet: | km/h | Munstycksflöde | l/min |
|               | 5    |                | 0,83  |
|               | 6    |                | 1,00  |
|               | 7    |                | 1,17  |

**Förslag munstycken 1:**

|                          |                      |      |       |             |            |          |             |
|--------------------------|----------------------|------|-------|-------------|------------|----------|-------------|
| Dubbeldusch injektor:    | Lechler IDKT 120-025 | Lila | 4 bar | Mediumdusch | 1,15 l/min | 6,9 km/h | ca 200 l/ha |
| 90 % avdriftsreducering: | Lechler ID 3         | Blå  | 3 bar | Mycket grov | 1,19 l/min | 7,1 km/h | ca 200 l/ha |

**Förslag munstycken 2:**

|                          |                     |      |         |             |            |          |             |
|--------------------------|---------------------|------|---------|-------------|------------|----------|-------------|
| Dubbeldusch injektor:    | Lechler IDTK 120-02 | Gul  | 5 bar   | Mediumdusch | 1,03 l/min | 6,2 km/h | ca 200 l/ha |
| 90 % avdriftsreducering: | Lechler ID 3        | Lila | 2,5 bar | Ultragrov   | 0,90 l/min | 5,4 km/h | ca 200 l/ha |

6. **Markfuktighet vid behandling.** Ange markfuktigheten i skiktet 1-6 cm som våt, fuktig eller torr.
7. **Sprutjournal.** Fyll i sprutjournalen så noggrant som möjligt.
8. **Gradering**
  - a) Behandlingsskador på grödan bestäms genom gradering en till två veckor efter respektive behandling. Ange skadornas art samt andel skadat bestånd i respektive parcell i % av obehandlat led.
  - b) Stråstyrka graderas vid skörd.
  - c) Ogräsens täckningsgrad graderas vid skörd.
9. **Ogräsgraderingar.** Ogräsen graderas strax innan första vårbehandling samt 4 och 8 veckor efter sista behandlingen enligt bilaga. **Obs! Blanda aldrig in fleråriga örtogräs i gruppen ettåriga örtogräs. Skilj alltid mellan örtogräs och skadegräs!**
10. **Skörd.** Rutor på minst 18 m<sup>2</sup> skördas. Vid tröskningen vägs kärnskörden. Rutvisa kärnprov insänds med tydliga beteckningar till Agrilab AB, Ärnevi 63, 755 97 Uppsala eller eget lab med analysparametrar enligt fältkortet. Ställ alltid in trösken på den utanför försöket liggande skyddszonen! Ange skörderutans storlek!
11. **Utvecklingsstadier och fältanteckningar.** Använd "Utvecklingsskalor och EPPÖ koder", 1996 (Leuchovius och Stureson). För fullständiga fältanteckningar under hela försökstiden.

## Ogräsgradering, höstutlagda fältförsök i stråsäd

### Förberedelse

- Gå över försöket och kontrollera märkningen av parcellerna.
- Anteckna alla ogräsarter (ört- och gräsogräs) du hittar i obehandlade parceller och notera vilka som är mest frekventa.
- Samtliga arter som är föreskrivna att finnas med i försöket måste noteras även om de endast förekommer i enstaka exemplar.
- Enskilda pilört-, plister-, veronika-, snärjmåra- och violarter behöver normalt inte särskiljas och kan då redovisas som en gemensam artfamilj. Om de måste särskiljas ska det anges i försöksplanen.

### Allmänt

Ogräsförekomsten ska bestämmas både i samband med behandlingar och vid graderingar. Vid behandlingstillfällena ska ogräsen räknas och vid graderingarna ska ogräsens täckningsgrad bedömas. Dessutom ska utvecklingsstadierna bedömas.

### Tidpunkter för avräkning

- I anslutning till behandlingstillfällena, kan utföras antingen någon dag före, samma dag eller någon dag efter resp. behandling.

### Tidpunkter för gradering

- Ogräsgraderingen utförs normalt strax innan första vårbehandling samt 4 och 8 veckor efter sista behandling men andra alternativ kan förekomma med hänsyn till gröda och de ogräs som ska graderas.

**Vid sen vårbehandling eller tidig avdödning kan graderingen 8 veckor efter denna behöva tidigareläggas.** Antalet graderingar och tidpunkter för dessa ska alltid anges i PM. Om försöket ska skördas görs en sista enkel gradering av total ogräsförekomst i samband med skörden.

### Utförande


- Vid varje behandlings- och graderingstillfälle ska utvecklingsstadiet (medel, max, min) enligt BBCH-skalan anges både för grödan och för de ogräsarter som ska registreras. Dessutom ska höjd och diameter i cm anges för de ogräsarter som ska registreras.

- I nära anslutning till behandlingstillfällena samt vid graderingarna om det skulle tillkomma nygrodda ogräsplantor och/eller gamla ogräsplantor skulle vissna sedan senaste behandlingstillfället räknas alla ogräs artvis i obehandlade försöksled.


Ogräsen räknas på 1 ruta om 0,25 m<sup>2</sup> i varje upprepning. Om det ingår mer än ett behandlingstillfälle i försöket ska ogräsen räknas i samma rutor vid varje tillfälle. Räknerutorna ska i sådana fall märkas upp med stickor. Efter avräkningen beräknas artvisa medeltal för hela försöket och resultatet anges i antal per m<sup>2</sup>.

Vid stora ogräsmängder kan det bli nödvändigt att gräva upp plantorna för att kunna räkna dem. Om detta medför att avräkningarna inte kan utföras på samma räknerutor vid senare behandlingstillfällen ska det anges att räkningarna har utförts på olika ställen.


- Derefter graderas täckningsgrad av varje ogräs för sig. Normalt graderas 2-5 av de mest frekventa ogräsen artvis och övriga uppdelade i grupperna ettåriga örtogräs, fleråriga örtogräs, gräsogräs respektive fräken. Täckningsgraden anges i procent av den **totala** ytan.
- Om försöksplanen även föreskriver artvis gradering av täckningsgrad i behandlade led ska varje art graderas 0-100 och dessutom ska total täckning anges.




1. Helt dækket med ukrudt. 100 %.



2. Næsten dækket af ukrudt. 90 %. (Karakteren anvendes i området 83-99 % dækning).




3. Næsten dækket. Små partier uden ukrudt. 75 %. (Karakteren anvendes i området 62-83 % dækning).



4. Sammenhængende ukrudtsbevoksning over hele arealet. 50 %. (Karakteren anvendes i området 40-60 % dækning).




5. Bevoksningen ikke længere sammenhængende, men jævnt fordelt. 30 %. (Karakteren anvendes i området 22-40 % dækning).




6. Spredte pletter med ukrudt, jævnt fordelt. 15 %. (Karakteren anvendes i området 10-22 % dækning).



7. Kun meget sparsom ukrudtsvækst. 7,5 %. (Karakteren anvendes i området 5-10 % dækning).



8. Enkeltstående ukrudt eller ganske få, små klynger. 3 %. (Karakteren anvendes i området 1-5 % dækning).



9. Helt fri for ukrudt. 0 %.

- Inom varje upprepning i behandlade led graderas effekt av behandling i förhållande till täckningsgraden i obehandlat för varje enskild ogräsart samt övriga ogräs (dock ej med hopblandning av fleråriga örtogräs och ettåriga örtogräs samt örtogräs och gräsogräs). Gradera volymen av vitala ogräs i förhållande till obehandlat men ta även hänsyn till dvärgväxt och andra skador på ogräset. Effekten bedöms som ett medeltal av tre platser per parcell. Ogräsgraderingen kan göras enligt skalan nedan men hela skalan 0-100 bör användas:

#### Skala för visuell bedömning

| Skala | Betydelse                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Som obehandlat, ingen effekt på ogräsplantorna                                                                                         |
| 1-19  | Svag minskning av ogräsförekomsten, nästan normal utveckling                                                                           |
| 20-34 | Svag minskning av ogräsförekomsten, ofta normal utveckling                                                                             |
| 35-64 | Svag minskning av ogräsförekomsten, generellt minskad tillväxt                                                                         |
| 65-79 | Effekten inte tillfredsställande, men tydlig minskning av ogräsförekomsten. Vissa plantor endast med lättare skador                    |
| 80-85 | Effekt fortfarande inte tillfredsställande, det finns fortfarande flera ogräsplantor där tillväxten inte har avstannat                 |
| 86-94 | Effekten nästan tillfredsställande, i allmänhet har tillväxten stoppats. Fortfarande möjligt att hitta enskilda ogräsplantor som växer |
| 95-97 | Kraftig minskning av ogräsförekomsten. Få ogräsplantor fortfarande livskraftiga                                                        |
| 98-99 | Nästan full effekt, enstaka livskraftiga ogräsplantor                                                                                  |
| 100   | Inga ogräs, full effect                                                                                                                |

Till skalan räknas även minskad ogräsförekomst även om plantorna är fullt livskraftiga.

- Vid skörd graderas normalt täckningsgraden av ogräset i samtliga parceller. Notera om någon ogräsart har börjat växa om. Notera även stråstyrkan och om det är ogräset som tryckt ned grödan.

#### Rapportering

- Resultaten ska redovisas snarast efter varje inventering. Notera vilka arter som ingår i gruppen övriga ogräs och som inte särredovisas.