

2014-04-30

PM L5-6600 Ogräsbekämpning i vallinsådd med klöver eller lusern.

Vallår 1 (Efterverkan)

N-gödsling: För mycket N riskerar att utjämna skillnader i klöverandel mellan olika led. Riktvärden för N-nivåer, 1:a skörd :60 kg N/ha , 2:a skörd: 50 kg N/ha. Ingen påverkan från ”omgivande” gödsling i försöket får ske. **Ingen stallgödsel eller genomfart med spridare i försöket!**

Graderingar: Vid tillväxtstart på våren samt vid respektive skörd graderas marktäckning av gräs, klöver, lucern, ogräs och övrigt. Exempel: Gräs 60 %, klöver 25 %, lucern 5 %, ogräs 5 %, övrigt 5 %.

Botaniska prover: Vid skörd tas rutvisa botaniska prover från **försöksled A** i försöket från **Rådde gård**. Proverna sorteras sedan **färska** i gräs, klöver, lucern, ogräs och övrigt. Därefter ska ts bestämmas genom torkning i torkskåp i tarerade fiberpåsar, 1 per fraktion och ruta, i minst 2 timmar och högst 4 timmar i 105° C. Proverna vägs därefter och vikterna antecknas.

Skörd: Minst 10 m² skördas och vägs i försöket från **Rådde gård**.

Analys: Förutom botanisk analys enligt ovan utförs endast ts-bestämning.

Ts-prover uttages rutvis och representativt ur den skördade grödan i försöket från **Rådde gård**. Provernas friskvikt antecknas på påse och protokoll. Därefter görs ts-bestämning på samma sätt som i botaniska analysen. **Kom ihåg att ange friskvikten innan torkningen!** Ts-bestämningen utförs av försökspatrullen.

Kontaktperson: Lars Danielsson 070-5834276.