

PM till kvävetillförsel och stråförkortning i rörsvingelfrövall

Plan: SFO-1030

Syfte:	Att få bestämma optimal kvävegiva med och utan tillväxtreglering i rörsvingelfrövall.																						
Plats och antal:	1 försök med placering hos Mats Areskoug Slättäng 271 98 Ystad tel 0411-552111 eller mobil 070-5892286																						
Gröda:	Rörsvingelfrövall. Sort: Swaj																						
Ogräsbekämpning och bekämpning av sjukdomar och skadegörare	Följer fältets behandling																						
Försöksplan:	<table><thead><tr><th></th><th>Kväve höst (mitten av september)</th><th>Kväve vår vid tillväxtstart</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>60 kg N (Axan)</td><td>0</td></tr><tr><td>B</td><td>60 kg N (Axan)</td><td>40 kg N (Ks)</td></tr><tr><td>C</td><td>60 kg N (Axan)</td><td>60 kg N (Ks)</td></tr><tr><td>D</td><td>60 kg N (Axan)</td><td>80 kg N (Ks)</td></tr><tr><td>E</td><td>60 kg N (Axan)</td><td>100 kg N (Ks)</td></tr><tr><td>F</td><td>60 kg N (Axan)</td><td>120 kg N (Ks)</td></tr></tbody></table> 1. Ingen stråförkortning 2. 0,4 lit Moddus + 2 lit Cycocel Plus, stadie 37-39 (prep skickas fr HS Sandby gård) Observera att det är viktigare att grödan är i god tillväxt när stråförkortningen genomförs än att stråförkortningen sker vid exakt rätt stadium. Före behandling diskuteras med Bo Christiansson (0706-71 46 10) om tidpunkt och utveckling.			Kväve höst (mitten av september)	Kväve vår vid tillväxtstart	A	60 kg N (Axan)	0	B	60 kg N (Axan)	40 kg N (Ks)	C	60 kg N (Axan)	60 kg N (Ks)	D	60 kg N (Axan)	80 kg N (Ks)	E	60 kg N (Axan)	100 kg N (Ks)	F	60 kg N (Axan)	120 kg N (Ks)
	Kväve höst (mitten av september)	Kväve vår vid tillväxtstart																					
A	60 kg N (Axan)	0																					
B	60 kg N (Axan)	40 kg N (Ks)																					
C	60 kg N (Axan)	60 kg N (Ks)																					
D	60 kg N (Axan)	80 kg N (Ks)																					
E	60 kg N (Axan)	100 kg N (Ks)																					
F	60 kg N (Axan)	120 kg N (Ks)																					
Preparat stråförkortning:	Skickas ut från HS Sandby gård																						
Gödslings & spruttidpunkt	Se ovan. Ange vilket stadie grödan befinner sig i på fältkortet.																						
Parcellstorlek:	12,5*4 m. Parcellstorleken måste anpassas till om försöket ska strängläggas eller ej. OBS! Om fältet ska strängläggas måste försöket också strängläggas. Försöket ska nettogränsas.																						
Rutfördelning:	Enligt fältkort																						
Allmänna krav:	Ett jämnt och ogräsfritt bestånd																						
Graderingar:	Eventuella sprutskador ca 1 vecka efter behandling Stråstyrka vid blomning Stråstyrka vid skörd																						
Skörd och skördeprov	Om fältet strängläggs måste försöket också strängläggas. Alla försöksrutor måste skiljas isär före strängläggning respektive direkt skörd. OBS! Detta måste göras innan svingeln drösar. Försöket skördas rutvis och skördematerialet läggs i utsända bomullssäckar. Tröskningen																						

ska vara en grovtröskning så att spill undviks. Detta innebär i princip att det är bara halmen som rensas bort. Den rutvisa skörden torkas direkt efter skörd och skickas därefter för rensning till:

Försökspatrullen
Sandby gård
276 37 Borrby

Jordprov:

Generalprov, matjord vid utlägg av försöket
N-min före gödsling, våren 2010

Proverna skickas till:
Eurofins Food & Agro
Box 9024
291 09 KRISTIANSTAD

Kontaktperson:

Kontakta Bo Christiansson (0706-71 46 10) inför stråförkortningen och före skörd för inställning av försökströska.
För alla övriga frågor kontakta Gunilla Larsson 040-46 20 82, 0706-58 44 94

Fältkort och resultat

Skickas till
Gunilla Larsson
Svensk Raps AB
Box 96
230 53 ALNARP
gunilla.larsson@svenskraps.se