

PM Olika tidpunkter för strängläggning och bladdödning med Reglone i rödklöver

Plan: SFO - 2170

Syfte:	Studera effekten på skörd och kvalitet vid olika tidpunkter för strängläggning och bladdödning med Reglone i rödklöver
Plats och antal:	1 försök i M län 1 försök i E län
Gröda:	Rödklöver frövall
Gödsling och bekämpningar:	Följer fältets behandling.
Försöksplan:	Behandlings-/skördetidpunkt A 3,0 lit Reglone ca 25 dgr efter bästa pollineringsstillfälle, skörd 5- 7 dagar senare B Strängläggning ca 25 dagar efter bästa pollineringsstillfälle, skörd 5- 7 dagar senare C 3,0 lit Reglone ca 35 dgr efter bästa pollineringsstillfälle, skörd 5- 7 dagar senare D Strängläggning ca 35 dagar efter bästa pollineringsstillfälle, skörd 5- 7 dagar senare E 3,0 lit Reglone ca 45 dgr efter bästa pollineringsstillfälle, skörd 5- 7 dagar senare F Strängläggning ca 45 dagar efter bästa pollineringsstillfälle, skörd 5- 7 dagar senare
Parcellstorlek:	Som utgångspunkt 50 m ² men anpassas till strängläggare.
Rutfördelning:	Enligt fältkort
Allmänna krav:	Ett jämnt och ogräsfritt bestånd
Graderingar:	Gradering av plantbestånd (0-100) Datum för full blom Datum för bästa pollineringsdag % mogna blomhuvud vid varje behandlingstillfälle
Skörd och skördeprov:	Försöket skördas rutvis och skördematerialet läggs i utsända jutesäckar. Tröskningen ska vara en grovtröskning så att spill undviks. Detta innebär i princip att det är bara halmen som rensas bort. Den rutvisa skörden torkas direkt efter skörd och skickas för rensning till: Försökspatrullen Sandby gård 276 37 Borrbby
Analys	Vattenhalt Prov av den rensade varan skickas för grobarhetsanalys till Jordbruksverkets Utsädesenhet i Svalöv
Jordprov:	Generalprov. Skickas till Eurofins Food & Agro Box 9024 291 09 KRISTIANSTAD

Kontaktperson: Gunilla Larsson 040-46 20 82, 0706-58 44 94

Fältkort och resultat Skickas till
Gunilla Larsson
Svensk Raps AB
Box 96
230 53 ALNARP
gunilla.larsson@svenskraps.se