

PM höstsådda sortförsök i spannmål 2024

Uppdaterat 2023-09-01

Innehåll

Nytt och viktigt	2
Allmänt	2
Inläggning av data i NFTS och arkivering av rådata	2
Försöksplats	2
Parceller och skördeytan	3
Utsädesmängder och sådd i sortförsöken märkning L7-	3
Gradering i allmänhet och registrering av data i NFTS	4
Vilka graderingar/provtagningar görs i vilka försök?	4
Gradering av sjukdomar	5
Tidpunkt sjukdomsgraderingar	5
Bladsvampar	6
Strå-/Ax-/Sotsvampar	6
Bedömning av graderingens säkerhet 1-3	6
Kodnycklar och tidpunkt för graderingar av skadegörare i höststråsäd	7
Gradering av axbrytning, stråbrytning, grönskott och stråstyrka	8
Gradering av drösning	9
Gradering av hjälpvariabler	9
Gradering av gulmognad	9
PM Avkastningsförsök höstsådda spannmål	11
PM för sortförsök med höstvet, avkastningsförsök, L7-0101	12
PM för sortförsök med höstråg, avkastningsförsök, L7-0201	14
PM för sortförsök med höstrågvete, avkastningsförsök, L7-0212	16
PM för sortförsök med höstkorn, avkastningsförsök, L7-0215	17
PM Graderingsförsök höstsådda spannmål	19

Nytt och viktigt

- Nytt upplägg av skyddsrutorna i graderingsförsöken. Skydden sås runtomkring och i mellangångarna. Sortblandningar används till skydden.
- L7-0215-2024:
 - o Extra led 19-22 med reducerad utsädesmängd. Sorterna SY Galileo (hybrid) och Lady (linje) används.
 - o Sortblandningar används i skyddsrutor mellan småblock.
- Ny importmodul i NFTS för analysdata. Analysdata läggs in av labben direkt och inte av utförarna/SLU.
- Kom ihåg: aldrig fyller i "0" om data saknas, lämna cellen tomt vid datainmatning.
- Om det är svårt att hitta vägen till försöket lägg in en vägbeskrivning i NFTS under noteringar.

Allmänt

Vid viktiga ändringar i försöksplanen måste utföraren ändra i NFTS, t. ex. om en sort blir utbytt, sort utgår eller om skydd ändrats. Skriv också en notering i NFTS vad som ändrats. Anteckningar på fältkort av papper kommer in alldeles för sent, när resultatbearbetningen redan påbörjats.

Inläggning av data i NFTS och arkivering av rådata

Alla parametrar i det förinlagda parameterträdet i NFTS skall antingen ha:

Grön bock = Registreringen klar och mätparametern godkänd

Överstruken bock = Registrering kommer inte att utföras. Den överstrukna bocken ska också godkännas med en grön bock

En svart ring = inga data registrerats, får inte förekomma (Försökshandboken 2.6). Ytterligare parametrar kan läggas i vid varje tidpunkt genom att högerklicka där. Efter att data lagts in i NFTS är egenkontrollen viktig att data är rimliga och att det inte finns avvikande värden. Om en mätparameter registreras i en Excel-fil och därefter kopieras in i PC-Fältförsök måste alla ev. decimaler i Excel-filen behållas innan data överförs. Man får alltså inte avrunda till närmaste heltal eller ett mindre antal decimaler än det som har registrerats i Excel-filen för då försvinner decimaler.

Alla rådata läggs in i NFTS av utföraren kontinuerligt och snarast efter skörd. Övrig information som bilder, dokument m.m. kan bifogas i NFTS under noteringar. Behövs filer skickas till SLU använd adressen: sortprovning@slu.se. Arkivering av rådata görs enligt Försökshandboken.

Viktigt vid datainmatning:

- om ingen observation gjorts eller data saknas skall det vara lucka, inte "0". ("0" räknas som faktiskt mätvärde och skulle då felaktigt påverka resultaten)
- om ett led utgått och ersatts med någon annan sort lägga inte in data för denna led, lämna det tomt vid datainmatning.

Försöksplats

Försöksplats väljs med så jämna förhållanden som möjligt. Helst skall samma art omge försöket. Försöket bör vara enkelt att nå med bil. Försök undvika att lägga försök för långt in på fält eller bakom låsta grindar/bommar, men prioritera homogen försöksyta. **Om det är svårt att hitta vägen till försöket lägg in en vägbeskrivning i NFTS under noteringar.** Lägg in gärna också varningar för hundar eller annat man behöver ha i åtanke vid besök av försöket. Ange en GPS-punkt för försöket och notera gärna en andra GPS-punkt för lämplig parkering om det är svårt att hitta en nära försöket. OBS Ange försökets GPS-punkt så nära skyddsrutan vid ruta 1 som möjligt, vilket underlättar för besökaren att komma rätt. Det skall tydligt markeras var ruta 1 börjar, helst med skylt av fältkort,

men minst med avvikande hörnpinne eller sticka som identifierar försöket med plan och/eller adbnummer. OBS – antal och placering av skyddsutor och block i försöket måste stämma överens med designen i NFTS. Används stickor för markering av de enskilda parcellerna, använd lednummer. Vid stora försök (t.ex. höstvet) markera gärna rutor i regelbundet avstånd med stickor för enklare orientering i försöket.

Parceller och skördeytan

Nettoytan för parcellerna i försöket som läggs in i NFTS i skördeparametern beräknas enligt Försökshandboken kapitel 3.2 där det står: skördeytan = parcellens längd * antal rader * radavståndet. Om försöket sås med parcellsåmaskin och radavstånd ≤ 15 cm bör avståndet mellan parcellernas långsidor vara max 2-2,5 gånger radavståndet, dvs. ca 30 cm och lika i hela försöket. Om skördeytan t.ex. kortas i vissa rutor, måste parcellskörden för dessa rutor räknas om innan den läggs in i NFTS.

Utsädesmängder och sådd i sortförsöken märkning L7-

Antal grobara kärnor/frön som skall sås per m^2 är från och med 2015-07-28 enligt tabell 1. Observera skillnad mellan områdena A-B och C-G. Den faktiska utsädesmängden skall skrivas in under fliken Grundbehandlingar i NFTS. Skulle det finnas någon sort som avviker får det läggas in för ledet under fliken Försöksbehandlingar i NFTS.

Specifika utsädesmängder för försökserier och grödor tas ifrån inbjudan till sortförsök. Genomsnittliga mängdkrav är angivna dock finns parcellstorlekar för varje försöksplats för att räkna ut minimum utsädesmängd i fallet tillgängliga mängden av försöksutsäde är begränsad. Av mätaren i försöken behövs större mängd, eftersom den används till skyddsutor mm, se inbjudan. Utsäde sparas normalt 6 månader efter sådd.

Tabell 1. Aktuella utsädesmängder

Art	Grobara kärnor/ m^2	
	Södra Sverige	Mellansverige
	Omr A - B	Omr C - G
Höstvet	350	400
Hybrid-höstvet	350	400
Höstråg	250	300
Hybrid-höstråg	250	300
Höstrågvete	300	350
Höstkorn	250	300
Hybrid-höstkorn	250	300

Den exakta utsädesmängden anges på de utskickade förpackningarna i **kg/ha**, (kompletterat med uppgifter om tusenkor nvikt och grobarhet) och beräknas enligt följande:

$$\text{Utsädesmängd per ha (kg)} = \frac{\text{Antal grobara kärnor per m}^2 \times \text{tusenkor nvikten}}{\text{grobarhetsprocenten}}$$

$$\text{Utsädesmängd för försök (kg)} = \frac{\text{utsädesmängd per ha (kg)}}{10000 \text{ m}^2} \times \text{försöksyta (m}^2\text{)}$$

Exempel för korn:

$$\text{Utsädesmängd per ha (kg)} = \frac{350 \times 50,1}{96} = 183 \text{ kg}$$

$$\text{Utsädesmängd } 150 \text{ m}^2 = \frac{183 \text{ kg}}{10000 \text{ m}^2} \times 150 \text{ m}^2 = 2,8 \text{ kg}$$

OBSERVERA! Utsädesmängden är i normalfallet angiven på etiketterna i kg/ha och skall således bara multipliceras med rutstorleken i m² och delas med 10 000 för att få rätt mängd till parcellen.

Se även PM för anpassning till sen sådd av höstsäd.

Gradering i allmänhet och registrering av data i NFTS

Om osäkerhet hur det skall göras konsultera SLU. Se ev. instruktioner utskickade av Fältforsk. OBS lägg alltid in registreringar rutvis även om ingen större skillnad finns. Det måste vara tydligt när en gradering är gjord. Om alla värden är lika använd fyll på-funktionen Gå först igenom hela försöket för att få en uppfattning om nivån. Gradera och notera även nollor, eller lucka då ingen gradering kan göras. Anledningen till att ingen gradering kan göras noteras i NFTS. Notera alltid anmärkningsvärda iakttagelser i NFTS.

Vilka graderingar/provtagningar görs i vilka försök?

	Avkastnings- försök	Graderings- försök	Nivå	Kommentar
Planttäthet höst/vår	X	X	Rutvis	
Sjukdomsgraderingar		X	Rutvis	Enligt särskilt pm
Stråegenskaper				
Stråstyrka gultmognad		X	Rutvis	vid behov i råg
Stråstyrka		X	Rutvis	graderas med sjukdomsgraderingar
				vid behov
Stråstyrka vid skörd	X	X	Rutvis	
Stråbrytning, axbrytning	X		Rutvis	vid behov

Beståndshöjd				
vid 100% stråstyrka	X		Ledvis	
(strållängd)				
vid skörd	X		Rutvis	Ärter
Mognad				
	X	X	Ledvis	
Skörd				
Skörd (inkl NIT)	X		Rutvis	
TKV	X		2 upprepningar	
Extra beställningar				
Axräkning	X		3 upprepningar	i utvalda försök i höstvet
Bakningsprov	X		Ledvis	i utvalda försök i höst- och vårvete
Falltal	X		2 upprepningar	i utvalda försök i råg, höstvet och vårvete
Sållning i korn	X		2 upprepningar	i utvalda försök i vårkorn

Observera vid provtagning under skörden: fyll upp provburkarna till 1 cm under kanten, så att siffrorna i burkarna fortfarande syns. Om provmängden är för liten kan litervikt inte mätas.

Gradering av sjukdomar

Alla graderingsdata av sjukdomar från fältförsöken läggs direkt in i NFTS för löpande redovisning. Ytterligare parametrar kan läggas till vid varje tidpunkt genom att högerklicka i den tidpunkten. Bara parametrar som listas i nedanstående tabell ska användas. Om en parameter resp. dess NFTS-kod saknas i tabellen ska utföraren kontakta planansvariga. Sjukdomsgraderingar görs regelbundet i graderingsförsöken. I avkastningsförsöken görs sjukdomsgraderingar bara vid svåra angrepp som påverkar tolkningen av försöksresultaten.

Graderingarna görs i skala 0-100 där 0 betyder inget angrepp och 100 % att hela bladet är svampangripet/förstört. Gör bedömningen snabbt, tveka inte! Vid mycket små angrepp, under 1 %, skriv en etta eftersom angrepp noterats. Använd inte decimaler! Lägg **alltid** in registreringar **rutvis** även om ingen större skillnad finns. Det måste vara tydligt när en gradering är gjord: **ange datum och DC** vid registrering av data i NFTS. Markera parametern som **ej utförd** (rött kryss) **bara om graderingen inte utförts**. Om graderingsförsöken besöktes och **inget sjukdomsangrepp förekom skriv 0 % på försöksnivå "F" (parametern måste först tas bort under respektive försökstidpunkt i NFTS och läggas in på nytt med nivå "Försök")**. Det är viktigt att skilja mellan 0% och 'ej utfört': 0% angrepp är ett resultat; ej utfört betyder angrepp kan ha förekommit eller inte, någonting vi inte vet eftersom det inte utfördes.

För beskrivning av sjukdomar och symptom hämta gärna "Skadegörare i jordbruksgrödor" utgiven av Jordbruksverket via länken: <http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/be26.html>

Graderingsnycklar finns på HUSEC:s hemsida, www.husec.se kvalitetshandboken, dokument nr: HUSEC 2.11.1.1 (åtkomst till handboken kräver inloggning).

Tidpunkt sjukdomsgraderingar

Observationsparceller placeras i eller i anslutning till graderingsförsöken och besöks regelbundet av växtskyddscentralerna. Utförarna håller kontinuerlig kontakt med växtskyddscentralerna angående

lämplig tidpunkt att påbörja sjukdomsgraderingarna. Sjukdomsgraderingarna utförs sedan av utförarna cirka en gång i veckan med anpassning efter utvecklingen av angreppen, för att fånga de tidpunkter när sortskillnaderna är som störst. Om inget annat är angivet i tabellen nedan bör de flesta sjukdomar vanligtvis graderas i DC 73-83. Första graderingen läggs in i NFTS som "Gradering 1" oavsett datum, och efterföljande som "Gradering 2" osv.

Bladsvampar

Graderingsmått för bladsjukdomar är % angripna bladyta. Gradera den bladnivå där de tydligaste sortskillnaderna finns, vanligen blad 2 uppifrån räknat. Alternativt kan blad 1 eller 3 väljas. Ange angripen bladyta i procent för respektive sjukdom. Olika sjukdomar kan framträda olika starkt på olika bladnivåer. Graderas flera bladnivåer parallellt vid samma tidpunkt, ska den bladnivå som skall ingå i sammanställningarna läggas in i den parameter som finns upplagd i NFTS. Välj den bladnivå som har störst variation. Graderingar som gjordes på ytterligare bladnivåer ska inte läggas in under mätparametrarna men läggs in under noteringar. Alla extra graderingar får samlas i en fil och läggas in gemensamt när graderingarna är avslutade. Ange också bladnivå för de inlagda graderingarna för varje tidpunkt under noteringar. Sjukdomar markerad med "X" är förinlagda i NFTS. Sjukdomar markerad med "x" kan förekomma och bör då läggas in i NFTS av utföraren. Använd enbart NFTS-koderna i tabellen.

Förekommer flera sjukdomar i försöket samtidigt, graderas en sjukdom i taget för att erhålla bästa resultat (dvs. man får läsa av varje parcell flera gånger vid samma graderingstillfälle). Tänk på att olika sjukdomar kan framträda olika starkt på olika bladnivåer. Alla sjukdomar behöver därför inte graderas på samma bladnivå.

Om ett svampangrepp inte går att gradera på grund av att en annan svampsjukdom t.ex. gulrost, eller mjöldagg dominerar totalt (helt förstört bladytan), eller vid kraftiga blandinfektioner av svartpricksjuka, vetets bladfläcksjuka och brunfläcksjuka då är det mycket svårt att skilja sjukdomarna åt, lägg inte in någon gradering i NFTS för den rutan/rutorna, men notera i NFTS varför rutan lämnats tom. Om det inte är möjligt att urskilja sjukdomar använd parametern 'Sjukdomar antecknas, %' (074215).

Strå-/Ax-/Sotsvampar

Följ instruktioner i nedanstående tabell för graderingsmått och tidpunkt.

Bedömning av graderingens säkerhet 1-3

Klassificera hur säker graderingen är vid varje graderingstillfälle och lägga in som notering i NFTS. Den som utför graderingen ska uppskatta hur säker graderingen är beroende på omständigheterna i fältet.

1= osäker gradering, säkerheten i graderingen är sämre än önskvärt, t.ex. vid blandinfektioner som gör det svårt att skilja olika sjukdomar åt, förekomst av torkskador, naturlig nedvissning i tidiga sorter, otydliga symptom, inslag av "sortfläckar", angrepp av bladminerare, liggsäd.

2= normalgradering, ingen större tveksamhet på graderad sjukdom. Det går att skilja angreppsgraden även om flera sjukdomar finns.

3= säker och utslagsgivande gradering. Det finns parceller som är helt, eller nästan utan angrepp samtidigt som det finns parceller med angrepp stora och tydliga angrepp. Ingen risk för förväxlingar av symptom eller andra orsaker som stör graderingen.

Kodnycklar och tidpunkt för graderingar av skadegörare i höststråsäd

Höstsäd

(Gunilla Andersson, Kalmar 2016-01-28), uppdaterad 2022-08-30 SLU

(HV = Höstvete, RV = Höstrågvete, HK = Höstkorn, HR = Höstråg)

Skadegörare	Kod EPPO/Bayer	HV	RV	HK	HR	Tidpunkt/graderingsmått	Kommentar	NFTS-kod	NFTS beteckning
Utvintringsskador									
Snömögel	MICNNI	X	X	X	X	Omedelbart efter snösmälningen – tillväxten börjar; % angripet bestånd		074066	Snömögel, % täckning
Trådklubba	TYPHSP			X		Omedelbart efter snösmälningen – tillväxten börjar; % angripet bestånd		074074	Trådklubba, % täckning
Stråknäckare	PSEUHE	X	X		X	Omedelbart efter snösmälningen – tillväxten börjar; % angripna plantor		074030	Stråknäckare, % plantor m
Bladsvampar									
Mjöldagg	ERYSGR	X	X	X	X	DC 59-65; % angripen bladyta blad 2 (ev. bl. 1 eller 3)	Om angrepp före-kommer före DC 37 skall gradering göras i DC 37-39 och i DC 59-65	074035	Mjöldagg, % täckning
Gulrost	PUC CST	X	X			DC 59-65; % angripen bladyta blad 2 (ev. bl. 1 eller 3)	Om angrepp före-kommer före DC 37 skall gradering göras i DC 37-39 och i DC 59-65. Vid mycket kraftiga angrepp i en sort i DC 59-65, skall inga andra svampar graderas i sorten.	074025	Gulrost, % täckning
Svartpricksjuka	SEPTTR	X	X			DC 73-75; % angripen bladyta blad 2 (ev. bl. 1 eller 3)		074019	Svartpricksjuka, % täckning
Brunrost	PUC CRE	X	X		X	DC 73-75; % angripen bladyta blad 2 (ev. bl. 1 eller 3)	Vid kraftiga angrepp kan en senare gradering vara motiverad	074009	Brunrost, % täckning
Brunfläcksjuka	LEPTNO	X	X			DC 73-75; % angripen bladyta blad 2 (ev. bl. 1 eller 3)		074006	Brunfläcksjuka (septoria), % täckning
Vetets bladfläcksjuka (DTR)	PYRNTR	X	(X)		(X)	DC 73-75; % angripen bladyta blad 2 (ev. bl. 1 eller 3)		074262	Bladfläcksjuka DRECSP, % täckning
Kornets bladfläcksjuka	PYRNTE			X		DC 73-75; % angripen bladyta blad 2 (ev. bl. 1 eller 3)		074004	Kornets bladfläcksjuka, % täckning
Kornrost	PUC CHD			X		DC 73-75; % angripen bladyta blad 2 (ev. bl. 1 eller 3)		074011	Kornrost, % täckning
Sköldfläcksjuka	RHYNSE		X	X	X	DC 73-75; % angripen bladyta blad 2 (ev. bl. 1 eller 3)		074058	Sköldfläcksjuka, % täckning

Ramularia	RAMUCC			X	DC 73-75 eller senare; % angripen bladyta blad 2 (ev. bl. 1 eller 3)	074041	Ramularia, % täckning
Strå/ax/sot-svampar							
Svartrost	PUCCGT	X	X	X	DC 73-75 eller vid skörd om angrepp upptäcks då; % angripna strån	074277	Svartrost, % täckning
Axfusarios					DC 73-75; Graderas efter särskilda anvisningar för axangrepp enl. mall HUSEC:s kvalitetshandbok	074328	Axfusarios, enl HUSEC
Gulrost	PUCCST	X	X		DC 73-75 eller senare; % angripen yta av ax	074203	Gulrost, % täckning af aks
Mjöldryga	CLAVPU			X	DC 90 vid skörd; % angripna ax	074103	Mjöldryga, % ax med
Stinksot	TILLCA	X			DC 73-75; % angripna ax	074071	Stinksot, % ax m
Dvärgstinksot	TILLCO	X			DC 73-75; % angripna plantor		

Gradering av axbrytning, stråbrytning, grönskott och stråstyrka

Stråstyrka, andelen uppräta strån, 0-100. 0=helt nedliggande, horisontellt och 100=helt upprättstående.

Stråbrytning, andelen strån som brutits någonstans mellan 1:a noden och under översta noden. 0=inga strån brutna, 100=alla strån brutna.

Axbrytning, andelen strån som brutits ovanför översta noden (strax under axet). 0=inga strån brutna, 100=alla strån brutna.

Gradera stråstyrka först, därefter graderas ax- respektive stråbrytning.

Kommentar: Stråstyrka och ax/stråbrytning graderas oberoende av varandra d.v.s. brytningen påverkar inte stråstyrkegraderingen. Exempel: Om de är det t.ex. 20 % stråbrytning, men resterande strån står rakt upp blir stråstyrkan 100. Men om det är *omfattande* stråbrytning graderas inte stråstyrka. Gränsen för omfattande är när graderingen av stråstyrkan bedöms osäker.

Grönskott, 0=inga, 100=alla strån/stjälkar gröna. Grönskott avser skott som inte har kommit med i kulturväxtens 1:a generation.

Gradering av drösning

I första hand görs en okulär besiktning i skalan 0-5, där 0=ingen drösning och 5 = mkt drösning, mer än 13 kärnor per dm².

Gradering	Antal kärnor per 1 dm ²	Motsvarar ungefär mängden spannmål, kg/ha
0	Inga	-
1	< 3	< 180
2	4-6	240-360
3	7-9	420-540
4	10-13	600-780
5	>13	>840

Gradering av hjälpvariabler

Det finns en grupp graderingsparametrar som är viktig bakgrundsinformation vid tillfälliga störningar för att förstå avvikelser i försöket. Som t.ex. kvickrot, viltskador, fågelskador, kornflugaskador etc. Lägg till när det behövs.

Gradering av gulmognad

(Efter Gesslein, S., 1959; Stråsädens mognadsförlopp och skördemetoderna).

Datum för gulmognaden bestäms enligt nedan för olika spannmålsarter och måste anges i datumform enligt NFTS. OBS parametern i NFTS heter *Mognad, datum för*, men står för gulmognad. Graderingen ska göras ledvis, dvs. i ett block.

Vid **mjölmognad** (MM) börjar plantan att gulna. Kärninnehållet är tjockflytande och påminner genom sin vita färg om mjölk, därav beteckningen. Färgen beror på en kraftig inlagring av stärkelse. Kärnan är helt grön. Vattenhalten ligger i allmänhet mellan 50-60 %. Grodden är färdigbildad, och kärnan anses grobar, även om grobarheten lätt förloras.

Gulmognad (GM) inträffar då klorofyllet är nedbrutet, och plantan antar en gul färg. Den enda gröna färg som accepteras är på de övre lederna. Vattenhalten i kärnan är då ca 30-35 %, och all inlagring i kärnan är avslutad. Kärnan är degig och seg, men samtidigt något spröd, vilket gör att den kan brytas över nageln. Viktigaste karaktär: Ingen grön färg i bukfåran på kärnan.

Skillnader finns dock mellan växtslagen, vilket gör att man ibland måste se på halmens färg och ibland på kärnans färg:

GM hos höstvet.

Vid GM har all grön färg försvunnit utom på stråets övre leder. Vattenhalt 30 %. Säkraste karaktär: Ingen grön färg i kärnans bukfåra.

GM hos höstråg.

Bukfåran utan klorofyll. Detta ses bäst om man bryter kärnan, den blågrå färgen kan förväxlas med klorofyllet. Vattenhalt 30 %. Halmen gul-gulbrun med övre leder något gröna.

GM hos höstkorn.

Agnarna helt gula. Bladslidorna kan vara grönläckiga vid lederna. Bukfåran utan grön färg på samtliga kärnor hos huvuddelen av skotten. Vattenhalt 30 %.

Fullmognad (FM) kan vid vackert väder inträffa ganska snart efter GM. Kärnan kan inte längre brytas, vattenhalten är 15-18 %.

PM Avkastningsförsök höstsådda spannmål

I det nya upplägget ingår VCU-sorterna ("rikssorter") i alla utlagda avkastningsförsök. Hela försöket behandlas av försöksvärden i samband med fältbehandlingen (sk. Blockbehandlingar mot svampar och skadegörare utförs inte längre). Sjukdomsgraderingar utförs bara om stort angrepp förekommer och där (liksom med gradering av andra skador) graderingarna blir nödvändiga för tolkningen av försöksresultaten.

PM för sortförsök med höstvet, avkastningsförsök, L7-0101

Placering: Försöket skall placeras i ett fält med höstvet. Undvik om möjligt fält med sena sorter då en sen skörd riskerar att missgynna de tidigt mognande sorterna.

Utsädesmängd: Enligt uppgift på etiketterna. Utsädesmängd enligt tabell sid 3 i detta PM.

Sådd och gödsling: Sådden utförs i för trakten normal tid.
Försöket gödslas som omgivande fält, med målsättning att uppnå brödsädsckvalité.

**Ogräs-
Bekämpning:** Utförs rutinmässigt i försöken samtidigt som omgivande fält. Följ senaste bekämpningshandböckerna om behandlingar utförs av försökspatrullen.

Tillväxtreglering: Utförs i försöket på samma sätt som omgivande fält

**Behandling
mot svampar
och insekter:** Behandling mot svampar och insekter utförs av försöksvärden i samband med fältbehandling. Ingen blockbehandling sker i det nya upplägget av avkastningsförsöken. Utföraren ska säkerställa att försöksvärden genomför relevanta behandlingar i försöket, och om nödvändigt komplettera med riktade behandlingar för att säkerställa att tidiga, eller på annat sätt avvikande sorter, inte allvarligt missgynnas av gjorda behandlingar.

Skörd: Skördetidpunkten anpassas om möjligt efter de tidigt mognande sorterna.

**Anteckningar
graderingar:**

1. *Planttäthet.* Höst och vår. Orsaken till ev. utgång noteras i NFTS, t.ex. uppfrysning, Fusarium, etc.
2. *Stråstyrka.* Uppskattas vid skörd. 0-100, (0=helt nedliggande, 100=fullt upprätt).
3. *Axbrytning.* Vid förekomst av axbrytning vid skörd graderas denna särskilt. (0 =ingen axbrytning, 100 = alla strån brutna). Se PM sid 7.
4. *Stråbrytning.* Vid förekomst av stråbrytning vid skörd graderas denna särskilt. (0 = ingen stråbrytning, 100 = alla strån brutna). Se PM sid 7.
6. *Strålägg (beståndshöjd).* Mäts i cm ledvis när beståndet är fullt utvuxet. Från markytan till axets topp.
7. *Mognad.* Datum för gulmognad graderas ledvis. Se PM sid 9.
8. *Fältgroning.* Gradera ev. fältgroning, 0-100, vid skörd. Ange andel grodda kärnor i parcellen eller i skördeprovet.
9. *Axräkning.* Utförs i utvalda försök i höstvet.
10. *Diverse.* Allt övrigt av betydelse för tolkningen av försöksresultaten skall antecknas, såsom ev. skador, sjukdomsangrepp, onormala tillväxtbetingelser, drösning o s v noteras i NFTS.

Provtagningar: *Jordprov.* Jordart och pH skall bestämmas i försöket.

Kärnprov. Prover uttas rutvis för rutinanalys och vägs in. Rutinanalys av vattenhalt, renhet, rymdvikt, protein, stärkelse, tusenkornvikt. Falltal enl. beställning från SLU.
Uttag av bakningsprov enligt beställning från SLU.

PM för sortförsök med höstråg, avkastningsförsök, L7-0201

Utsädesmängd: Enligt uppgift på etiketterna. Utsädesmängd enligt tabell sid 3 i detta PM.

Sådd och gödsling: Sådden utförs i för trakten normal tid.
OBS! ingår korthybrider i försöket ska de omges med dubbla skyddsrutor på vardera sida om sorten, både skydd med korthybrid närmast korthybriden och skydd med normallång sort närmast en normallång sort. Dessa skydd finns inlagda i designen i NFTS. Glöm ej vanliga skyddsrutorna.
Försöket gödslas av odlaren som fältet runtomkring.

Ogräs-Bekämpning: Utförs rutinmässigt i försöken samtidigt som omgivande fält. Följ senaste bekämpningshandböckerna om behandlingar utförs av försökspatrullen.

Tillväxtreglering: Utförs i försöket på samma sätt som omgivande fält. Om fältet ej tillväxtregleras bör försöket behandlas av försöksutföraren, efter samråd med odlaren. Följ senaste behandlingsrekommendationer vid behandling.
Tillväxtreglering sker då föredragsvis i och med:
DC 31: 0,3 l/ha Moddus Start i samband med svampbehandling.
DC 45-47: 0,5 l/ha Cerone i samband med svampbehandling. Det är viktigt att behandlingen sker vid rätt utvecklingsstadium, behandling efter att borsten syns kan skada rågen.

Behandling mot svampar och insekter: Behandling mot svampar och insekter utförs av försöksvärden i samband med fältbehandling. Ingen blockbehandling sker i det nya upplägget av avkastningsförsöken. Utföraren ska säkerställa att försöksvärden genomför relevanta behandlingar i försöket, och om nödvändigt komplettera med riktade behandlingar för att säkerställa att tidiga, eller på annat sätt avvikande sorter, inte allvarligt missgynnas av gjorda behandlingar.

Skörd: Skördetidpunkten anpassas om möjligt efter de tidigt mognande sorterna.

Anteckningar graderingar:

1. *Planttäthet.* Höst och vår. Orsaken till ev. utgång noteras i NFTS, t.ex. uppfrysning, snömögel, etc.
2. *Stråstyrka.* Uppskattas vid skörd. 0-100, (0=helt nedliggande, 100=fullt upprätt).
3. *Axbrytning.* Vid förekomst av axbrytning vid skörd av graderas denna särskilt. (0 = ingen axbrytning, 100 = alla strån brutna). Se PM sid 7.
4. *Stråbrytning.* Vid förekomst av stråbrytning vid skörd graderas denna särskilt. (0 = ingen stråbrytning, 100 = alla strån brutna). Se PM sid 7.
6. *Strållängd (beståndshöjd).* Mäts i cm ledvis när beståndet är fullt utvuxet. Från markytan till axets topp.
7. *Mognad.* Datum för gulmognad graderas ledvis. Se PM sid 9.

8. *Fältgroning*. Gradera ev. fältgroning, 0-100, vid skörd. Ange andel grodda kärnor i parcellen eller i skördeprovet.

9. *Diverse*. Allt övrigt av betydelse för tolkningen av försöksresultaten skall antecknas, såsom ev. skador, sjukdomsangrepp, onormala tillväxtbetingelser, drösning o s v noteras i NFTS.

Provtagningar: *Jordprov*. Jordart och pH skall bestämmas i försöket.

Kärnprov. Prover uttas rutvis för rutinanalys och vägs in. Rutinanalys av vattenhalt, renhet, rymdvikt, protein, tusenkornvikt. Falltal enl. beställning från SLU.

PM för sortförsök med höstrågvete, avkastningsförsök, L7-0212

Utsädesmängd: Enligt uppgift på etiketterna. Utsädesmängd enligt tabell sid 3 i detta PM.

Sådd och gödsling: Sådden utförs i för trakten normal tid.
Försöket gödslas normalt av försöksvärden med fältets N-giva.

Ogräs-Bekämpning: Utförs rutinmässigt i försöken samtidigt som omgivande fält. Följ senaste bekämpningshandböckerna om behandlingar utförs av försökspatrullen.

Tillväxtreglering: Utförs i försöket på samma sätt som omgivande fält.

Behandling mot svampar och insekter: Behandling mot svampar och insekter utförs av försöksvärden i samband med fältbehandling. Ingen blockbehandling sker i det nya upplägget av avkastningsförsöken. Utföraren ska säkerställa att försöksvärden genomför relevanta behandlingar i försöket, och om nödvändigt komplettera med riktade behandlingar för att säkerställa att tidiga, eller på annat sätt avvikande sorter, inte allvarligt missgynnas av gjorda behandlingar.

Skörd: Skördetidpunkten anpassas efter de tidigt mognande sorterna.

Anteckningar graderingar:

1. *Planttäthet.* Höst och vår. Orsaken till ev. utgång noteras i NFTS, t.ex. uppfrysning, snömögel, etc.
2. *Stråstyrka.* Uppskattas vid skörd. 0-100, (0=helt nedliggande, 100=fullt upprätt).
3. *Axbrytning.* Vid förekomst av axbrytning vid skörd av graderas denna särskilt. (0 = ingen axbrytning, 100 = alla strån brutna). Se PM sid 7.
4. *Stråbrytning.* Vid förekomst av stråbrytning vid skörd graderas denna särskilt. (0 = ingen stråbrytning, 100 = alla strån brutna). Se PM sid 7.
6. *Strålängd (beståndshöjd).* Mäts i cm ledvis, när beståndet är fullt utvuxet. Från markytan till axets topp.
7. *Mognad.* Datum för gulmognad graderas ledvis. Se PM sid 9.
8. *Fältgroning.* Gradera ev. fältgroning, 0-100, vid skörd. Ange andel grodda kärnor i parcellen eller i skördeprovet.
9. *Diverse.* Allt övrigt av betydelse för tolkningen av försöksresultaten skall antecknas, såsom ev. skador, sjukdomsangrepp, onormala tillväxtbetingelser, drösning o s v noteras i NFTS.

Provtagningar: *Jordprov.* Jordart och pH skall bestämmas i försöket.
Kärnprov. Prover uttas rutvis för rutinanalys och vägs in. Rutinanalys av vattenhalt, renhet, rymdvikt, protein, stärkelse, tusenkornvikt.

PM för sortförsök med höstkorn, avkastningsförsök, L7-0215

Utsädesmängd: Enligt uppgift på etiketterna. Utsädesmängd enligt tabell sid 3 i detta PM.

Sådd och gödsling: Sådden utförs i för trakten normal tid. Skyddsutor läggs mellan småblock. Se särskilda anvisningar på nästa sida. Dessutom finns det fyra extra led (led 19-22) med reducerad utsädesmängder av hybrid och linjesorter. Sorter som används är SY Galileo och Lady.
Försöket gödslas med gårdens N-giva vid tillväxtens början. Gödsla ej för sent.

Ogräs-Bekämpning: Utförs rutinmässigt i försöken samtidigt som omgivande fält. Följ senaste bekämpningshandböckerna om behandlingar utförs av försökspatrullen.

Tillväxtreglering: Utförs i försöket på samma sätt som omgivande fält.

Behandling mot svampar och insekter: Behandling mot svampar och insekter utförs av försöksvärden i samband med fältbehandling. Ingen blockbehandling sker i det nya upplägget av avkastningsförsöken. Utföraren ska säkerställa att försöksvärden genomför relevanta behandlingar i försöket, och om nödvändigt komplettera med riktade behandlingar för att säkerställa att tidiga, eller på annat sätt avvikande sorter, inte allvarligt missgynnas av gjorda behandlingar.

Skörd: Skördetidpunkten anpassas efter de tidigt mognande sorterna.

Anteckningar graderingar:

1. *Planttäthet.* Höst och vår. Orsaken till ev. utgång noteras i NFTS, t.ex uppfrysning, Fusarium, etc.
2. *Stråstyrka.* Uppskattas vid skörd. 0-100, (0=helt nedliggande, 100=fullt upprätt).
3. *Axbrytning.* Vid förekomst av axbrytning vid skörd av graderas denna särskilt. (0 = ingen axbrytning, 100 = alla strån brutna). Se PM sid 7.
4. *Stråbrytning.* Vid förekomst av stråbrytning vid skörd graderas denna särskilt. (0 = ingen stråbrytning, 100 = alla strån brutna). Se PM sid 7.
6. *Stråläggning (beståndshöjd).* Mäts i cm ledvis när beståndet är fullt utvuxet. Från markytan till axets topp.
7. *Mognad.* Datum för gulmognad graderas ledvis. Se PM sid 9.
8. *Fältgroning.* Gradera ev. fältgroning, 0-100, vid skörd. Ange andel grodda kärnor i parcellen eller i skördeprovet.
9. *Diverse.* Allt övrigt av betydelse för tolkningen av försöksresultaten skall antecknas, såsom ev. skador, sjukdomsangrepp, onormala tillväxtbetingelser, drösning o s v noteras i NFTS.

Provtagningar: Jordprov. Jordart och pH skall bestämmas i försöket.

Kärnprov. Prover uttas rutvis för rutinanalys och vägs in. Rutinanalys av vattenhalt, renhet, rymdvikt, protein, stärkelse, tusenkornvikt.

Framställning av sortblandningen till skyddsruator mellan småblock.

Obs: skyddsruator på vardera sida blocken sås med SY Galileo.

1)	2 kg Apolda 2r	Extra utsäde skickas av SSd.
2)	1 kg SU Laubella 2r	Extra utsäde skickas av SSd.
3)	Bordeaux 2r	De som har graderingsförsök har fått 3 kg Bordeaux/försök till skydd. <u>Det som inte behövs för graderingsförsökenas skyddsruator</u> kan användas
4)	Rester av försöksutsäde (efter uppvägning till avkastning + graderingsförsöken) får användas (helst 2-rads, eller kortare 6-radssorter som KWS Wallis/Astaire/Orbit)	
5)	Utsädet av t.ex. försöksvärden får användas att fylla upp (helst 2-radsorter, eller kortare 6-radssorter (se exempel under 4)	

Sortblandningar för skyddsrutorna i graderingsförsöken 2024:

		Ungefär utsädesmängd per plats (kg)	Skickas av
Höstvete L7-0101G-2024			
Sevin (obetat)	svartpricksjuka	1,80	SLU
Kalmar (obetat)	gulrost, mjöldagg	2,50	NSd
Julius		3,00	LmL
Festival	brunrost	3,00	LmL
Norin	gulrost	2,50	LmL
Höstråg L7-0201G-2024			
Herakles	mjöldagg , sköldfläcksjuka	3,00	SSd
KWS Berado (obetat)	brunrost , sköldfläcksjuka	1,60	NSd via HS Skåne
Astranos (obetat)	sköldfläcksjuka	2,00	NSd via HS Skåne
Rågvete L7-0212G-2024			
Kasyno	mjöldagg	3,00	LmL
Temuco	bladfläcksjuka	3,00 2,70	LmL
SU Toppus	gulrost	3,00	SSd
Höstkorn L7-0215G-2024			
KWS Orbit	rel bred mottaglighet (mjöldagg , kornrost, sköldfläcksjuka, bladfläcksjuka)	3,10	LmL
Bordeaux	rel bred mottaglighet (mjöldagg , kornrost, sköldfläcksjuka , bladfläcksjuka)	3,10	SSd
KWS Astaire	kornrost	3,10	SSd

Utsädesmängd: Enligt uppgift på etiketterna. Utsädesmängd enligt tabell sid 3 i detta PM.

Sådd och gödsling Sådden utförs samtidigt för alla arter. Glöm ej skyddsrutorna. Om kombisådd utförs, ges en anpassad höstgiva av fosfor och kalium för respektive gröda. Vid generell gödsling av hela ytan anpassas givan efter höstvetete. Försöket gödslas med kväve och svavel på våren, om möjligt anpassas givan till respektive gröda annars gödslas försöket med givor anpassade till höstvetete.. **Svavelbrist** får ej förekomma.

Ogräs-Bekämpning Skall utföras rutinmässigt i försöken med preparat som är godkända i samtliga ingående grödor. Följ senaste upplagor av bekämpningshandböcker.

Behandling mot svampar och insekter **Ingen svampbehandling** får utföras i försöket! Insektbehandling som omgivande fältet. Vid behov ska en behandling mot beståndshotande skadegörare utföras (såsom fritfluga).

Skörd: Ingen försöksmässigt skörd.

Anteckningar graderingar: 1. *Planttäthet.* Allmän inspektion efter uppkomsten och på våren. Rutvis gradering utförs endast om stora skillnader föreligger för flera rutor.

2. *Mognad.* Datum för gulmognad graderas ledvis. Se PM sid 9.

3. *Sjukdomar.* Sjukdomar ska graderas regelbundet så snart de förekommer i försöket. Sjukdomar graderas sedan en gång i veckan, med anpassning efter utvecklingen av angreppen, för att fånga de tidpunkter när sortskillnaderna är som störst. Resultaten måste läggas in i NFTS direkt efter graderingen för löpande redovisning av sjukdomarna. Starten för graderingarna på säsongen stäms av med de regionala Växtskyddscentralerna. Vid varje graderingstillfälle notera också säkerheten i graderingen enligt skalan 0-3 i NFTS (sid 6). **När försöket kontrollerades för sjukdomar och inget angrepp noterades (ingen rutvis gradering utfört), lägg in parametern på försöksnivå ("F") i NFTS med värde "0".**

4. *Stråstyrka.* Vid behov graderas stråstyrka rutvis i samband med sjukdomsgraderingarna. **Om Stråstyrka inte graderas då allt står upprätt lägg parametern på försöksnivå ("F") i NFTS och skriv in 100.**

5. *Stråstyrka vid skörd.* En avslutande gradering av stråstyrka vid skördemognad görs rutvis.