

PM för sortförsök med vårraps, R7-910

<i>Placering:</i>	Försöket får inte placeras på samma plats som OS7-1, eftersom en del sorter är gemensamma i försöken.
<i>Utsäde:</i>	Översändes genom EVP:s försorg.
<i>Utsädesmängd:</i>	Enligt uppgift på etiketterna. Motsv. 200 grobara frön/m2.
<i>Radavstånd:</i>	Ca 12 cm.
<i>Sådd och gödsling:</i>	Sådden utföres i för trakten normal tid. OBS! Glöm ej skydds-rutorna. Försöket gödslas med gårdens N-giva, svavelgödselmedel.
<i>Ogräs-bekämpning:</i>	Skall utföras rent rutinmässigt i försöken. Följ senaste "Bekämpningsmedel" och "Ogräsnyckeln"
<i>Skadedjurs-bekämpning:</i>	Håll noggrann uppsikt på skadedjur, främst rapsbaggar. Preparatval beroende på aktuell resistenssituation.
<i>Bomulls-mögel:</i>	Angrepp av bomullsmögel skall alltid noga observeras och avräknas enligt bif. PM.
<i>Skörd:</i>	Utföres med största omsorg så att rättvisande resultat erhålles.
<i>Anteckningar, graderingar:</i>	1. <i>Planttäthet.</i> Allmän inspektion efter uppkomsten. Gradering utföres endast om stora skillnader föreligger för flera rutor. 2. <i>Mognadstid</i> uppskattas. Ange mognaden i datumform, månad-dag, tex. 0827. Andra graderingssätt kan inte användas i datasystemet. Mognadsgraderingen skall göras ledvis. 3. <i>Stråstyrka.</i> Graderas vid skörd. 4. <i>Sjukdoms- och skadedjursangrepp</i> antecknas. Skadorna anges och graderas. 5. <i>Diverse.</i> Allt övrigt av betydelse för tolkningen av försöksresultaten skall antecknas, såsom ev. skador, onormala tillväxtbetingelser, drösning osv.
<i>Provtagningar:</i>	<i>Jordprov.</i> Generalprov av matjord. Insänds till regionens lab. <i>Fröprov.</i> Följ regionala anvisningar.

PM för gradering av bomullsmögel i vårraps i sortförsöken, R7-910, OS7-1

Vårrapsförsöken skall inte behandlas mot svamp, eftersom det finns sortskillnader i angreppen av bomullsmögel.

Vid förekomst av bomullsmögel skall antalet angripna plantor bestämmas strax före mognaden. Graderingen utförs på följande sätt:

Avräkning av 100 plantor per ruta görs i block I och III.

Gå 2 m in i rutan. Kontrollera 100 plantor i en följd längs en sårad, förslagsvis rad 2 från höger. Kontrollera hela plantan. Rötan sitter i regel i nedre delen av stälken och är gråvit. Tidigt angripna plantor är nu helt nedvissnade. Anteckna antalet angripna plantor.

OBS! Finns ingen bomullsmögel i försöket räcker en anteckning på fältkortets framsida om att bomullsmögel **inte** förekommer. Avräkna således inte!

Detsamma gäller om nivån är mycket låg och jämn, 3-4% på samtliga sorter.

Avsikten är att få fram sortskillnader i angrepp av bomullsmögel.