

Plan: L9-8450 4 försök: 2 Skåne (LB- och M-län) 1 FiV 1 ÖSF (E-län)	Regionala försök 2018 Ansvarig för serien: Ulrika Dyrland Martinsson Hushållningssällskapet Skåne 010-476 20 31	2018-04-26
---	--	------------

PM**Försöksserien L9-8450**

Att jämföra olika preparats effekt och skördeökning vid bekämpning av svamp i höstraps.

Led	Behandling	DC 60	DC 65	DC 67 eller så sent som möjligt	Finansiär
1	Obehandlat				Region
2	Propulse		1,0		Bayer
3	Mirador Forte		2,0		ADAMA
4	Amistar Gold		1,0		Syngenta
5	Pictor Active		1,0		BASF
6	Mirador Forte + Pictor Active	1,25		1,0	ADAMA
7	Cantus		0,3		Svensk Raps

Krav på försöksplatserna och försöksarbetets omfattning

- Anläggning enligt fältkortet på ett jämnt skifte i plöjt fält (ej HE-VA sådd eller liknande) där risken bedöms som stor för bomullsmögel och eller svartfläcksjuka (tidigare angrepp i fältet, kraftig gröda). Jorden får inte vara smittad av klumprotsjuka.
Bruttoparcell ca 40 m² (3 m x 12,5 m). Nettoparcell ca 20 m²
- Jordprov (pH, P-AL, K-AL, Mg-AL, jordart, mullhalt och lerhalt).
- Gödning enligt lantbrukaren.
- Rutinmässig ogräs- och insektsbekämpning. Dessa behandlingar skall göras antingen av lantbrukaren eller av försöksutföraren. Försöksutföraren ansvarar för att detta blir utfört.
- Uppvägning av preparat görs av Hushållningssällskapet Skåne, Sandby Gård, Borby.
- Sprutning med fungicider enligt försöksplan. Inga övriga fungicidbehandlingar får göras i försöket.
Vätskemängd: 300 l/ha och tryck 2-3 bar. Viktigt att vindstyrka och vindriktning anges på sprutjournal.
- Gradering av svampsjukdomar görs vid ca DC 85 (se sida 2). Observera att bomullsmögelangrepp delas in i 4 klasser. ”Gradering av bomullsmögel enligt EPPO Standards PP1/80(2)” Graderingarna görs av försöksutföraren eller av VSC, försöksutföraren ansvarar för att VSC vidtalas så att graderingarna blir utförda vid rätt tillfälle.
- Gradering av stjälkstyrka, ev. grönskott och torkskador.
- Skörd och vägning av frö rutvis. Rutvisa prov för analys av avrens, vattenhalt (NIT) och oljehalt (NIT) skickas till Agrilab, Uppsala (FiV gör själv analyserna).

För utförande fältkort och bearbetning av försöksresultat ansvarar Magnus Nilsson, Hushållningssällskapet Skåne, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred, tel 010-476 20 24. E-mail magnus.nilsson@hushallningssallskapet.se

Svampgradering i oljeväxter

Gradering av bomullsmögel (Sclerotinia) enligt EPPO Standards PP1/80(2)

Gradering utförs vid ett tillfälle när de första fröna är halvsvarta (BBCH 85). Graderingen ska göras rutvis.

Utförande:

Gradera 5 plantor i rad på 10 slumpvis utvalda ställen i varje parcell, dvs. totalt 50 plantor. Plantorna får men behöver inte ryckas upp. Plantorna ska stå minst 1 m in från parcellens kortsidor och minst 0,5 m in från långsidorna.

Angrepp av bomullsmögel bedöms och klassificeras enligt följande index:

1. Ingen infektion
2. Lätt infektion. Upp till 25 % av hela plantans volym
3. Kraftigare infektion. 25-50 % av hela plantans volym
4. Kraftig infektion. Mer än 50 % av hela plantans volym

Antalet plantor i resp. indexgrupp redovisas rutvis. Ange det faktiska utvecklingsstadiet vid graderingen.

Gradering av svartfläcksjuka (Alternaria)

Gradering utförs i varje parcell vid ett tillfälle vid BBCH 79-85 enligt graderingsnyckel i EPPO Standards PP1/78(3), Appendix I.

Utförande:

- Gradera angripen yta på skidorna i beståndet, 0-100
- Den genomsnittliga angreppsgraden i procent redovisas rutvis
- Ange det faktiska utvecklingsstadiet vid graderingen

Aktivitetslista

L9-8450-2017

Åtgärd	Tidpunkt			Första dag
P01	DC Anläggning			
P02	DC85			
P03	DC Skörd			
T1	DC60			
T2	DC65			
T3	DC67			