

Vårrybs

Under 2008 har en mycket begränsad sortprovning bedrivits i norra Sverige i vårrybs. I ett redovisat försök har Petita haft den klart högsta avkastningen. I ett flerårsmedeltal fram till 2006 har också Petita givit högst skörd.

Som framgått tidigare har odlingen av vårrybs minskat kraftigt de senaste åren, men det finns intresse kanske främst i norra delarna av Sverige att odla vårrybs. Under 2008 har två försök utförts och i tabell 3 redovisas resultat från ett försök i X-län. I samma tabell redovisas också flerårsmedelvärden för tre

sorter fram till och med 2006. Inga försök utfördes 2007.

I försöket 2008 provades förutom de etablerade sorterna ett stort antal nummersorter från Boreal i Finland, som bedriver förädlingsarbete i vårrybs. I tabellen redovisas resultat från enbart namnsorter. Försöket såddes den 8 maj och skördades den 8 september med låga vattenhalter. Skörden på mätarsorten Petita var förhållandevis hög med drygt 2000 kg/ha i fröskörd och med en råfettskörd på 936 kg/ha.

Petita hade den högsta skörden i försöket 2008 och även i ett flerårsmedeltal har Petita haft den högsta avkastningen.

I tabell 3 redovisas också några sortegen-skaper för tre sorter.

Tabell 3. Vårrybs. Avkastning, råfettskörd 2008 och flerårsmedeltal 2002-2006. Sortegenskaper. Mätare Petita

Sort	OS7-6	Hela landet, 2002-2006				
	Storvik X-län 2008	Avkast- ning	Mognad dagar	Stjälk- styrka %	Råfett % av ts	Protein i mjöl % av ts
SW Petita fröskörd, kg/ha	2 050	2 060	110	83	45,6	40,1
råfett, kg/ha	936	860				
rel.tal, råfett	100	100				
SW Agat	71	92	111	72	45,0	40,0
Bor Hohto	84	91	110	71	43,2	39,0
Bor Apollo	71					
Bor Eos	86					
Bor Valo	73					